
ІІ. КРОВОТЕЧЕНІЯ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

О КРОВОТЕЧЕНІЯХЪ ВООБЩЕ.

§ 81.

Кровотечениемъ (*sanguifluxus*) называется изліяніе крови изъ сосудовъ, обнаруживающееся либо въ необыкновенномъ мѣстѣ, либо въ такомъ количествѣ, что отъ того могутъ произойти вредныя послѣдствія, либо въ такое время, когда оно не должно появляться.

6*

§ 82.

Противуестественное вытечение крови изъ полости сосудистой системы происходит иногда во внутренний составъ организма (*extravasatum, hæmorrhœa interna*), а иногда къ наружки (*haemorrhœa externa*). Сie послѣднее, въ коемъ кровь испражняется изъ самаго тѣла смотря по разному количеству крови и силѣ истеченія, называется то *текенiemъ по каплямъ* (*stillicidium sanguinis*), то собственно *кровотекенiemъ* (*profluviuim sanguinis, sanguifluxus, hæmorrhœa*), то *стремительнымъ изліянiemъ крови* (*hæmorrhagia*).

§ 83.

Кровоизліянію предшествуютъ часто *признаки болѣя* или менѣе сильнаго *напора крови* и *общаго судистаго раздраженія* (дѣятельное кровотеченіе, *sanguifluxus activus*). Больной чувствуетъ жаръ, давление, напряженіе, или щекотаніе и біеніе въ страждущей части, которая оказывается очень возбужденною и въ отправленіяхъ своихъ болѣе или менѣе разстроеною; смежныя наружныя части дѣлаются красными и горячими, жилобіеніе бываетъ полное, твердое и частое, иногда обнаруживается и общее возбужденіе, выражающееся беспокойствомъ и беспоницею больнаго. Наконецъ изъ страждущаго органа изливается кровь, послѣ чего упомянутыя явленія постепенно уменьшаются. Выходящая при семъ кровь имѣетъ артеріальное свойство и на выпущенной изъ вены крови появляется ино-

гда воспалительная плева. Если кровотечеиe продолжается долѣ и долѣ, то мѣсто означенныхъ припадковъ, исчезающихъ мало по малу, заступаютъ явленія совсѣмъ противуположнаго свойства, т. е. такія, какъ бывають въ страдательныхъ кровотеченіяхъ.

Впрочемъ дѣятельное кровотечеиe не всегда переходитъ въ страдательное, ибо здѣсь ближайшая причина кровотечеия (мѣстное раздраженіе) остается все та же, какая могла быть при происхожденіи его, только дѣйствія на весь организмъ наступаютъ уже такія, какъ и при страдательномъ кровотечеи, т. е. слѣдствія опустошенія крови. Иногда однакожъ случаются также дѣятельные кровотечеи, при которыхъ во все не бываетъ общаго сосудистаго возбужденія и даже признаки скопленія не всегда явственно представляются, посему для распознанія свойства кровотечеия, нужно обращать вниманіе вмѣстѣ и на причины онаго.—

§ 84.

Въ другихъ случаяхъ кровотечеи оказываютъ безъ признаковъ сосудистаго раздраженія и скопленія, а на противъ того имъ предшествуютъ иногда болѣзненные припадки, зависящіе отъ общей слабости и разрѣшенія соковъ, какъ при гнилостномъ состояніи и цыпготномъ худосочіи, или отъ мѣстной слабости и разстройства, какъ при изъявленіяхъ и пр. (*страдательные кровотечеи, sanguifluxus passivi*). Здѣсь появляется кровотечеи большею частію безъ всякихъ припадковъ и при ономъ, хотя кровь бываетъ чаще артеріальная, нежели

венозная, но всегда почти очень разрѣщенная, жидкая да и общія признаки потери крови гораздо скорѣе наступаютъ, нежели въ предыдущемъ случаѣ. — Большой дѣлается блѣднымъ, слабымъ, температура тѣла его умаляется и жилобіеніе упадаетъ, а при сильной потерѣ крови тѣло дѣлается болѣе и болѣе холоднымъ, жилобіеніе бываетъ едва ощутимое и перемежающееся, страждущій поражается не преодолимою сонливостію, часто зѣваетъ, чувствуетъ головокруженіе, тупую головную боль, холода въ затылкѣ, наклонность къ рвотѣ и помраченіе зрѣнія, а въ сильной степени впадаетъ въ частые обмороки, и даже въ обмирание, либо поражается бредомъ, сильными корчами, тоническими судорогами и пр.

Если же кровь изливается не къ наружѣ, а внутрь (*haemorrhagia interna*), то о кровотечениі можно заключать только изъ przypadковъ, зависящихъ отъ потери крови, хотя przypadки сіи производятся иногда и другими виѣшними вліяніями, причиняющими обмороки, следственно для открытія слѣдовъ внутренняго кровотеченія, надлежитъ внимательно изслѣдоввать болѣзнетворныя причины и все предшествовавшее или существующее болѣзненное состояніе, тѣмъ болѣе, что въ некоторыхъ случаяхъ рождаются здѣсь не przypadки потери крови, но разстройства другаго рода, такъ на пр. при кровотечениі мозга дѣлается апоплексическій ударъ.

§ 85.

Кровотенія часто имѣютъ столь быстрый ходъ, что иногда въ нѣсколько минутъ переходить въ смерть. Не

очень значительныя могутъ продолжаться пѣсколько чашовъ и возвращаться снова чрезъ недѣлю или мѣсяцъ. Вообще они прекращаются, если чрезъ уменьшеніе количества крови, умалется общее сосудистое раздраженіе и напоръ крови къ какимъ либо частямъ въ особенности, если артеріи и органическій составъ сжимаются, если также въ сосудахъ и снаружи на кровоточивой поверхности образуются свертки крови, преграждающіе выхожденіе оной механическимъ образомъ.

Кровотеченія оставляютъ по себѣ наклонность страдающаго органа къ новому изліянію, а отъ частаго повторенія ихъ оказывается слабость во всѣхъ отправленіяхъ, изнуреніе тѣла и водяная болѣзнь. Смерть причиняется ими весьма скоро при означенныхъ явленіяхъ опустошенія крови.

§ 86.

Расположеніе къ кровотеченіямъ зависитъ отъ полнокровія, большой раздражительности всего тѣла, особенно сосудистой системы, наклонности къ волненіямъ крови и напору къ иѣкоторымъ особыннымъ частямъ; посему въ разныхъ возрастахъ жизни оказывается особенное расположение къ иѣкоторымъ родамъ кровотечений. Сверхъ сего па это очень много дѣйствуетъ существовавшее прежде кровотеченіе изъ какой либо части, большая пухлость и слабость тѣла, слабость иѣкоторыхъ органовъ и пр. Иногда наклонность къ кровотеченіямъ въ иѣкоторыхъ фамиліяхъ бываетъ наследственна.

§ 87.

Слугайныя пригіни суть: всѣ вліянія, причинающія скопленіе или страдательные пренаполненіе крови (§ 16), наипаче сильныя напряженія тѣла, горячительные напитки, чрезмѣрныя страсти, насильственно остановленныя кровотеченія, воспращенное прохожденіе крови отъ налагаемыхъ повязокъ и пр. Сверхъ сего всѣ вліянія, производящія непосредственно разслабленіе, или разрывъ сосудовъ, какъ на пр. слишкомъ раннее и частное отдѣленіе дѣтскаго мѣста, разъѣдающія язвы и пр.

§ 88.

Ближайшая причина кровотеченій поставляется нынѣ только въ двухъ измѣненіяхъ, либо 1) въ *отверстіи сосудовъ*, когда сосудистая стѣнка чрезъ разъѣдающія язвы, чрезъ вліянія Ѣдкихъ веществъ или механическихъ насилий, разстраивается такъ, что въ какомъ либо мѣстѣ совершение не бываетъ и потому кровь можетъ изливаться полною струею къ наружѣ и 2) въ *просасываніи* или *пропотѣніи* крови чрезъ сплетенія, образующія сосудистыя стѣнки. Просасываніе или пропотѣніе сіе въ здоровомъ состояніи не можетъ имѣть мѣста. Хотя устья волосныхъ сосудовъ не одарены собственою сосудистою оболочкою, но при всемъ томъ кровяные шарики, въ сравненіи съ порами органической ткани, все еще имѣютъ такую величину, что имъ не возможно проникнуть чрезъ оную ткань. На противъ того въ болѣзпенномъ состояніи, при разслабленіи орга-

нической ткани, сильномъ напорѣ крови, преизнаненіи и разтяженіи сосудистыхъ устьевъ можно допустить иногда прохожденіе кровяныхъ шариковъ чрезъ органическую ткань, образующую стѣнки сосуда.

Что касается до болѣзнишаго процесса, отъ коего могутъ зависеть кровоизлѣянія, то онъ бываетъ двоякаго рода а) *дѣятельный* и б) *страдательный*. Въ первомъ отъ чрезмѣро возвышенной жизнедѣятельности плотныхъ частей приносится кровь къ страждущему органу съ такимъ напоромъ, что органическая ткань въ устьяхъ сосудовъ не обходится раздаться и пропускать кровь чрезъ оныя; а въ послѣднемъ отъ слишкомъ упавшей жизнедѣятельности и разслабленія органической ткани даже обыкновенное количество крови, приносимой къ страждущему органу не въ состояніи удерживаться въ предѣлахъ нормальной разграниченности и протекаетъ далѣе. Упадокъ всѣхъ жизненныхъ обнаруживаній, послѣдующій за кровотечениемъ, можно изъяснить тѣмъ, что кровь составляетъ тотъ жизненный факторъ, коего взаимнымъ дѣйствиемъ съ нервами совершается наибольшая часть жизненныхъ явлений, слѣдствсно недостатокъ сей важной жидкости легко можетъ причинять значительное ослабленіе и самое уничтоженіе жизни.

§. 89.

Предсказание при кровотеченіяхъ можетъ быть назначаемо сообразно свойству ихъ. Дѣятельные кровотечения обнаружаются не столь скоро, какъ большая часть страдательныхъ, послѣдующій отъ того врѣмъ и часто

даже бывають благотворныя, появляясь въ видѣ переломовъ при волненіяхъ крови, воспаленіяхъ и стеническихъ горячкахъ. Впрочемъ они легко дѣлаются чрезмѣрными и въ такомъ случаѣ оказываются обыкновенныя слѣдствія потери крови. Сверхъ сего въ предсказаніи надлежитъ сообразоваться съ состояніемъ особы. Вообще крѣпкимъ, полнокровнымъ людямъ кровотеченіе менѣе вредно; на противъ того ослабленнымъ субъектамъ, страждущимъ первною, или гнилою горячкою и малая потеря крови причиняетъ величайшій вредъ. Женщины переносятъ, по видимому, избытокъ кровотеченія болѣе, нежели мужчины, а особы средняго возраста болѣе, нежели дѣти и старики. Преимущественно же важно въ семъ отношеніи количество потери крови и благородство органа, изъ коего происходитъ кровотеченіе, что объяснено будетъ при описаніи каждого кровотеченія въ особенности.

§ 90.

При *лѣченіи* кровотеченія надлежитъ сперва рѣшить, должно ли останавливать оное, или неѣть?—Если оно имѣеть критическое дѣйствіе и притомъ происходитъ изъ такой части, коей поврежденіе чрезъ кровоизліяніе не угрожаетъ жизни никакою опасностію, то отнюдь не должно быть прекращаемо; на противъ того, если потеря крови угрожаетъ обыкновенными вредными слѣдствіями и если оно происходитъ изъ такой части, коей поврежденіе причиняетъ большой вредъ, то нужно стараться предпринимать всѣ мѣры къ укрощенію его.

Въ сомнительныхъ случаяхъ лучше всего кровотеченіе останавливать не вдругъ, но постепенно.

Рѣшивъ, что кровотеченіе должно быть остановлено, надлежитъ поступать для сего по слѣдующимъ правиламъ:

А.) *Относительно показаній пригнныхъ.* Все что въ состояніи причинять и поддерживать кровотеченіе, по возможности должно быть удалено. Плотно наложенные повязки тотчасъ нужно развязать и для удаленія всякаго воспященія въ кровообращеніи воротной системы способствовать промывательными выхожденію скопившагося кала; всякаго рода движеній той части, изъ которой происходитъ кровотеченіе, углубленаго положенія оной и слишкомъ большаго согрѣванія, равно какъ усиленной степени жара въ комнатѣ избѣгать. Уклоняя такимъ образомъ всѣ вредныя вліянія, могущія поддерживать кровотеченіе, не должно пропускать безъ вниманія и страхъ, который легко произраждается въ больномъ отъ самаго кровотеченія и дѣйствуетъ въ такомъ случаѣ весьма вредно на него. По сему врачъ, прежде предпринятія другихъ мѣръ, долженъ успокоить больнаго возможными увѣщаніями и увѣреніями. Что касается до прочаго содержанія, то больной долженъ употреблять только прохладжающіе напитки и вообще весьма мало пищи, избѣгая всячески теплыхъ и раздражающихъ напитковъ, также очень питательной пищи до прекращенія кровотеченія и минованиія всякой опасности возврата оцаго.

§ 91.

В.) Относительно существенныхъ показаний.
Поелику болѣзенный процессъ, отъ котораго наиболѣе зависятъ кровотеченія, имѣетъ двѣ преимущественные разности, то и самое лѣченіе должно быть наиболѣе сообразяемо съ таковыми разностями.

а) *При длительномъ кровотеченіи*, обыкновенно существуетъ показаніе умалить мѣстное раздраженіе и волненіе въ крови, также умѣрить сильную дѣятельность сердца и артерій, или уменьшить саму массу крови и наконецъ затворить отверстія, изъ коихъ вытекаетъ кровь. Иногда для умѣренія достаточно умалить только состояніе раздраженія, въ которомъ находится страждущій органъ и въ семь отношеній часто оказываются пользу оболакивающія, противураздражающія средства, какъ напр.: емульсіи изъ миндалевыхъ, конопляныхъ, тыквенныхъ, маковыхъ и другихъ сѣманій, также нѣжныя, растительныя масла, особенно миндальноес, прованское, очищенное льняное ипр. съ строгимъ наблюденіемъ самой легкой, нѣжной діеты. Когда же страждущая часть находится въ очень сильномъ раздраженіи, такъ что съ онимъ соединена боль и судорожные движения, то потребны средства, сильно дѣствующія на чувствительность, какъ лактукарій (№ 3), кодеинъ (№ 2), белена (№ 1), наперстянка (№ 6), иногда и пекакуаникъ въ малыхъ пріемахъ (№ 53.) и пр. Но гораздо дѣствительнѣйшія средства въ дѣятельныхъ кровотеченіяхъ суть тѣ, кои умаляя волненіе крови, опускаютъ чрезмѣрную энергию сосудистой дѣятельности. Сюда принадлежитъ обильное употребленіе холодной воды, очищенаго

винного камня и другихъ прохладительныхъ солей (N 11.), растительныхъ (N 19.) и даже минеральныхъ очень разведенныхъ кислотъ (N 16), а при чрезмѣрной дѣятельности сердца и самой панерстинки (N 54.). Кровоиспражненія, хотя и понижаютъ возвышенную жизнедѣятельность сосудовъ, но они большею частію здѣсь не нужны, тѣмъ болѣе, что уменіе кровяной массы, производимое кровопусканиями, причиняется и самимъ кровотеченіемъ. Равнымъ образомъ не должно назначать ихъ тамъ, где угрожаетъ весьма обильное кровотеченіе на пр. при очень раннихъ родахъ, вообще при наступившемъ выкидыши (abortus). На противъ того кровоиспражненія доставляютъ большую пользу тамъ, где посредствомъ оныхъ можно наѣтъся предотвратить кровотеченіе изъ какого либо благороднаго органа, угрожающее разстройствомъ ему. Въ семъ случаѣ кровопусканіе дѣйствуетъ не только уменія количество крови, но и отводя оную къ другимъ частямъ. Для мѣстнаго пониженія возвышенной жизнедѣятельности сосудовъ, назначаются такъ называемыя внутрь вгояющія средства (r. reperciuentia), въ особенности мѣстное употребленіе холода, который однакожъ при дѣятельныхъ кровотеченіяхъ долженъ быть назначаемъ съ болѣшою осторожностію, ибо легко причинить можетъ напоръ крови къ другимъ частямъ. Къ сему служатъ также отводящія средства, к. т. теплые ножныя и ручныя ванны, пьявки и кровососныя банки, приставляемыя къ отдаленнымъ мѣстамъ, далѣе обвязываніе членовъ такъ, что бы вены, но не артеріи сжимаемы были и чрезъ то уменіе было количествомъ возвращающейся изъ венъ крови, что однакожъ весьма не

надежно и даже можетъ быть вредно; напротивъ того прижиманіе сосудовъ кровоточивой части составляетъ гораздо важнѣйшее средство, если сосуды таковыя доступны виѣшнему впечатлѣнію.

§ 92.

б) *Въ кровотеченіяхъ страдательнаго свойства* мы должны 1.) измѣнить настроеніе ослабленной жизнедѣятельности въ страждущемъ органѣ такъ, чтобы органическая ткань сковалась до надлежащей степени и затворила отверстія, чрезъ которыхъ изливается кровь; 2) въ иѣкоторыхъ случаяхъ улучшить состояніе самой крови, содѣлавъ ее чрезъ то менѣе способною къ выхожденію изъ сосудовъ и 3) тамъ, гдѣ сосудистыя стѣнки разстроены, споспѣшствовать затворенію ихъ механическимъ образомъ.

Первому требованію соответствуютъ стягивающія и крѣпительныя лѣкарства, к. с. отвары и экстракты горца (p. *bistoria*), узика (*tormentilla*), лазореваго дерева (*L. campechienese*), дубовой и ивой корки, ратаніи, ипр. также камедь кико, сокъ катеху, желѣзный купорось, квасцы и квасцовая сыворотка, поваренная соль, каштановая, гранатовая и перуанская корки. Тамъ, гдѣ оказывается значительная недѣятельность, средства сіи соединяются съ болѣе или менѣе возбуждающими, спиртными и эфирными начальами (N 23.), либо предписывается корица (N 9.), особенно въ спиртной настойкѣ (N 17), кашкариль, корень гравилата и баранки, смирина, красный вина, преимущественно же креосотъ (N 55.).

Изъ мѣстныхъ средствъ таковое же дѣйствіе оказываютъ: холодная вода, ледъ и снѣгъ, Шмукеровы примочки (N 25.), уксусъ и минеральная кислоты, разводимыя водою, растворъ квасцовъ и жѣлезного купороса, Теденова вода отъ ранъ (N 56), отваръ дубовой и ивой корки, иногда стягивающіе порошки изъ квасцовъ, камеди кино, сока катеху, драконовой крови, также липкія средства, какъ порошокъ аравійской камеди, траганта, рыбьяго клея и пр. Форма, въ каковой всѣ сіи средства могутъ быть употребляемы, зависитъ болѣе отъ разности мѣстоположенія страждущаго органа, и потому они предписываются либо въ видѣ примочекъ, прикладываній и охлаждній, либо въ видѣ впрыскиваній, либо въ порошкѣ въ видѣ присыпки.

По второму требованію порочное состояніе крови, благопріятствующее кровотеченіямъ, какъ часто случается въ худосочіяхъ и гнильыхъ горячкахъ, уничтожается наипаче употребленіемъ минеральныхъ кислотъ, въ особенности сѣриой и различныхъ ея приготовленій (N 9. 17. 57.) равно какъ и иѣкоторыхъ желѣзныхъ составовъ (N 48), даваемыхъ по себѣ, либо въ соединеніи съ вышеозначенными стягивающими лѣкарствами.

Для третьего требованія избираются либо механически, либо химически дѣйствующія средства, какъ прикладываніе къ кровоточивому мѣсту сухаго древеснаго трута, корпіи, сжимающихъ компрессовъ, подвязываніе кровоточивыхъ сосудовъ, прижиганіе раскаленымъ желѣзомъ, Ѣдкимъ поташомъ, селитрокислымъ серебромъ, обмываніе спирtnыми веществами, креозотомъ, aqua Binelli, aqua empytematica и пр.

§ 93.

С.) *По припадочнымъ показаніямъ.* Очень важные припадки, случающіеся во время кровотечений и требующіе неукоснительныхъ пособій искусства суть: *большая сонливость, обмороки и корги.*

1.) Если кровотеченіе останавливается и ослабленіе не слишкомъ велико, то больной, при должномъ надсмотрѣ, можетъ спать; когда же кровотеченіе продолжается и ослабленіе сильѣ столь велико, что можно опасаться совершенного погашенія жизни, то больному надлежитъ удерживаться отъ сна и достаточными раздраженіями возбуждать слабоющуя жизнедѣятельность.

2.) *Противъ обмороковъ* употребляется опрскиваніе лица холодною водою, помазываніе висковъ и лба спиртными средствами, либо ароматнымъ уксусомъ, нюханіе очень крѣпкаго уксуса, уксуснаго эфира, уксусныхъ паровъ (N 59.), спирта оленяго рога и пр. треніе тѣла въ тѣхъ мѣстахъ, кои отдалены отъ мѣста кровотеченія и внутрь возбуждающія средства (N 25.), краснаго вина, преимущественно настойка корицы (N 17.). Если таковыми средствами поддержать жизни не возможно, то надлежитъ испытывать *переливаніе крови* (transfusio sanguinis).

3.) Когда обнаруживаются *корги*, то больному должно предоставлять спокойствіе и способствовать сну успокаивающими средствами (N 2, 7.), наипаче опіемъ (N 7.) при соблюденіи надлежащей осторожности и употреблениій въ тоже время лѣкарствъ, останавливающихъ кровотеченіе. Если возвратъ кровотеченія надежно предот-

вращенъ напр. чрезъ сжатіе, то могутъ быть назначаемы и теплые ванны.

§ 93.

Прекративъ кровотеченіе надлежить еще иѣсколько времени продолжать употребленіе предписанныхъ лѣкарствъ и тщательно избѣгать всего, что можетъ произвести возвратъ болѣзни. Вообще здѣсь нужно назначать больному на иѣкоторое время строгую діету и если, по причинѣ потери крови, требуется умноженное питаніе, то покрайней мѣрѣ избѣгать горячительной пищи, а употреблять только молочные яствы, жидкіе мясные супы съ перловою крупою, саго и пр.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О КРОВОТЕЧЕНИЯХЪ ВЪ ОСОБЕННОСТИ.

Кровотеченіе изъ носа. (Epistaxis, haemorrhagia narium.)

§ 94.

Подъ симъ названіемъ разумѣется то кровотеченіе, которое происходитъ изъ слизистой перепонки носа и рождается собственно отъ внутреннихъ причинъ. Оно бываетъ троекаго рода.

1.) *Присадочное* (epistaxis symptomatica), оказывающееся иногда, какъ предвѣстникъ апоплексического удара, а иногда, какъ слѣдствіе брюшного полнокровія, закрытія мѣсячнаго очищенія, или почечнаго теченія, гнилостнаго разрѣшенія соковъ, злоупотребленія очень горячительныхъ напитковъ, вообще непривычныхъ разгоряченій и сильныхъ движеній тѣла.

2.) *Критическое* кровотеченіе (epistaxis critica) случается во многихъ оstryхъ болѣзняхъ, преимущественно въ стеническихъ горячкахъ, въ воспаленіи печени и селезенки, въ оstryхъ накожныхъ сыпяхъ, въ головныхъ боляхъ, раждающихся отъ скопленія крови и пр. Во всѣхъ сихъ случаяхъ оно оказывается обыкновенно рѣшительнымъ явленіемъ.

3.) *Самостоятельный* (epistaxis substantiva) можетъ быть почитаемо то кровотеченіе изъ носа, которое очень часто появляется въ отроческомъ и юношескомъ возрастахъ, гдѣ оно облегчаетъ головныя боли, головокруженіе, припадки удушья и полнокровія; но въ позднихъ лѣтахъ удобно переходить въ апоплексическое и чахотное состояніе, въ хроническую головную боль и въ геморроидальную болѣзнь. Чаще оно случается у мужчинъ, нежели у женщинъ, иногда въ нѣкоторыхъ фамиліяхъ бываетъ наслѣдственнымъ. —

§ 95.

Разпознаваніе носового кровотеченія не имѣть никакой трудности, если кровь вытекаетъ изъ самыхъ ноздрей, какъ бываетъ въ большей части случаевъ;

если же она изливается чрезъ заднее отверстіе носа въ полость рта и зѣва, причемъ легко проглатывается, то оно весьма удобно можетъ быть смѣшиваемо, особенно при невнимательномъ изслѣдованіи, съ кровотеченіемъ изъ рта, либо даже съ кровохарканіемъ и кровавою рвотою.

Кровотеченіе сіе чаще бываетъ дѣятельное, нежели страдательное и ему иногда предшествуютъ: головная боль, давленіе во лбу и надъ глазами, отягощеніе головы, головокруженіе, искры предъ глазами и помраченіе зрењія, шумъ въ ушахъ, щекотаніе въ носу, чувство полноты и сухости въ ономъ, напряженіе шейныхъ сосудовъ, неравнотрное и двойное жилобіеніе, даже холода въ конечностяхъ. — Часто кровь вытекаетъ только по каплямъ, а часто непрерывною струею и вообще только изъ одной ноздри. Иногда кровотеченіе сіе увеличивается до того, что при немъ выходитъ нѣсколько фунтовъ крови. Нерѣдко оно повторяется отъ времени до времени и хотя разомъ выходитъ не много крови; но мало по малу испражняется значительное количество. Въ такихъ случаяхъ кровотеченіе изъ носа имѣетъ вредные слѣдствія потери крови.

§ 96.

Наибольшее расположение къ сей болѣзни существуетъ въ дѣтскомъ, отроческомъ и юношескомъ возрастахъ, покрайней мѣрѣ до двадцатаго года, однакожъ и въ глубокой старости случается очень сильное, даже опасное кровотеченіе изъ носа.

Изъ случаиныхъ причинъ частѣйшая суть: сочув-

ственныхъ раздраженія брюшныхъ и грудныхъ органовъ, раздутость печени, или селезенки, глисты въ кишкахъ и пр. Сверхъ сего сюда принадлежать всѣ вліянія, умножающія приливъ крови къ головѣ, въ особенности злоупотребленіе спиртныхъ напитковъ, чрезмѣрный печной жаръ и солнечный зной, дѣйствующій на голову, напряженіе при сильномъ чиханіи, рвотѣ, кашлѣ, крикѣ и пр. ношеніе очень тѣснаго платья, особенно галстуховъ, даѣте полипы въ носу и страданіе Шнейдеровой оболочки отъ насморка, кори и т. п.

§ 97.

Предсказаніе. Кровотеченіе изъ носа рѣдко бываетъ опасно, наипаче когда есть возможность вѣрно пріостанавливать его; впрочемъ въ некоторыхъ случаяхъ оно чрезвычайно трудно прекращается и даже можетъ имѣть смертельный слѣдствія, особенно когда зависитъ отъ изъявленій и полиповъ въ носу. Тоже случается въ гнилой горячкѣ, цынгѣ, въ перемежающейся лихорадкѣ и въ оспѣ.

§ 98.

Леченіе требуетъ удаленія случайныхъ причинъ и назначенія не столь питательной и горячительной пищи, приличного упражненія, положенія и одежды больнаго; сверхъ того уклоненія всѣхъ вліяній, дѣйствующихъ на скопленіе крови въ головѣ. На сей конецъ могутъ служить съ пользою прохладжающія средства (N 19.), пож-

ные и ручныя ванны, кровопусканіе изъ ноги, крово-
сосныя банки, иногда слабительныя (N 15.) и пр.

Скорое и непосредственное пріостановленіе носового
кровотеченія, даже въ сильной степени онаго, должно
быть производимо съ большою осторожностю и только
въ крайнихъ обстоятельствахъ. Извѣстно, что кровоте-
ченіе изъ носа въ столь многихъ случаяхъ заключаетъ
въ себѣ нечто критическое и что производимое натурою
испражненіе крови никогда не можетъ быть вознаграждено
въ полной мѣрѣ искусственнымъ. Посему-то неблаговре-
менное прекращеніе кровотеченія сего часто подаетъ
поводъ къ тяжкимъ, трудно излѣчимымъ болѣзнямъ.
Опытность научаетъ, что въ слѣдствіе такаго прекра-
щенія рождается иногда апоплексическій ударъ, воспа-
леніе мозга, головокруженіе, сильная продолжительная
головная боль, воспаленіе глазъ, ушей, горла и лег-
кихъ; также удушье, кровохарканіе, чахотка легкихъ
и пр.

Гдѣ кровотеченіе имѣетъ болѣе страдательный харак-
теръ и слѣдственно не можетъ быть вполнѣ критиче-
скимъ, гдѣ количество испражняемой крови очень ве-
лико, изливаемая струя сильная, конечности холодны,
лицо блѣдное, жилобіеніе слабое, силы больного и преж-
де были въ упадкѣ, да и самое кровотеченіе случается у
молодыхъ субъектовъ, то его можно принять за припадоч-
ное, слѣдственно требующее прекращенія. Для сего назна-
чается положеніе тѣла съ возвышенною головою и обращен-
ными къ верху глазами, прохладная температура въ ком-
натѣ, употребленіе внутрь прохладжающихъ напитковъ
(N 19.), воды съ уксусомъ и т. п. холодное обмываніе

лба, затылка, висковъ и лица, втягиваніе или впрыскиваніе въ носъ холодной воды. Въ некоторыхъ слу-чаяхъ вмѣсто простой воды, употребляется уксусъ, раз-веденій водою, растворъ квасцовъ (N 60), либо желѣз-наго купороса, отвары различныхъ стягивающихъ ве-ществъ. Вмѣсто вприскиванія, въ цѣкоторыхъ особенныхъ случаяхъ, вкладываются въ носъ свертки корпіи, овла-жаемые вышеозначенными жидкостями, или обсыпаемые порошкомъ квасцовъ и другихъ стягивающихъ веществъ, если только они не причиняютъ чиханія, котораго все-гда надлежитъ избѣгать, какъ усиливающаго кровотече-ніе. Когда же всякое всприскованіе и вкладываніе корпіи въ носъ производить чиханіе, то лучше оставить ихъ безъ употребленія и ограничиваться другими средст-вами. Въ крайнихъ только случаяхъ, угрожающихъ ве-ликою опасностію, можно тампонировать носъ корпіею, овлажнено сперва личнымъ бѣлкомъ и потомъ обсыпан-ною стягивающими порошками изъ квасцовъ, камеди кип-по, сока катеху и т. п. Иногда необходимо нужно там-понировать обѣ ноздри, конечно такъ, чтобы корпія по прекращеніи кровотеченія, удобно могла быть извлекаема изъ носа.

Если кровь вытекаетъ изъ сосудовъ, обрѣтающихся гораздо выше, такъ что вкладываляемая корпія не дости-гаетъ кровоточиваго мѣста, то можно посредствомъ *Белло-ковой* трубки вводить свертокъ корпіи въ заднее отвер-стіе носа и такимъ образомъ выполнить всю полость онаго. Способъ сей можетъ быть совершенно надеженъ тамъ, гдѣ онъ не возбуждаетъ слишкомъ большаго раз-драженія и переносится болѣымъ безъ вреда. Если

кровоточивое мѣсто находится въ передней части носа, то для отвращенія кровоизліянія достаточно продолжительное сжиманіе оного.

Эмпирическія средства для сего, известныя болѣе въ народномъ употребленіи суть: прикладываніе холодной воды, снѣга, либо льда къ дѣтороднымъ частямъ, крѣпкое обвязываніе плечей и ляшекъ, жеваніе пропускной бумаги, привязываніе изрѣзанныхъ луковицъ къ затылку и пр.

Кровохарканіе. (Haemoptysis).

Син. кровавый кашель; кровавая харкотина; кровотеченіе изъ легкихъ; hæmoptœ; tussis hæmoptoica; emoptœ; pneumorrhagia; sanguinis sputum; cruenta expulsiō, sputa cruenta.

§ 99.

Такъ называется изверженіе съ кашлемъ или только съ перхotoю, смѣшанной съ слизью, гноемъ и пр. либо чистой, свѣтлой, пѣнистой крови изъ дыхательныхъ путей, послѣ предшествовавшаго ощущенія умноженной теплоты, давленія и боли въ груди, равно какъ щекотанія, восходящаго въ верхъ къ глоткѣ.

То состояніе, при которомъ кровь не извергается къ наружки, а проходитъ въ кѣтчатое сплетеніе легкихъ

называется *легочным ударом* (apoplexia pulmonum),
(Laennec).

§ 100.

Явления различаются здесь смотря потому, извѣр-
гается ли кровь смѣшанная съ другими веществами, или
совершенно чистая.

1.) Когда кровь выходитъ смѣшанная со слизью, то
на сей послѣдней либо показываются только кровяные
полоски, либо она единообразно смѣшивается съ кровью,
точно такъ, какъ случается при воспаленіи легкаго.
Здѣсь примѣщающаяся къ харкотинѣ кровь бываетъ
свѣтло-красная и большею частію кровоиспражненію
предшествуетъ довольно сильный кашель, затруднитель-
ное дыханіе, судорожное стѣсненіе груди, особенно при
глубокомъ вдыханіи, а иногда и скрипѣніе въ груди.
Выхожденіе крови съ гноемъ встрѣчается только въ ча-
хоткахъ. Здѣсь также показывается она либо кровяными
полосками на гноѣ, либо смѣшанными съ нимъ кровяными
массами, кои въ цвѣтѣ, количествѣ и составѣ своемъ
очень различаются. Если кровь извергается тотчасъ по-
разрывѣ разѣдаемой гноемъ части, то она имѣетъ бо-
льшо красный цвѣтъ и находится болѣе въ жидкому видѣ,
хотя количество ея въ семь разъ бываетъ иногда очень
значительное; напротивъ того когда кровь, выступивши
изъ сосудовъ, задерживается нарочитое время, то она
представляетъ гораздо темнѣйшій цвѣтъ и плотнѣйшій
составъ, образующійся изъ комковъ, или даже изъ до-
вольно плотныхъ свертковъ. Совершенно черная кровь

бываетъ только тогда, когда она выходитъ изъ варикозно-растянутыхъ венъ, вскрывшихся вдругъ въ вѣтви дыхательного горла.

II.) Тамъ, гдѣ кровь извергается чистою, не смѣшаною, въ болѣе или менѣе значительномъ количествѣ, кровохарканіе часто наступаетъ мгновенно, безъ всякихъ *предвестниковъ*, а часто ему предшествуютъ: стѣсненіе, чувство давленія и тяжести въ груди, сильное ощущительное біеніе сердца; сжатое жилобіеніе, а иногда и летучій жаръ въ щекахъ, часто также легкій ознобъ, усталость и разбитость въ членахъ, сладковатый вкусъ ворту. Вслѣдъ за симъ вдругъ дѣлается чувство теплоты и волненіе въ груди, при чемъ вмѣстѣ съ кашлемъ, либо съ легкою перхотою, возбуждаемою щекотаніемъ въ дыхательномъ горлѣ, испражняется кровь, иногда только нѣсколькими изверженіями, наполняющими ротъ, а иногда въ такихъ массахъ, что показывается вмѣстѣ ртомъ и носомъ и даже сорвотою, если часть крови поглощается пищепріемнымъ горломъ. Въ такихъ случаяхъ лицо больнаго покрывается смертною блѣдностію, либо дѣлается синевато-краснымъ, раздутымъ (рѣже), на лбу выступаетъ холодный потъ, тѣло совершенно охладѣваетъ, глаза болѣе или менѣе закрываются, жилобіеніе едва ощущается или совершенно исчезаетъ, дыханіе стѣсняется насильственнымъ, судорожнымъ сжатіемъ груди, голосъ теряется, или дѣлается запыхающимся, едва внятнымъ; наконецъ больной поражается обморокомъ, во время коего кровотеченіе останавливается, или онъ умираетъ мгновенно. Иногда къ означеннымъ припадкамъ присоединяются еще корчи.

Если больной переживаетъ столь сильный и опасный припадокъ, то самосовѣденіе вскорѣ возвращается, дыханіе дѣлается спокойнѣе и жилобіеніе возвышается, иногда же на долгое время остается мягкимъ и слабымъ, (*Laennec*) или дрожащимъ (*vibrans*).

§ 101.

Распознаваніе. Мѣсто, изъ коего собственно выходитъ кровь въ сей болѣзни, можетъ быть узнаваемо иногда по мѣсто-пребыванію болѣзненнаго ощущенія, причиняющаго кашель. Такимъ образомъ, если чувствуется жаръ, щекотаніе и жженіе въ дыхательномъ горлѣ, то въ ономъ безъ сомнѣнія долженъ находиться источникъ кровотеченія; если же примѣчается ощущеніе раненія и раздраженія къ кашлю въ вѣтвяхъ дыхательного горла, то въ нихъ надлежитъ также искать и происхожденія кровотеченія. Сверхъ того о мѣстѣ, изъ котораго выходитъ кровь, можно заключать съ некоторою вѣроятностію по явленіямъ, замѣчаемымъ надъ больнымъ при различныхъ положеніяхъ его. Такимъ образомъ, если онъ ложится на здоровый бокъ, то кровь вытекая изъ больнаго легкаго въ бронхиальныя вѣтви возбуждаетъ раздраженіе къ кашлю и новое изверженіе крови; если же больной перемѣняетъ свое положеніе на другой бокъ, то припадки таковые умѣряются (*Haase*). Изслѣдованія, дѣлаемыя посредствомъ стетоскопа доставляютъ слабыя свѣдѣнія, тѣмъ болѣе, что изливаемая при семъ кровь занимаетъ мѣсто не большой обятности, а часто обрѣтается въ такой сторонѣ, гдѣ употребленіе сего инструм-

мента во все не доставляетъ вѣрныхъ результатовъ. По Laennec—у въ бронхіальному кровохарканіи, рождающемся исключительно отъ выпотѣнія, слышится обыкновенный шумъ отъ дыханія во всей обятности груди, а въ самыхъ вѣтвяхъ дыхательного горла слабое скрипѣніе, выражаемое обыкновенно движеніемъ слизи; напротивъ того при изліяніи въ существѣ легкихъ (aroplexia pulmonum) таковое скрипѣніе бываетъ очень сильное и, повидимому, безпрестанно увеличивается. Иногда слышенъ даже шумъ отъ разрыва.

Что касается до тѣхъ болѣзней, съ коими кровохарканіе смѣшиваются иногда, особенно не внимательными, то таковая суть: кровотеченіе изъ носа, зѣва, полости рта и желудка, также воспаленія легкаго и вѣтвей дыхательного горла. Для отличія сихъ болѣзнейшихъ состояній достаточно уже одно внимательное разслѣдованіе часто только вѣнчикахъ обстоятельствъ, а иногда и внутреннихъ содержаній.

§ 102.

Течение. Болѣзнь сія, оказавшись одинъ разъ, легко повторяется и удобно дѣлаетъ возвраты, особенно въ первые дни, въ кои она обнаруживается болѣею частію пѣсколькими повтореніями. Иногда кровохарканіе оказывается по временамъ пѣсколько лѣтъ и только въ рѣдкихъ случаяхъ проходить безъ всякаго вреда для груди. Это случается наиболѣе тамъ, где оно производится виѣшими причинами, также у особъ, не расположенныхъ къ чахоткѣ. Въ иѣкоторыхъ случаяхъ оно разрѣ-

шается правильнымъ обнаруживаніемъ мѣсячнаго очищенія или геморроя; большею же частію переходитъ въ чахотку легкихъ, нерѣдко также оно бываетъ припадкомъ долгое время уже существующей чахотки, которая только при появлѣніи его дѣлается явственна. Смерть можетъ послѣдовать здѣсь, какъ отъ усилвшагося кровотеченія, такъ и отъ легочной чахотки, произраождающейся отъ онаго.

§ 103.

Причины. Кровохарканіе обнаруживается преимущественно въ возрастѣ отъ 18 до 35 лѣтъ, наиболѣе у особъ, имѣющихъ чахотное расположеніе, слѣдственно одаренныхъ длиною шею, очень выдающимися лопатками, слишкомъ тѣсною грудью, ограниченою краснотою щекъ и пр. Большею частію также оно оказывается у тѣхъ, кои въ дѣтствѣ часто имѣли кровотеченіе изъ носа и у коихъ случается по временамъ трепетаніе сердца.

Частѣйшія возбуждающія причины сей болѣзни суть: язвы легкихъ у чахотныхъ особъ, очень сильное біеніе сердца отъ несвободнаго кровообращенія въ груди, особенно при разрастаніи онаго (*hypertrophia cordis*), при грудной водянной болѣзни, при застояхъ въ брюшныхъ сосудахъ, раздутости селезенки и печени и при отступившемъ почечуйномъ страданіи. Сверхъ сего сюда принадлежать также: чрезмѣрный крикъ, пѣніе, натужное надуваніе духовыхъ инструментовъ, капель, ударъ по груди, раненіе легкаго, вдыханіе острыхъ па-

ровъ, чрезмѣрное движеніе тѣла, употребленіе горячительныхъ напитковъ и многія другія причины, дѣйствующія вообще на произведеніе кровотеченія.

§ 104.

Предсказаніе. Кровохарканіе въ большой части случаевъ составляетъ опасный припадокъ, ибо кромѣ того, что оно подаетъ поводъ къ неизлѣчимымъ разстройствамъ въ страждущемъ органѣ, да и самое количество крови, извергаемой при ономъ, часто усиливается до опасенія мгновеннаго наступленія смерти.

При врожденномъ расположениі къ чахоткѣ, либо существующемъ изъязвленіи легкаго, оно наиболѣе опасно; посему скорѣе можно ожидать исцѣленія тамъ, где такового расположениія не бываетъ и где органическая ткань повреждается отъ мгновеннаго напора крови, или отъ раненія, хотя и въ семъ случаѣ легко рождается легочная чахотка. Гораздо меньшему сомнѣнію подлежитъ то кровохарканіе, при которомъ кровь вытекаетъ только изъ слизистой оболочки гортани, дыхательного горла или вѣтвией онаго, тѣмъ болѣе, если изверженіе оной не очень значительно.

§ 105.

Лѣченіе кровохарканія должно быть вообще дѣятельное, производимое безъ всякаго отлагательства. Здѣсь тотчасъ должно освѣдомиться въ точности о всѣхъ обстоятельствахъ, относящихся до пола, возраста, тѣло-

сложенія и различныхъ болѣзнейныхъ расположенийъ больнаго, равно какъ предшествовавшихъ причинныхъ моментовъ, дѣятельного или страдательного характера болѣзни, сопряженій и т. п. Важнѣйшая обязанность врача относится не только до правильнаго лѣченія кровохарканія, когда оно окажется на самоть дѣлѣ, но также до *предупрежденія и уничтоженія возвратовъ* его по совершенномъ устраниеніи. Въ некоторыхъ впрочемъ особенныхъ случаяхъ полезно даже не слишкомъ скоро прекращать таковое кровотеченіе, особенно если отъ мгновеннаго прекращенія его предвидится опасность смертельныхъ, или покрайней мѣрѣ опасныхъ скопленій къ другимъ благороднымъ органамъ, напр. къ мозгу, сердцу и т. п. что случается наиболѣе тамъ, гдѣ кровотеченіе сего рода бываетъ замѣннаго, или неправильнно-критического свойства.

§ 106.

Предупрежденіе. При обнаруживаніи вышеизначенныхъ предвестниковъ (§ 100), угрожающихъ наступлениемъ кровохарканія, должно стараться уклонять, какъ можно скорѣе, всѣ вредности, могущія производить всленіе крови и скопленіе къ легкимъ и предписывать діату, содержаніе и лѣкарства, умѣряющія существующее всленіе крови и освобождающія грудь отъ устремляющагося напора крови къ оной. Больному назначается по возможности величайшее душевное и тѣлесное спокойствіе, дѣлаются утѣшительныя и успокаивающія увѣщанія со стороны врача; предписывается покойное, болѣе прямое

и сидячее положение, удаление всякаго теснаго платья и всего, что сдавливает кругообразеніе, пребываніе въ болѣе прохладной, имѣющей здоровый воздухъ комнатѣ, избѣжаніе всякаго напряженія при разговорѣ, всякаго сотрясенія груди кашлемъ, чиханіемъ, смѣхомъ и т. п. соблюденіе строгой, простой, тощей и противувоспалительной диеты, покрайней мѣрѣ состоящей болѣе изъ растѣній. Сверхъ сего нужно стараться о томъ, чтобы отправленія брюшныхъ внутренностей находились въ свободномъ состояніи и не имѣлось бы въ онихъ ни какихъ накоплений и засореній. Здѣсь не обходимо также дѣлать отведенія къ нижнимъ частямъ отъ груди посредствомъ теплыхъ ножныхъ ваннъ, обмыванія ногъ теплымъ уксусомъ, согреванія ихъ кувшинами, наполненными теплою водою и т. п. и предписывать прохладительные напитки изъ кислыхъ растительныхъ соковъ (N 19.), а при значительныхъ волнепіяхъ давать даже порошки изъ винаго камня, селитры (N 11.) и т. п. Уполнокровныхъ можно иногда дѣлать для сего и кровопусканіе изъ руки.

§ 107.

Лѣченіе. Существующее уже кровохарканіе должно быть пользуемо по свойству его. Если оно представляетъ стеническій характеръ, то въ большей части случаевъ полезно и необходимо дѣлать общее кровопусканіе и притомъ тѣмъ обильнѣе и чаще, чѣмъ сильнѣе наступаетъ болѣнь, и чѣмъ крѣпче, полнокровнѣе и живѣе самъ больной. Если же кровохарканіемъ извергается такое множество крови, что больной находится въ опас-

ности опустошеннія крови, или онъ и безъ того уже очень ослабленъ, имѣть притомъ дряхлое, первозное сложеніе, да и самое стеническое свойство болѣзни выражается не очень явственно, то съ кровопусканіемъ надлежить поступать осторожно. Весьма часто случается, что при настоящемъ дѣятельномъ свойствѣ сего кровотеченія, жилобіеніе бываетъ малое, сжатое и судорожное, лице больнаго блѣдное и впалое, но при всемъ томъ не должно обманываться сими явленіями, ибо они зависятъ не рѣдко отъ одного испуга, раждающагося при появленіи кровохарканія. Повтореніе кровопусканія преимущественно тогда требуется, когда существуютъ боли и стѣсненіе въ груди, трудное дыханіе и другіе признаки настоящаго воспалительного состоянія, или явленія, доказывающія присудствіе легочнаго пострѣла. Кровопусканіе вообще производится на рукѣ, но при особенныхъ обстоятельствахъ, напр. при закрывшемся мѣсячномъ очищеніи, или геморроѣ, полезно также производить его и на ногѣ. Піявки могутъ вознаграждать общее кровопусканіе тамъ, где кровохарканіе весьма умѣренно и почти не представляетъ дѣятельного свойства, когда больной очень слабъ и изнуренъ и когда кровотеченіе зависить отъ воспященія почечуя, мѣсячнаго очищенія и пр., въ какомъ случаѣ онъ наиболѣе приставляются къ проходу, къ проходной промежности, къ дѣтороднымъ частямъ, къ внутренней поверхности ляшекъ и т. д.

§ 108.

Что касается до инутреннихъ средствъ, то употребле-

иie ихъ должно быть также соображаемо со степенью дѣятельнаго состоянія болѣзни. Въ чисто стеническомъ кровохарканіи доставляютъ преимущественную пользу селитра, очищенный винный камень, виннокаменная кислота, лимонный сокъ, яблочно-кислый поташъ и другія среднія соли; однакожъ средства таковыя для избѣжанія всякаго раздраженія къ кашлю, не обходимо должны быть соединяемы съ слизистыми, оболакивающими (N 61) лѣкарствами, к. т. съ миндалевою, маковою эмульсіею, съ отваромъ перловыхъ крупъ, или алтейнаго корня, съ сыропомъ солодковаго корня и пр. (N 35. 62.)

Когда примѣчается эретическое состояніе, зависящее болѣе отъ перваго раздраженія грудныхъ органовъ, то показуются успокаивающія лѣкарства: синильная кислота (N 30), лавровицневая вода (N 5), а при недостаткѣ оной перегнанная изъ горькихъ миндалей вода, экстрактъ, наливка и масло белены (N 1.), иногда наперстянка (N 6, 54.), кодеинъ (N 2.), лактукарій (N 3.), уксусо-кислый и лимонно-кислый морфій, которые предписываются или сами по себѣ, или въ соединеніи съ вышеозначенными чистыми противувоспалительными и оболакивающими средствами.

Тамъ, гдѣ стеническое свойство не явственно представляется, можно давать напатырь и другія среднія соли, или разведенную сѣрную кислоту (N 16), Галлеровъ кислый алексиръ (N 57.), фосфорную кислоту (N 17), иногда креосотъ (N 55) и т. п. также съ приличными оболакивающими соединеніями. Всѣ напитки, даваемые въ семь случаѣ больному, должны быть те-

пловаты, ибо холодные легко возбуждаютъ кашель. Важное обстоятельство, могущее служить для предохраненія напора крови къ груди, составляеть поддержаніе свободнаго испражненія напизъ, которое въ семъ случаѣ можетъ быть производимо умѣренными пріемами среднихъ слабительныхъ солей, наппаче фосфорокислой соды (N 15.), сѣрнокислой магнезіи (N 20.), и сѣрнокислого поташа (N 63.), также манною, тамариидами (N 13.), очищеннымъ виннымъ камнемъ и легкими промывательными (N 37.). При семъ также необходимо нужны отведенія посредствомъ ножныхъ ваннъ съ золою, солью, горчицею, уксусомъ и т. п.

§ 109.

Если напротивъ того *кровохарканіе* представляетъ страдательный характеръ, или оно изъ дѣятельнаго состоянія перешло уже въ страдательное, то при лѣченіи нужно избѣгать кровопусканій и антифлогистической способъ замѣнять болѣе крѣпительнымъ. Однакожъ скорое устраненіе кровотеченія здесь еще болѣе необходимо, нежели при дѣятельномъ и потому оно составляетъ главное此刻аніе. Для удовлетворенія оному и для избѣжанія опасной потери крови предлагаемы были т. н. специфически дѣйствующія противъ кровохарканія лѣкарства (rem. haemoptoica), какъ напр. красные кораллы (*corallium rubrum*), *fungus Melitensis* (*cynomotium coccineum*), *electuarium Haelidaci Paduanii*, *liquor stypiticus Loofii* ph. Bat.; *pulvis Fowleri*, *Faynardi*, *aqua Bellini* etc. Часто весьма дѣйствительныя средства состав-

ляютъ здѣсь обовязываніе конечностей поближе къ туловищу, обильное употреблешіе внутрь повареной соли и холодной воды, прикладываніе холодныхъ примочекъ съ уксусомъ или со льдомъ на груди, вмѣстѣ съ теплою ножною ванною. Внутрь съ болѣшимъ успѣхомъ даются минеральная кислоты, напиache сѣрия (N 57.), соляная (N 64.) и фосфорная (N 17.) въ какомъ либодѣ слизистомъ вегикулѣ, а если болѣзнь имѣеть болѣе медленное теченіе, то стягивающія лѣкарства, к. с. квасцы, квасцовая сыворотка, сокъ катеху (N 65), камедь кино, корица, кампешево дерево (N 66), корень ратаніи (N 23), перуанская корка (N 9.), желѣзный и мѣдный купоросъ, уксусокислый свинецъ, креосотъ (N 55.) и т. п.

Таковое лѣченіе должно поддерживать приличную простую діэтою, употребленіемъ простой холодной воды, или съ прибавленіемъ нѣжныхъ кислотъ, сыропа грапатовъ, также, смотря по обстоятельствамъ, отведеніями отъ груди къ нижнимъ частямъ тѣла.

§ 110.

Особеннаго вниманія при лѣченіи кровохарканія заслуживаетъ еще *присудство сопряженій и такихъ состояній, при которыхъ оно существуетъ, какъ замыкающая болѣзнь*. Такимъ образомъ часто лѣченіе кровохарканія до тѣхъ поръ не удается, пока не возстановлено будетъ кровотеченіе, отъ закрытія коего оно произошло. Тоже самое случается, если кровохарканіе рождается въ слѣдствіе отступившаго внутрь ревматизма, составолома, простудныхъ и накожныхъ болѣзней, въ

каковыхъ случаихъ вѣрное вспомоществованіе доставляютъ нерѣдко противураздраженія и отведенія въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ существовала первоначальная болѣзнь. Само собою разумѣется также, что если болѣзнь сія со-пряжена съ воспаленіемъ легкаго, съ чахоткою, по-роками сердца, страданіемъ печени и т. п., то лѣченіе должно быть измѣняемо всегда соотвѣтственно таковымъ состояніямъ.

§ 111.

Лѣченіе возвратовъ. Однимъ устраниеніемъ кроваваго кашля не должно довольствоваться, а стараться также предотвращать, какъ возвраты болѣзни, такъ и развитіе послѣдственныхъ страданій. Посему съ давниго времени поставляется правиломъ, что для заживленія сосудовъ, изъ которыхъ выходитъ кровь, потребно сорока-дневное спокойное содержаніе съ избѣжаніемъ вся-каго разговора, смѣха и другихъ движеній груди. Если же во время выздоровленія появляются признаки, по коимъ можно опасаться возврата, то надлежитъ поступать во всемъ такъ, какъ упомянуто выше (§ 106). Вообще нужно отвращать все, что содѣйствуетъ полнокровію и скопленію крови въ легкихъ; а потому и самыя крѣпительно-питательныя средства должны быть употребляемы съ осторожностю. Сколь ни ощутительна польза и необходимость ихъ въ нѣкоторыхъ обстоятельствахъ, напр. при изнуреніи силъ и при большомъ ис-тощеніи тѣла, но не смотря на это, они, будучи употреблены слишкомъ рано, или въ очень обильномъ ко-

личествѣ, легко дѣлаются вредными. Сначала для восстановленія силъ хорошо дѣйствуютъ легко варимыя пищательныя вещества, особенно студени, хоропшіе бульоны, молочная пища и т. п. Въ послѣдствіи времени, если нужно, даются горькія крѣпительныя лѣкарства, исландскій мохъ, горечавка, симаруба и пр.

Кровоизліянія пищеварительныхъ органовъ.
(Gastro- et enterorrhagiae).

Син. Кровавая рвота, кровотеченіе желудка и кишекъ; черная немочь; vomitus cruentus; haematemesis; gastrorrhagia, enterorrhagia; melaena; morbus niger Hippocratis, fluxus spleneticus.

§ 112.

Подъ сими названіями разумѣются кровоизліянія въ желудокъ и кишки изъ сосудовъ желудка, тонкихъ и толстыхъ кишекъ, также смежныхъ съ ними органовъ, извергаemыя верхомъ чрезъ рвоту, либо низомъ съ испражненіями кала, либо тѣмъ и другимъ путемъ вмѣстѣ.

§ 113.

Явленія. Кровоиспражненія сіи бываютъ троекаго рода: а.) *припадочное*, б.) *самостоятельное* и с.) *черно-немочное*.

1.) *Пропадочное кровоиспражнение* изъ желудка и кишекъ (*gastro-et enterorrhagia symptomatica*). случается въ многоразличныхъ болѣзниенныхъ состояніяхъ, въ особенности при отравленіяхъ нѣкоторыми острymi ядами, при поглощеніи острыхъ рѣжущихъ, или разъѣдающихъ веществъ, при внутреннихъ изъязвленіяхъ кишечного канала, въ такъ наз. брюшномъ тифѣ, при крайнемъ разложеніи крови, какъ случается въ высшей степени гнилой горячки, въ натужномъ кровавомъ поносѣ, въ геморроидальныхъ кровотеченіяхъ и пр. Во всѣхъ сихъ случаяхъ кровоиспражненіе такового рода сопряжено съ язвеніями той болѣзни, въ которой оно обнаруживается, и самая кровь бываетъ очень различная, какъ въ отношеніи качества, такъ и количества. Иногда испражняется только малое количество алої жидкой крови, а иногда выходитъ она въ довольно значительномъ количествѣ, чаще въ свернутомъ, рѣже въ разрѣщенномъ состояніи, цвѣта болѣе темнаго, рѣдко шоколадного или на кофейный осадокъ похожаго и въ смѣшаніи либо съ одною пищею и экскрементами, либо со слизью, желчью и даже съ гноемъ. Нерѣдко кровоиспражненію предшествуютъ припадки скопленія крови въ брюшныхъ органахъ (§ 55); но во всякомъ случаѣ выхожденіе крови сопряжено болѣе съ облегченіемъ тягостныхъ припадковъ, нежели съ ожесточеніемъ ихъ.

2.) *Самостоятельное кровоиспражнение* изъ желудка и кишекъ (*gastro-et enterorrhagia substantialis, haematemesis p. s. d.*) зависитъ отъ непосредственныхъ разстройствъ брюшныхъ органовъ, восплющающихъ свобод-

ному кровообращенію въ брюхѣ. Ему предшествуютъ большею частію: недостатокъ позыва на пищу, давленіе и напряженіе подъ ложечкою, желудочныя корчи, чувство теплоты въ желудкѣ, наклонность къ рвотѣ, сладковатый вкусъ; иногда блѣдность лица, охлажденіе конечностей, спаденіе жилобіенія и наклонность къ обмороку. Вскорѣ за симъ появляется и самая рвота, коею извергается большее или меньшее количество жидкой, либо створоженной крови, при чмъ силы больнаго чато упадаютъ до такой степени, что онъ уподобляется умирающему. По прошествіи нѣсколькихъ часовъ створоженная кровь выходитъ обыкновенно и при испражненіи низа. Въ рѣдкихъ случаяхъ скопляющаяся въ желудкѣ кровь неизвергается рвотою, но оставаясь въ ономъ растягиваетъ желудокъ до того, что иногда и снаружи примѣтна бываетъ опухоль въ желудочной сторонѣ. При семъ обнаруживаются всѣ припадки опустошенія крови, а отъ растяженія столь важной внутренности, чрезвычайно мучительное состояніе. Когда кровь изливается не въ желудокъ, а въ кишкѣ, то оказываются: блѣдность губъ и лица, охлажденіе членовъ, наклонность къ обмороку, ощущеніе изліянія теплой жидкости въ кишкѣ, иногда нѣкоторая вздутисть живота и выхожденіе разомъ болѣе или менѣе значительныхъ массъ створоженной крови.

Свойство испражняемой при семъ крови бываетъ различное. Если она тотчасъ по изліяніи извергается къ снаружи, то представляется болѣе жидкую, нежели створоженою; если же задерживается нѣсколько времени въ желудкѣ или кишкахъ, то всегда выходитъ въ темно-

красныхъ свернутыхъ комкахъ, и по видимому, чаще бываетъ венознаго происхожденія, нежели артеріальнаго. Что касается до количества крови, то оно въ обыкновенныхъ случаяхъ простирается отъ нѣсколькихъ упцовыхъ до нѣсколькихъ фунтовъ. Иногда же выходитъ ее неимѣвѣрное количество. Вообще оно бываетъ тѣмъ болѣе, чѣмъ чаще возвращается болѣзнь и чѣмъ значительнѣе органические пороки, причиняющіе сю болязнь.

3.) *Чернонемогное кровоизверженіе* (gastro-et enterorrhagia melanotica, melaena, morbus niger Hippocratis) есть хроническое болѣзненное состояніе, соединенное съ повторительно возвращающимся изверженіемъ рвотою и низомъ темной, часто черноватой матеріи, которая либо смѣшивается съ кровью, либо состоитъ вся изъ темной, какъ бы въ уголь превращенной крови. Страждущіе имъ болѣшею частію имѣютъ блѣдный, грязноzemлянистый обликъ, часто за долгое время до наступленія рвоты подвергаются припадкамъ пищеваренія, напаече кислотамъ и скогѣ, желудочнымъ спазмамъ, надмѣнію желудочной, либо селезеночной стороны, также большої усталости и разстройствамъ въ сердечныхъ чувствованіяхъ. Наконецъ, при холодномъ потѣ на лбу и наклонности къ обмороку, появляется рвота, коею извергается весьма кислая, оскому на зубахъ производящая темная матерія, подобная дрожжамъ, или жидкости коракатицъ, либо чистая, черной смолѣ подобная, створоженная кровь. Подобныя вещества испражняются также низомъ, и если количество ихъ чрезмѣрно умножается, то рождаются дурныя послѣдствія потери крови,

хотя впрочемъ припадки, обнаруживавшіеся до приступа кровоизверженія, обыкновенно уменшаются.

§ 114.

Исходы. Кровоизверженія изъ желудка и кишекъ, если они не зависятъ отъ какого либо упорного разстройства, переходятъ современемъ въ совершенное здоровье, либо превращаются въ слабѣйшую форму, напр. въ геморроидальное теченіе. Однакожъ, при усиливающихся до чрезмѣрности кровотеченіяхъ, они могутъ нанести мгновенную смерть, а при частыхъ возвратахъ, общее изнуреніе и водянную болѣзнь.

§ 115.

Распознаваніе. Кровотеченія сіи могутъ быть смѣшиваемы иногда съ испражненіями, дѣлающимися случайно послѣ поглощенія крови, или послѣ употребленія киселя изъ вишень, черники, бурачнаго сока и т. п. но таковыя отличаются тѣмъ, что при нихъ не оказывается никакихъ признаковъ потери крови, если впрочемъ поглощаемая кровь не есть порожденіе какого либо важнаго кровотеченія, напр. кровохарканія, при коемъ также оказываются припадки, свойственные сему роду кровотеченій. Здѣсь подробнѣйшее освѣдомленіе въ про-исходеніи кровотеченія можно заимствовать изъ расположения и облика больнаго, изъ предвестниковъ болѣзни и качества самой крови. У дѣтей поглощаемая изъ соковъ кровь можетъ также причинить значительное

страданіе, оказывающее однакожъ другія послѣдствія, но не припадки кровотеченія.

§ 116.

Причины. Расположеніе къ самостоятельному страданію сего рода имѣютъ болѣе женщины, нежели мужчины, преимущественно въ климактерическихъ лѣтахъ; чаще всего особы холерического и меланхолического temperamenta.

Побудительными причинами бывають ракообразные и другія язвы желудка и кишечнаго канала, пороки селезенки и печени, застои въ воротной системѣ, аневризмы, закрытіе мѣсячного очищенія, отступившій почечуй, сидячій родъ жизни, печаль, гневъ, употребленіе горячительныхъ и острыхъ веществъ, наипаче острыхъ ядовъ, раздраженіе отъ глистъ, механическія поврежденія ударами, проглоченнымъ стекломъ, давленіемъ беременной матки на сосуды брюха, сильное движеніе тѣла, цыпга и пр.

§ 117.

Сущность. Въ произрожденіи кровянистыхъ испражнений пищеварительного канала имѣютъ участіе либо

а.) *Дѣятельное состояніе*, зависящее отъ мѣстнаго раздраженія, причиняющаго скопленіе въ брюшныхъ внутренностяхъ, въ какомъ случаѣ и самое кровоисправленіе удерживаетъ болѣе острую форму, характеръ стеническій, или покрайней мѣрѣ эретическій и случаст-

ся преимущественно у полносочныхъ особъ, какъ замѣнное кровоиспражненіе (*haemorrhagia vicaria*); либо

b) *Страдательное состояніе*, зависящее отъ застоевъ крои въ брюшныхъ органахъ, препятствующихъ прохожденію венозной крови и рождающихъ растяженія и разслабленія венъ.

Самое кровоизліяніе въ желудокъ и кишкы можетъ совершаться либо чрезъ просасываніе, пропотѣніе крови, какъ случается болѣе въ острыхъ формахъ сего страданія; либо чрезъ взаимное сообщеніе сосудовъ (*anastomosis*), какъ бываетъ въ хроническихъ формахъ, напаче въ чернонемочномъ кровоизверженіи; либо наконецъ чрезъ органическое поврежденіе (*rhexis*), чрезъ разрывъ растяженной артеріи или вены, чрезъ разъяденіе волосныхъ сосудовъ язвами, острыми тѣлами и пр.

§ 118.

Предсказаніе здѣсь большею частію весьма не благопріятно. Впрочемъ бываютъ случаи, гдѣ болѣзнь сія не имѣть ни какихъ дурныхъ послѣдствій и даже можетъ быть полезною, критическою. Степень опасности присемь зависитъ преимущественно отъ важности внѣшнихъ и внутреннихъ причинныхъ моментовъ, отъ количества изливающей крови, частаго или рѣдкаго возврата, сложенія и возраста больнаго, равно какъ и сопряженій. Въ припадочномъ страданіи сего рода можно судить о послѣдствіяхъ по важности главной болѣзни, отъ которой оно зависитъ. Острая форма удобиѣе уклоняется, нежели хроническая. Обильная и часто возвращающаяся рвота

угрожаетъ, какъ послѣдствіями сильной потери крови, такъ и значительнымъ разстройствомъ, которое причиняется страданіями желудка и другихъ частей. Замѣнное кровоиспражненіе желудка и кишокъ, хотя часто доставляетъ пользу и облегченіе, но бываетъ также опасно, если дѣлается очень обильнымъ и привычнымъ. Самостоятельное и чернионемочное страданіе тѣмъ опаснѣе, чѣмъ сильнѣе и упорнѣе органическіе пороки брюшныхъ органовъ, на коихъ оно основывается. Если въ семъ случаѣ во время самаго приступа не наступаетъ смерть отъ потери крови, то мало по малу, особенно при частныхъ возвратахъ и упорности болѣзни, ослабляющей чрезмѣрно силы, обнаруживается изнуреніе всего тѣла, или водянная болѣзнь.

§ 118.

Лѣченіе кровавыхъ испражненій пищеварительныхъ органовъ должно быть соображеніо съ разностію ихъ причинъ, свойствомъ и сопряженіями. Слѣдственно въ каждомъ случаѣ весьма важно исклѣдывать произхожденіе болѣзни съ возможною точностію. Одно не посредственное устраненіе кровоиспражненія не всегда составляетъ здѣсь главное дѣло. Вообще разное свойство болѣзненнаго состоянія требуетъ различного способа лѣченія. Иначе пользуется припачочное и самостоятельное, а иначе острое и хроническое кровоизверженіе. Сверхъ того особенную осторожность надлежитъ наблюдать здѣсь при выборѣ лѣкарствъ, даже формы ихъ, тѣмъ болѣе, что самой желудокъ при таковомъ страданіи находится

въ рапченомъ состояніи и потому всѣ твердыя вещества, какъ порошки, пилули, куски, особенно минерального свойства, здѣсь не приличны. Подобная осторожность необходимо нужна и въ діететическихъ предписаніяхъ, не только во время болѣзни, но и при самомъ выздоровлении.

§ 119.

Первое необходимое показаніе лѣченія относится здѣсь до *удаленія причинъ*, съ устраниемъ коихъ только и удается излѣченіе, хотя впрочемъ оно рѣдко можетъ быть выполнямо такъ скоро и вѣрно, какъ бы надлежало, особенно при хроническомъ страданіи, — и въ то время непосредственное содѣйствіе искусства должно быть обращено не только на уклоненіе причинъ, но и на умѣреніе самыхъ приступовъ болѣзни.

а.) *Если болѣзнь зависитъ отъ мѣстно дѣйствующихъ причинъ*, то должно стараться содѣлать ихъ безвредными. Изъязвленія и ракообразныя перерожденія, по возможности, надлежитъ исцѣлять, поглощенные пьяники умерщвлять обильнымъ питьемъ соленої воды; разъѣдающіе металлическіе яды разлагать приличными противудѣйствующими средствами, а оstryя растительныя вещества притуплять слизистыми, масляными, молочными напитками, умѣряя при томъ и возвышенную раздражительность желудка приличнымъ способомъ.

б.) *Когда кровавыя испражненія сего рода сопровождаются гнилостнымъ состояніемъ въ тѣлѣ,* цинготнымъ разрѣшеніемъ крови, то нужно действовать

на кровь такими веществами, которые бы могли возвысить пластическое свойство ея и содѣлать массу оной гораздо плотнѣе.

с.) Если *причиною* сего кровоизверженія отступившій почечу́й или мыслячное очищеніе, то надлежитъ возстановить оныя, впрочемъ только такими средствами, кои не оказывали бы никакого раздраженія на желудокъ и кишкі, слѣдственно припусканіемъ пьявокъ къ проходу, или къ дѣтороднымъ частямъ, теплыми ножными ваннами, теплыми парами, смягчающими промывательными и употребленіемъ внутрь винного камня съ бурою (№ 43), либо сѣрою. Иногда въ соединеніи съ таковыми средствами отличную услугу оказываетъ кровопусканіе изъ ноги, дѣлаемое не столько для уменія крови, сколько для отведенія оной къ нижнимъ конечностямъ.

д.) *При застояхъ въ воротной системѣ, отвердніяхъ и разрастаніи селезенки, почени и пр.* составляющихъ собственно *предрасположеніе* къ самостоятельной формѣ такового страданія, употребляются обыкновенно разрѣшающія лѣкарства, однакожъ такія, кои не заключали бы въ себѣ слишкомъ острыхъ, раздражающихъ составныхъ частей и потому легкія вытяжки одуванчиковъ, мыльнянки, пандры, пырея съ небольшими приемами среднихъ солей (№ 38. 39.), особенно виннокаменно - кислыхъ и уксусокислыхъ. Болѣе всѣхъ заслужила вниманіе врачей лавровишиевая вода (*Thile-nius*), даваемая сперва по 10, а потомъ по 30 и по 60 капель, либо примѣшиваемая 1-2 драхмъ къ промывательнымъ. Тамъ, где позволяютъ обстоятельства, наибол-

шее пособіе можетъ оказывать въ семъ случаѣ приличное пользованіе минеральными водами, наипаче такими, кои, при разрѣшающемъ своею дѣйствіи, не производять никакихъ стремительныхъ испражненій и оборотовъ въ желудкѣ и кишкахъ. Таковы суть зельтерская, нарзанъ, маріенбадская, оберзальцбруненская и пр.

§ 120.

Второе показаніе лѣченія требуетъ точнаго соображенія со свойствомъ болѣзнипнаго состоянія.

а.) Когда изверженіе крови рвотою или низомъ сопровождается *дѣятельнымъ стеническимъ состояніемъ*, какъ случается при воспаленіяхъ брюшныхъ органовъ, наипаче селезенки, то оно уступаетъ только ослабляющему, антифлогистическому способу лѣченія и требуетъ въ такомъ разѣ кровопусканій, наипаче изъ венъ нижнихъ конечностей, также мѣстныхъ кровоотвлечений въ желудочной сторонѣ, либо, смотря по обстоятельствамъ, въ подреберьяхъ, въ проходѣ, проходной промежности, изъ дѣтородныхъ частей и пр. Внутрь, если впрочемъ позволяетъ возвышенная чувствительность и раздражительность желудка, предписываются прохладительные, кисловатые напитки (N 19.) и нѣжныя кисловатыя средства въ слизистомъ вегикулѣ, к. т. отваръ тамарицовъ (N 15), очищенный винный камень, виннокаменная кислота, прохладительныя соли (N 61.), даже селитра (N 62). Снаружи дѣлаются отведенія, теплые ножныя ванны и нѣжныя смягчающія промывательныя, кои тѣмъ нужнѣе, чѣмъ болѣе имѣется подозрѣнія на присудствіе

задержанія низа и скопленія крови и другихъ веществъ въ кишечномъ каналѣ.

б.) Состояніе *эретизма*, зависящее часто отъ антигистиического скопленія, требуетъ тѣхъ виѣпніихъ средствъ, коими возстановляются закрытыя кровотеченія (§ 20), а внутрь употребленія кисловатыхъ проходительныхъ напитковъ (N 16, 19), сока гранатовъ и пр. въ соединеніи съ средствами, притупляющими возвѣшенную чувствительность, особенно съ лавровишневою водою (N 5), съ уксусосахаромъ наперстянки (N 6) и даже съ опіемъ, если производимый имъ запоръ на низѣ, будетъ тотчасъ уничтожаемъ промывательнымъ съ прибавленіемъ уксусомеда.

с) *При страдательномъ свойствѣ* потребна большая осторожность въ назначеніи кровотвлечений. Здѣсь гораздо приличнѣе стягивающія, умѣренно возбуждающія и крѣпительныя лѣкарства, к. т. минеральная кислоты (N 64.), Галлеровъ кислый элексиръ (N 57.), квасцовала сыворотка, экстрактъ ратаніи, настойка корицы (N 9.), растворъ смирны въ известковой водѣ (*Haase*), холодная наливка хины (П. *Франкъ*), пѣкоторыя желѣзныя настоики (*Брера*) N 67.), терпентинное масло (*Adair*) по 10 капель на пріемъ съ яичнымъ желткомъ и водою въ эмульсіи. Однакожъ желудокъ во время изверженія крови дѣлается обыкновенно столь чувствительнымъ, что таковыхъ сильныхъ лѣкарствъ, безъ умноженія рвоты, едва ли можно давать, и потому лучше въ первое время лѣченія ограничиваться употребленіемъ успокоивающихъ (N 5), пѣжно стягивающихъ напитковъ (N 16, 19).

64.), отведеніями и другими виѣшними средствами, показанными при лѣченіи дѣятельной формы болѣзни.

§ 121.

Вообще лѣченіе сей болѣзни должно быть измѣняемо, смотря потому, находится ли больн. въ приступѣ дѣятельной кровавой рвоты; или приступъ миновалъ уже и существуетъ свободный промежутокъ.

Въ самомъ припадкѣ желудокъ не переносить никакихъ средствъ и часто даже самыя нѣжныя изъ нихъ умножаютъ рвоту. Впрочемъ, если потеря крови столь сильна, что можно опасаться смертельнаго послѣдствія; то необходимо нужно употреблять такія средства, кои производятъ скорое укрощеніе рвоты, хотя бы это казалось, повидимому, не совсѣмъ приличнымъ. Для сего *Rush* рекомендуетъ внутреннее употребленіе поваренной соли, другіе разведенную сѣрную кислоту въ соединеніи съ шафранною настойкою опія; а *Неиманнъ* даетъ сперва углекислую соду съ корицею (N 68.), потомъ уксусъ, настоенный на пряностяхъ съ прибавлениемъ, смотря по обстоятельствамъ, опія (N 69.). Иногда прекращаютъ кровотеченіе сего рода холодныя примочки, даже приложеніе снѣга или льда на желудочную сторону и употребленіе внутрь кусочковъ льда.

§ 122.

Изъ *припадковъ*, оказывающихся присемъ, важнѣйшіе суть обмороки, кои должно стараться удалять умѣрен-

ными раздраженіями на нижнихъ конечностяхъ, втира-
ніемъ ароматныхъ возбуждающихъ средствъ на вискахъ
и другихъ частяхъ, орошеніемъ лица холодною водою,
нюханіемъ освѣжающихъ веществъ (N 59.) и т. п. не при-
водя впрочемъ тѣла въ насильственное движение и при-
сматривая также, чтобы масса крови, скопляющаяся въ
въ полости зѣва, непричинила припадковъ удушенія.

Когда параксизмъ рвоты миновался, то нужно въ про-
долженіи долгаго времени наблюдать больному соверше-
нное спокойствіе, какъ душевное, такъ и тѣлесное, нахо-
диться болѣе въ горизонтальномъ положеніи и употреб-
лять въ расчетливыхъ пріемахъ такія лѣкарства, кото-
рыя бы достаточно питали организмъ, потерявшій, мо-
жетъ быть, много крови и вмѣстѣ съ тѣмъ отвращали
всякую наклонность къ рвотѣ. Такъ дѣйствуютъ, кажет-
ся, студень оленьяго рога съ настойкою корицы, также
коричневая вода съ яичнымъ желткомъ (N 70), напитки,
приготавляемые съ лимоннымъ сокомъ, сыворотки про-
стая и квасцовыя, пахтанье. Изъ питательныхъ средствъ
въ началѣ можно давать только жидкія, слизистыя ве-
щества, наипаче студени, вообще болѣе холодныя и
въ маломъ количествѣ. Когда нужно произвести испраж-
неніе низа и промывательный недостаточны для этого,
то отнюдь не должно предписывать драстическихъ, силь-
но раздражающихъ средствъ, а только самыя нѣжныя,
какъ тамарины, манна, буровокислый винный камень
и пр. Въ позднѣйшее время позволяетъ больному бо-
лѣе дѣятельное движение и нѣсколько твердая пища.

Для предотвращенія возврата хронической кровавой
рвоты, или черной немочи, къ произрожденію коей всег-

да подаютъ поводъ важные глубоко вкоренившіеся пороки брюшныхъ органовъ, лучше всего способствуетъ приличное пользованіе минеральными водами, наипаче такими, кои, при разрѣшающемъ дѣйствіи своемъ, непроризводятъ стремительныхъ испражненій и ослабленій желудка и кишечного канала. Таковы суть кисловатыя воды, какъ зельтерская, кисловодская кавказская и легкія желѣзныя воды, Фахингерская, агерская и другія. Встрѣчаются однакожъ случаи, гдѣ лѣченіе удается только отъ употребленія сильныхъ карльсбадскихъ водъ.

Кровотеченіе изъ мочевыхъ путей.

(*Haematuria*).

Сим. Кровавое мочетеченіе, кровавая моча, *haematuria*, *haemuresis*, *mictus cruentus*, *sangvineus*; *uretrorrhagia*, *stymatosis*.

§ 123.

Симъ именемъ называется то болѣзненное состояніе, при которомъ кровь въ большемъ или меньшемъ количествѣ, въ смѣшаніи съ мочею, либо одна по себѣ, въ чистомъ натуральномъ, или створоженномъ, даже гнилостномъ состояніи испражняется изъ мочевыхъ путей въ сопровожденіи иногда съ сильными болями и другими важными какими либо припадками, а иногда безъ болей и безъ всякихъ другихъ болѣзненныхъ явлений.