


569082



569082

ТЕРАПІЯ

БУТКОВСКАГО



2

1
2.1



569082

Б.
Г. Г.
2049.



Л. А. Б. М.

2

НАЧЕРТАНИЕ

ЧАСТНОЙ

ПАТОЛОГИИ И ТЕРАПИИ

ЧЕЛОВЪЧЕСКИХЪ БОЛЪЗНЕЙ,

ИЗДАННОЕ

ДЛЯ РУКОВОДСТВА ВЪ ПРЕПОДАВАНИИ

П. О. Профессоромъ Императорскаго Харьковскаго Университета, Докторомъ Медицины, Коллежскимъ Совѣтникомъ


Петромъ Бутковскимъ.



Stude, non ut plus aliquid
scias, sed ut melius.
A. Seneca Epist. LXXXIX.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ,

СОДЕРЖАЩАЯ ВЪ СЕВЪ ВОСПАЛЕНИЯ ВСѢХЪ СИСТЕМЪ
И ОРГАНОВЪ ЧЕЛОВЪЧЕСКАГО ТѢЛА.



ХАРЬКОВЪ,

Въ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОГРАФІИ.

1841.




59

Съ разрешенія Медицинскаго Факультета Императорскаго
Харьковскаго Университета печатать дозволяется. 21 Марта
1841 года. Харьковъ.

Деканъ Медицинскаго Факультета

Докторъ Фридрихъ Ганъ.



2000005

РАЗСТРОЙСТВА ЖИЗНЕННЫХЪ ОТПРАВЛЕНИЙ.

Г. ВОСПАЛЕНІЯ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О ВОСПАЛЕНИИ ВООБЩЕ.

§ 1.

Воспаление (inflammatio, phlogosis, empresma, hyperhaematoses, phleboplerosis ecphractica) есть болѣзниеное состояніе какой либо части, органа или системы человѣческаго тѣла, зависящее отъ мѣстнаго раздраженія, продолжительного скопленія и произшедшаго чрезъ то измѣненія органической образовательной силы.

1*



§ 2.

а) *Мъстнымъ раздраженiemъ* называется то состояніе, при которомъ настроеніе жизнедѣятельности какого либо органа поддерживается другимъ ипороднымъ раздраженіемъ, превышающимъ мѣру натурального, соразмѣнаго ему жизненнаго раздраженія. Таковыя инородныя раздраженія могутъ быть вицѣнія или побочныхъ, также внутреннія или конституціональныя. Впрочемъ для приведенія въ воспалительное состояніе какого либо органа потребно сильное и продолжительное раздраженіе; скопрояходящее же и слабое не производить такового состоянія; по вскорѣ исчезаетъ, не оставляя дальнѣйшихъ послѣдствій.

б) *Скопленіе* (*congestio*), отъ коего въ одномъ какомъ либо органѣ рождается избытокъ крови, пренаполненіе сосудовъ и въ началѣ, покрайней мѣрѣ, ускоренное движение крови, составляеть ближайшее и непосредственное дѣйствіе раздраженія. Въ некоторыхъ однакожъ случаяхъ, тотчасъ послѣ раздраженія, обнаруживается не скопленіе, а *судорога*, отъ которой теченіе крови въ судорожно-сжатомъ органѣ замедляется и уменьшается. Посему *судорога* бываетъ иногда началомъ воспаленія; а иногда и сопровождающимъ оное явленіемъ, наппаче въ окружности страждущаго мѣста (*von Walther*). Проходящее скопленіе не причиняетъ воспаленія.—Для произведенія сего послѣдняго потребно продолжительное скопленіе, при которомъ сосуды кровеносные нетокмо механически растягиваются болѣшимъ

количествою крови (*congestio passiva*), по между стѣнками сосудовъ и кровію происходитъ особенное, въ здравомъ состояніи не существующее, дѣйствіе и противодействіе (*congestio activa*). Кровь претерпѣваетъ здѣсь измѣненіе въ своемъ смышеніи, потому что воспаленный органъ разлагаетъ ее собственнымъ образомъ и при извѣстномъ степени воспаленія дѣлается отдѣлительнымъ органомъ, хотя прежде несвойственно ему было таковое отиправленіе.—Въ слѣдствіе такого скопленія рождается и самое

с) *Измѣненіе органической образовательной силы*, состоящее въ неправильномъ питаніи, отдѣленіи, въ произрожденіи ложныхъ образованій различного рода и составляющее собственно причину тѣхъ воспалительныхъ явлений, кои почитаются обыкновенно исходами воспаленія.

§ 3.

Отъ представленныхъ здѣсь трехъ факторовъ воспаленія зависятъ и собственные воспалительные *припадки* или *явленія* к. т. краснота, жаръ, боль и опухоль.

1. *Краснота*. Всѣ органы, представляющіеся въ нормальномъ состояніи красноватыми, дѣлаются при воспаленіи гораздо краснѣ. — Краснота оказывается здѣсь во всѣхъ ся оттѣнкахъ: отъ блѣдорозового, корминион-краснаго, смуглокраснаго, темнокраснаго, пурпуроваго, до синекраснаго и віолетоваго цвѣта, и въ срединѣ воспаленной части бываетъ сильнѣе, нежели въ окружно-

сти. Образование сего явления зависит отъ следующихъ моментовъ: движение крови въ воспаленномъ мѣстѣ или органѣ всегда ускоряется, наппаче въ началѣ; въ артеріяхъ ускоренное движение оной остается на некоторое время и тогда, когда въ венахъ оно уже замедляется, отъ чего происходит скопление крови и конечный застой. Посему въ воспаленномъ мѣстѣ обрѣтается болѣе красной артеріальной крови, которая, скопляясь при семъ болѣе и болѣе, дѣлается гуще; кровяные шарики оной исчезаютъ, отъ того что зернушки ихъ, прорывая покрывающія ихъ оболочки, сливаются между собою, не отдѣляясь однакожъ вовсе отъ красящаго вещества и образуютъ массу, свертку крови подобную, волокнистую, но содержащую еще красное вещество крови (*Davy, W. Philips*). Движение крови въ воспаленномъ органѣ бываетъ собственное, независящее отъ общаго кругообращенія и следующее другимъ законамъ и направленіямъ. Красные шарики пробиваются чрезъ боковыя стѣнки сосудовъ и, будучи линейно расположены между собою, собираются въ потоки, которые, заключаясь въ образуемыя вновь трубочки, дѣлаются новыми сосудами (*Kaltenbrunner*).

Впрочемъ краснота не можетъ быть почитаема существеннымъ признакомъ воспаленія. Она иногда зависитъ отъ одного скоропроходящаго скопленія, или отъ механическаго разширения сосудовъ, отъ кровоизліянія; при внутреннихъ воспаленіяхъ не можетъ быть видима, да и по вскрытию тѣла, не всегда примѣчается, ибо очень часто вмѣстѣ съ жизнью исчезаетъ. — Есть даже такія части тѣла, кои отъ воспаленія не краснѣютъ, но измѣ-

няются въ цвѣтѣ особеннымъ образомъ, на пр. озрочковая оболочка и другія части глаза.

2. *Жаръ или возвышенная температура.* Жизненная теплота всякой части дѣлается при воспаленіи гораздо сильнѣе, нежели въ здоровомъ состояніи. Степень оной зависитъ однакожъ въ этомъ случаѣ и отъ особенного свойства и устроенія страждущей части; но что развитіе теплоты дѣйствительно умножается при семъ, то доказываютъ термометрическія изслѣдованія, по коимъ известно, что въ воспаленномъ мѣстѣ температура возышается 7° Ф. болѣе, нежели въ здоровомъ состояніи (*I. Hunter, A. Cooper*).

Умноженное развитіе теплоты при воспаленіи совершается по тѣмъ же законамъ, по какимъ развивается она обыкновенно у животныхъ и зависитъ отъ возвышенной жизнедѣятельности вообще и въ особенности отъ болѣе возбужденнаго дѣйствія крови и нервовъ. —

3. *Боль есть слѣдствіе инороднаго раздраженія, причиняющаго воспаленіе и происходитъ здѣсь отъ возвышенной чувствительности нервовъ, нарушающей внутреннюю гармонію самоощущенія (sensus communis, *sensaeesthesia*).* Воспалительная боль бываетъ обыкновенно постоянная и продолжительная (*dolor fixus, continuus*); но по ощущенію различная к. т. жгучая, колющая, давящая, бьющая и проч. *Жгучая* боль рождается отъ возвышенной температуры и ощущенія жара въ воспаленномъ мѣстѣ; *колющая* отъ растяженія сосудовъ и нервовъ, причиняемаго напоромъ крови, *давящая и на-праляющая* отъ умноженія специфической тяжести и

разширенія клѣтчатой плевы; *а бьющаяся* отъ болѣнія артеріальныхъ волосныхъ сосудовъ, не существующаго въ здоровомъ состояніи, также отъ ощущенія умноженнаго артеріального болѣнія, которое въ здоровомъ состояніи непримѣчается, исчезая въ нормальному единствѣ самоощущенія. — *Реущая, сверлящая и грызущая* боли не принадлежатъ собственно воспаленію, а слушаются только при иѣкоторыхъ воспалительныхъ состояніяхъ, измѣняющихся собственнымъ образомъ.

Припадокъ сей, завися всегда отъ болѣзненнаго самоощущенія, въ началѣ существуетъ въ усиленной степени; а послѣ уменьшается не рѣдко до того, что пробуждается только отъ новаго раздраженія, отъ давленія, движенія, или напряженного употребленія воспаленного органа.

4. *Опухоль.* Воспаленная часть увеличивается обыкновенно сверхъ естественныхъ границъ объятности или пространственнаго содержанія своего.—Таковое явленіе въ началѣ воспаленія происходитъ отъ умноженной жизненной полноты (*turgor vitalis*) и большаго притечения крови къ воспаленному мѣсту, въ слѣдствіе возвышенной жизнедѣятельности, а въ послѣдующемъ теченіи воспаленія отъ распуханія клѣтчатой плевы, отъ разширѣнія сосудовъ, отъ дѣйствительнаго изліянія въ клѣтчатую плеву и отъ образования новыхъ сосудовъ. Хотя опухоль находится при всякомъ воспаленіи, но она бываетъ не въ одинаковой степени, что зависитъ отъ силы воспаленія, а особенно отъ устройства воспаляемой части, которая, чѣмъ болѣе заключаетъ въ себѣ клѣтчатаго вещества, тѣмъ сильнѣе распухаетъ. —

— 7 —

Большее или меньшее напряженіе, плотность и твердость опухоли происходятъ отъ свойства веществъ, изливаемыхъ въ клѣтчатую плеву

§ 4.

Кромѣ сихъ главныхъ четырехъ припадковъ, воспаление обнаруживается еще болѣе или менѣе *нарушеннымъ отправлениемъ* страждущаго органа, *сочувственными припадками и горячкою*.

а) При столь сильномъ возбужденіи и внутреннемъ потрясеніи, какое случается обыкновенно въ воспаленіи, страждущій органъ не можетъ оставаться въ предѣлахъ нормального своего отправления. Энергія его, хотя въ началѣ кажется возвышенною, однакожъ при этомъ замѣчается уже некоторая неправильность и весьма скоро слѣдуетъ значительное ослабленіе оной, — слѣдственно *отправление нарушается*.

б) Нарушенное отправление, боль и другіе припадки обнаруживаются не только въ смежныхъ органахъ, воспринимающихъ участіе въ раздраженіи первоначально пораженного органа (*halo inflammatorius*), но даже въ отдаленныхъ, состоящихъ сть опымъ въ ближайшей связи, по единообразному устройству, по соединенію первовъ либо сосудовъ, или по другимъ физиологическимъ отношеніямъ и рождаются т. н. *сочувственные* или *сострадательные* припадки, кои, для правильнаго распознанія мѣстопребыванія воспаленія, всячески должны быть отличаемы отъ первоначальныхъ или существенныхъ припадковъ. Иногда сочuvственные припадки

усиливаются до того, что затмѣваютъ присутствіе первоначальныхъ явлений, отъ чего сіи послѣднія оказываются очень ограничено и несовершенно, либо вовсе даже не примѣчаются.

с) Частное воспаленіе, произшедшее отъ мѣстного раздраженія, можетъ возбуждать *огневицу* или *горячку*, какъ противудѣйствіе всего организма. Равнымъ образомъ общее огневичновоспалительное раздраженіе, поселяясь и преимущественно усиливаясь въ какомъ либо органѣ, можетъ произвести мѣстное воспаленіе онаго. Посему содержаніе воспаленія къ горячкѣ бываетъ двоякое: воспаленіе можетъ быть припадкомъ горячки и горячка припадкомъ воспаленія. Совершенное отсутствіе горячки оказывается только при слабыхъ воспаленіяхъ въ наружныхъ, менѣе благородныхъ частяхъ тѣла. Горячка, присоединяющаяся къ воспаленію, удерживаетъ характеръ онаго и потому бываетъ *простая воспалительная* или *сосудистая* (*synocha*) и оказывается обыкновенно ознобомъ, жаромъ, ускореннымъ и раздраженнымъ жилобеніемъ, болю въ головѣ и другихъ членахъ, жаждою, потерю аппетита, безсонницею, чувствомъ усталости, нарушеніемъ отдѣленій и задержаніемъ испражненій. Хотя впрочемъ главное свойство горячки, рождающейся при мѣстномъ воспаленіи, въ формѣ припадка, всегда бываетъ воспалительное, синохальное; но отъ всеобщихъ космическихъ, атмосферныхъ влияний, отъ конституціональныхъ и индивидуальныхъ содержаній, отъ существующаго болѣзеннаго расположения и отъ случайныхъ вредностей оно можетъ претерпѣвать измѣненія и подвергаться разнымъ гастро-

скимъ, желчнымъ, мокротнымъ, даже первинымъ и тифознымъ состояніямъ. — Въ тѣхъ же случаяхъ, гдѣ воспаленіе происходитъ отъ общаго конституціонального раздраженія, свойство горячки первоначально можетъ быть другое, невоспалительное, претерпѣвающее также разныя измѣненія, какъ отъ произра�дающагося въ такомъ случаѣ воспаленія, такъ и отъ прочихъ вліяній.

§ 5.

Если означенные характерические признаки воспаленія (§ 3.) обрѣтаются во вѣшнихъ частяхъ, доступныхъ непосредственному объективному наблюденію для насть, то *распознаваніе* воспаленія не представляетъ никакихъ затрудненій; напротивъ того, когда воспаленная часть скрыта отъ нашего зрѣнія и ощущенія, то распознаваніе тѣмъ труднѣе бываетъ, чѣмъ слабѣе, тише и медленнѣе обнаруживается воспаленіе, чѣмъ менѣе сопровождается оно существенными, а болѣе посторонними или сочувственными припадками, чѣмъ неопределительнѣе отправление страждущаго органа и наконецъ чѣмъ сокровеннѣе причины и расположение больнаго.

Въ такихъ случаяхъ распознаваніе основывается исключительно почти на субъективномъ ощущеніи и на заключеніяхъ, выводимыхъ изъ дознаніаго опытомъ собственного образа страданія при воспаленіяхъ извѣстныхъ органовъ. Вообще при *распознаваніи внутреннихъ воспаленій* (*empresmata*) главные моменты составляютъ:

а) *Боль* непрерывная, постоянно ощущаемая, выражающаяся различнымъ чувствомъ, смотря по разности

устройства органовъ и по другимъ отношеніямъ (§ 3); но всегда умножающаяся при давленіи и при всякомъ усиленномъ движениі дѣятельномъ, или страдательномъ.

b). *Вслушивание* (auscultatio) и *ударение* (percussio), посредствомъ коихъ мы можемъ примѣтить извѣтъ существующія внутри измѣненія плотности органическаго состава, пренаполненіе онаго соками, воспаленное прохожденіе жидкостей, или гасовъ и т. п. — Первое величайшую услугу оказываетъ при воспалительномъ страданіи грудныхъ органовъ (*Laennec*), а послѣднее при воспаленіи брюшныхъ внутренностей, напаче при переходѣ въ отолощеніе или серозное изліяніе (*Philipp*). —

c). *Огневицы движений* (motus febriles). Если они произраждаются вмѣстѣ съ внутреннею болью въ какой либо сторонѣ, то изъ этого можно предполагать съ достовѣрностію о существованіи воспаленія въ тѣлѣ. Когда же движениія сіи появляются послѣ предшествовавшихъ долгое время внутреннихъ болей, то они доказываютъ уже общее гектическое раздраженіе въ системѣ сосудовъ, въ слѣдствіе развивающагося до усиленной степени воспалительнаго процесса. Вообще распознаваніе въ семь случаѣ утверждается на свойствѣ огневицы, скорости или медленности ея развитія и прохожденія, явственности или неявственности послабленій, критическихъ движений и проч.

d). *Появленіе* на выпущенной крови *воспалительной плеевы* (crusta inflammatioria), которая произраждается всегда только при флогистическомъ состояніи и потому въ большей части слѣчаевъ составляетъ несумнѣнное доказательство обрѣтающагося въ тѣлѣ воспаленія

(§ 9), особенно если при этомъ существуетъ означенная болъ.

§ 6.

Течениe воспаленiя можно раздѣлить на два перiода:
а) *перiодъ раздраженiя* и б) *перiодъ разслабленiя*.

Въ началѣ или въ первомъ перiодѣ раздраженiе бываетъ сильное, скопленiе дѣятельное, вообще господствуютъ положительные припадки; а въ позднѣйшее время или въ перiодѣ разслабленiя появляется отрицательное состоянiе: скопленiе бываетъ страдательное, состоящее въ простомъ пренаполненiи сосудовъ, раздраженiе большою частiю притупляется, несовершенно однакожъ прекращаясь, и паренхимъ органа наполняется обременительными произведенiями воспаленiя. Вообще теченiе воспаленiя совершается, какъ острая болѣзнь и имѣть свои перiоды начала (*initii*), приращенiя (*incrementi*) и умаленiя (*decrementi*). Если болѣзнь не прерывается лѣченiемъ, а предоставляется самой себѣ, то мѣстные припадки въ продолженiи пяти, семи, девяти и даже одинадцати дней умножаются, возрастаютъ до высшей степени, сопровождаясь болѣе или менѣе сильною горячкою, а потомъ начинаютъ умаляться, продолжаясь такимъ образомъ иногда до 21 дня.

§ 7.

Воспаленiе, продолжаясь извѣстное время, либо совершено разрѣшается, либо переходитъ въ другiя бо-

лѣзепенныя состоянія. Вообще исходы его бываютъ слѣдующіе:

1). *Совершенное разрѣшеніе* (*resolutio*), при которомъ весь воспалительный актъ оканчивается и вовсе исчезаетъ, жизненное отправленіе страждающаго органа возвращается къ нормальному состоянію безъ всякаго обнаруживанія новой какої либо болѣзни.

2). *Выпотъніе* (*transudatio, exsudatio*), при которомъ воспалительный процессъ переходитъ въ болѣзнено-умноженное отдѣленіе:

а) *Животнаго питательнаго вещества*, въ излишествѣ выдѣльваемаго изъ волокнистой части крови въ видѣ створоженной пасоки, отъ чего происходитъ сращеніе воспаленныхъ частей (*inflammatio adhaesiva*); либо

б) *Серозной лимфатической жидкости*, отъ чего образуется водяная болѣзнь въ видѣ отека и другихъ водяно-болѣзненныхъ страданій (*hydrops*); либо

с) *Гноя* (*pus*), отъ чего дѣлается нагноеніе (*suppuration*) въ видѣ нарыва (*abscessus, apostema*), или въ видѣ гноинаго отдѣленія, оказывающагося на поверхности ранъ (*inflammatio suppurrativa*).

3). *Исходъ въ изъязвлѣніе* или *въ язву* (*inflammatio ulcerosa*).

4). *Исходъ въ отвердѣніе* (*induratio*).

5). *Исходъ въ омертвѣніе* воспаленной части (*gangraea nescientia, gangraena et sphacelus*).

6). Исходъ *въ разныя преобразованія, новыя произведенія, болѣзпнныя перерожденія и проч.* Подробнѣйшее описание сихъ исходовъ воспаленія, составляющиихъ пѣкоторымъ образомъ самостоятельный видъ, будетъ изложено въ особенныхъ статьяхъ (см. гл. втор.).

§ 8.

Причины. Для произрожденія воспаленія нужно *предрасположеніе* (*prædispositio*), которое находится у всякаго человѣка, даже у всякаго животнаго, одареннаго красною кровью. Однакожъ у пѣкоторыхъ людей оно бываетъ больше, а у другихъ меньше. Наибольшую степень его имѣютъ молодые неослабленные юноши, преимущественно мужчины крѣпкаго тѣлосложенія, сангвинического темперамента съ большою раздражительностью, особенно при обильномъ питаніи, избыткѣ крови, при воспаленіи натуральныхъ или привычныхъ испражненій, чаще въ зимнее время и въ самомъ началѣ весны, въ гористыхъ возвышенныхъ странахъ, въ умеренно-холодныхъ климатахъ, при господствующемъ сѣверномъ, восточномъ и сѣверовосточномъ вѣтрахъ. Оно также бываетъ наследственнымъ въ пѣкоторыхъ фамиліяхъ, даже съ особеною наклонностью къ воспаленію извѣстныхъ органовъ (на пр. мозга, легкихъ). Равнымъ образомъ не всѣ части въ организмѣ имѣютъ одинаковое предрасположеніе къ воспаленію. Оно существуетъ преимущественно въ частяхъ, весьма изобилующихъ нервами, волосными сосудами и клѣтчатымъ веществомъ, к. па пр. въ легкихъ и кожныхъ покро-

вахъ, въ пѣкоторыхъ желѣзистыхъ внутренностяхъ и серозныхъ оболочкахъ; но въ мышицахъ, нервахъ, большихъ сосудахъ, волокнистыхъ составахъ, въ костяхъ и хращахъ бываетъ гораздо слабѣе.

§ 9.

Отъ таковаго предрасположенія къ воспаленію должно отличать *флогистическое расположение* (*diathesis phlogistica*), которое составляетъ уже пѣкоторымъ образомъ развившееся болѣзненное состояніе крови и ея судистой системы. Хотя состояніе сie часто предшествуетъ мѣстному воспаленію, существенно зависящему отъ него въ причинномъ отношеніи, но также можетъ быть производимо и мѣстнымъ воспаленіемъ, если сie продолжается извѣстное время и соединено съ общимъ огневичнымъ страданіемъ.

Флогистическое расположение отличается характерически неправильнымъ смѣшениемъ крови, перевѣсомъ волокнистаго вещества и кровяныхъ шариковъ надъ серозными и красящими частями, следствительно зависящею отъ того большею густотою и створажимостію крови. При оному образуется на крови, выпущенной изъ сосуда, *воспалительная плева* (*crusta inflammatoria*), которая состоитъ изъ безцвѣтнаго волокнистаго вещества и створоженной белковатой матеріи. Настоящая воспалительная плева должна быть плотная, толстая, изъ бѣла-сѣрая (но не зеленоватая), вязкая, тягучая, трудно перерѣзываемая, въ скоромъ времени образующаяся изъ сѣрыхъ массъ чрезъ стягиваніе и сплоченіе

оныхъ. Тамъ, гдѣ обнаруживается она, всегда со-
ставляетъ признакъ флогистического расположения, но
не всегда доказываетъ существующее на самомъ дѣлѣ
воспаленіе. При гнилостномъ состояніи крови она ни-
когда не оказывается.

§ 10.

Кромѣ предрасположенія къ воспаленію и собственно
флогистического расположения, есть еще *особенная наклонность къ воспалемости*, основывающаяся на
раздражительной слабости, болѣзнией удобопоражае-
мости и нетерпимости раздраженія. Посредствомъ тако-
вой наклонности весьма слабыя флогистическія возбуж-
денія, даже обыкновенныя, неизбѣжныя жизненные раз-
драженія въ состояніи произвести сильныя воспалитель-
ныя противудѣйствія. Она — то причиною столь часто
встрѣчающихся воспаленій у женщинъ и дѣтей, одер-
жимыхъ обыкновенно раздражительною слабостію, так-
же у худосочныхъ людей, коихъ хакертическое страда-
ніе всегда почти наводить въ послѣдствіи своемъ раз-
дражительную слабость и умноженную склонность къ
воспаленіямъ. Впрочемъ встрѣчающіяся у таковыхъ
ослабленныхъ субъектовъ воспаленія не суть атониче-
скія, ибо и у нихъ всякое воспаленіе зависитъ отъ раз-
драженія и флогистического возбужденія. Отъ сихъ
только однихъ моментовъ произраѣдается воспаленіе и,
въ какой бы степени ослабленія, совершеннаго или от-
носительного, не находился органъ, но безъ единовре-

меншаго содѣйствія флогистического раздраженія, воспаленіе въ одномъ произойти не можетъ.

§ 11.

Такимъ образомъ *всъ случаѣи дѣйствующїя возбуждающія причины*, производящія, при существующемъ предрасположеніи, болѣзнь на самомъ дѣлѣ, суть *флогистическое раздраженія*, кои дѣйствуютъ местно, приводятъ органъ непосредственно въ умноженное противодѣйствіе (*reactio*); либо произрахдаясь внутренне, даже во внутреннѣйшемъ содержаніи жизни—въ душѣ (сильныя душевныя возмущенія), причиняютъ посредственно, послѣ предшествовавшаго общаго конституціонального раздраженія, можетъ быть и при развивающемся уже флогистическомъ расположеніи, местное воспаленіе въ одномъ или въ несколькиихъ такихъ органахъ, къ коимъ внутреннее раздраженіе имѣть особенное ближайшее стремленіе и отношеніе.

§ 12.

Мѣстное флогистическое раздраженіе можетъ быть:

а) *Механическое*, производимое какимъ либо наружнымъ насилиемъ к. т. ушибомъ, ударомъ, уколомъ, потрясеніемъ, растяженіемъ, раненіемъ, огнестрѣльнымъ поврежденіемъ, присудствиемъ посторонняго тѣла и проч.

б) *Химическое*, причиняемое крѣпкими минеральными кислотами, Ѣдкими щелочами, дѣйствіемъ огня, во-


обще ядовитыми, заразительными веществами и проч.

с) *Физическое*, куда принадлежать вліянія невзвѣшиваемыхъ агентовъ, напаche теплоты, вообще скорая перемѣна температуры, измѣняющая первоначально гармоническую дѣятельность первовъ, а потомъ возбуждающа ша неправильно сосудистую систему. Сюда относится также вліяніе атмосферного воздуха, который составляетъ саму частійшую причину воспаленій при различныхъ измѣненіяхъ (очень мало еще известныхъ), раздѣляющихся въ немъ по времени года, по климату, погодѣ и проч. Сверхъ сего мѣстное воспалительное раздраженіе можетъ образоваться отъ чрезмѣрного напряженія отправлений какой либо части или органа, напр. глазъ, гортали и пр.

§ 13.

Таковыми раздраженіями, какъ случайными причинами, производится собственно тотъ процессъ, который мы называемъ *ближайшею причиною* или *сущностью воспаленія* и отъ коего происходятъ всѣ воспалительные явленія. Процессъ сей состоить въ болѣзnenно возбужденной и ускоренной жизнедѣятельности органа, зависящей отъ раздраженія первовъ сосудисто-волосной системы, въ слѣдствіе коего нарушается взаимное дѣйствіе между кровью и сосудами, створаживаемая часть крови количественно умножается, а стремленіе органической ткани къ образовательности и плотоуподобленію несоразмѣрно возвышается, такъ что втекающая въ болѣзnenный ор-

2*



гашь кровь не можетъ быть ни проводима далѣе въ ровной мѣрѣ, ни воздѣлываема на потребленіе нормального органическаго существа; но, находясь въ измѣненныхъ взаимныхъ дѣйствiяхъ съ органическою тканью, производить новыя неправильныя образованія и разложенія.

§ 14.

Хотя воспаленіе въ сущности своей всегда одинаково, но въ конкретныхъ болѣзняхъ случаяхъ бываетъ различное 1.) *по продолженiuю своему* (острое и хроническое); 2.) *по стойкости* (постоянное, поступательное и переносное); 3.) *по внутренней интенсивной силѣ* (эретическое и бездѣйственное); 4.) *по формѣ обнаруживанія* (флегмонозное и рожевое); 5.) *по внутреннему качеству и сложности* (чистое, худосочное, специфическое); 6.) *по строенiuю органовъ и системъ*, поражаемыхъ воспаленіемъ (воспаленіе паренхиматозныхъ и перепончатыхъ внутренностей, пакожной системы, желѣзистыхъ частей, слизистыхъ, серозныхъ, волокнистыхъ оболочекъ и проч.).

Острое воспаленіе обнаруживается съ извѣстною силою явлений и проходитъ скоро въ 9, 14, 21 день; когда же оно долѣе продолжается и сила явлений его слабая, то называется *хроническимъ*.

Постоянное воспаленіе (*inflamm. stataria*) остается на первоначально пораженномъ органѣ не подвижнымъ, ограниченнымъ; а *поступательное* (*inflamm. progressiva*) распространяется всегда далѣе, слѣдя при таковомъ поступательномъ движenіи лучшимъ своимъ проводникамъ: клѣт-

чатой плевѣ, кровеноснымъ и лимфатическимъ сосудамъ и нервамъ. Отъ поступательнаго воспаленія, при которомъ, не смотря на его распространеніе, первоначально пораженный органъ не остается свободнымъ, должно отличать *переходящее* или *переносное* воспаленіе (*infl. metastatica*), которое измѣняетъ свое мѣстопребываніе, уничтожаясь совершенно въ пораженномъ прежде органѣ и обнаруживаясь часто въ очень отдаленномъ.

§ 15.

Эретическое воспаленіе (*inflam. erethistica*) рождается при нервозно-раздражительномъ сложеніи, отъ маловажной вѣшней причины, развивается очень быстро, отличается сильною постоянною болью, бѣдною краснотою и малою опухолью. Вообще въ немъ преимуществуютъ первыя явленія предъ прочими, собственно воспалительными припадками.

Противоположность съ эретическимъ воспаленіемъ составляетъ *бездѣйственное* (*infl. torpida*), которое свойственно слабому, вялому сложенію тѣла, развивается медленно, послѣ содѣйствія сильнаго флогистического раздраженія, оказываетъ мало боли, имѣеть скрытный ходъ и продолжительное теченіе и, при мнимо слабой, часто мало примѣтной силѣ своей, причиняетъ иногда большое внутреннее потрясеніе.

§ 16.

Флегмонозное воспаленіе (*inflam. phlegmonosa*)

проникаетъ глубоко въ существо органа, не ограничиваюсь перепончатыми его покровами, но поражая паренхимное, или клѣтчатое существо и сосуды его. Вообще клѣтчатая пlevа составляетъ преимущественное мѣсто-пребыванію сего воспаленія. — Опухоль при немъ бываетъ неограниченная, твердая, напряженная, давленію перста неуступающая; краснота усиленная; боль колюща, напрягающая, бьющая; воспалительная горячка сильная, соединенная съ нарочитымъ пораженіемъ всего организма. Воспаленіе сіе не измѣняетъ своего мѣсто-пребыванія. Въ противоположномъ къ нему отношеніи состоить *рожевое воспаленіе* (infl. erysipelatosa), которое оказывается всегда на поверхности, поражаетъ кожу и перепонки, особенно вѣнцій серозный покровъ внутренностей, сердца и мозга. Краснота здѣсь бываетъ блѣдная, исчезающая при давленіи перста, боль слабая, ограничивающаяся зудомъ и ощущеніемъ напряженія, опухоль почти непримѣтная. Воспаленіе сіе оканчивается слупливаніемъ кожи и удобно оставляетъ поражаемыя имъ части тѣла, переносясь на другія, или отступая отъ наружныхъ къ внутреннимъ органамъ.

§ 17.

Чистое воспаленіе (islam. vera, synochica, energica) есть то, при которомъ всѣ явленія находятся въ сообразной степени, возбужденіе соответствуетъ силѣ противодействія, воспалительные припадки сильные, имѣютъ скорое, острое теченіе, но большую частію оканчиваются

благополучию. Воспаление сие свойственно почти однимъ крѣпкаго сложенія субъектамъ, наслаждающимся хорошимъ здоровьемъ. Исходъ его бываетъ, если не разрѣшеніе, то обыкновенно нагноеніе. Напротивъ того *художественное воспаление* (infl. cachectica) рождается у людей, одержимыхъ худосочіями (золотухою, составоломомъ, венерическою болѣзнию, цынгою) и въ причинномъ отношеніи зависитъ отъ онъихъ. Худосочія сіи, основываясь на неправильномъ смыщленіи соковъ и на измѣненныхъ содержаніяхъ связности (cohaesio) плотныхъ частей, производятъ вообще т. и. раздражительную слабость, или нетерпимость раздраженія, такъ что часто даже обыкновенныя, непрѣбѣжныя жизненныя раздраженія какого либо органа дѣлаются въ такомъ случаѣ побудительными причинами воспаленія. Поелику воспалительное расположение несуществуетъ здѣсь въ чистомъ видѣ, но возмущено худосочнымъ расположениемъ и болѣзнь имѣеть два противоборствующихъ между собою элемента, то чистая форма воспаленія не можетъ развиться здѣсь въ полномъ тонѣ, отъ чего рождается искаженное состояніе воспаленія, припадки коего противорѣчатъ между собою и самое теченіе бываетъ неправильное.

§ 18.

Сюда принадлежать также *специфическое воспаление* (infl. specificæ) или такія, кои производятся причинами собственнаго рода и потому, измѣненія воспалительный процессъ особыеннымъ образомъ, оказываются въ явле-

ніяхъ своихъ иѣкоторыя отличія и для уничтоженія своего требуютъ специфическихъ средствъ. Главнѣйшія изъ нихъ суть: а) *простудное воспаленіе* (*inflamm. catarrhalis*), которое имѣеть мѣстопребываніе преимущественно въ слизистой перепонкѣ носа, дыхательныхъ, мочевыхъ и дѣтородныхъ органовъ, также въ соединительной оболочки глаза и проч., отличается болѣе конгестивнымъ и особеннымъ раздраженнымъ состояніемъ, нежели настоящимъ воспалительнымъ дѣйствиемъ, а потому рѣдко переходитъ въ нагноеніе, но чаще разрѣщается умноженнымъ слизистосерознымъ отдѣлениемъ. б) *ревматическое воспаленіе* (*inflammatio rheumatica*) обрѣтается въ мышицахъ и волокнистыхъ влагалищахъ ихъ, вообще въ волокнистыхъ частяхъ, развивается изъ предшествующаго ему ревматического раздраженія (Ч. I. стр. 343), ожесточается при влажно-холодной и бурной погодѣ, имѣеть большую наклонность къ отступлению на другіе волокнистые органы и переходитъ иногда въ нагноеніе, по чаще въ выпотѣніе, при чемъ рождаются лимфатическія опухоли, либо сращенія и скорченія членовъ. с) *Составоломное воспаленіе* (*inflamm. arthritica*) поражаетъ всегда члено-составные концы костей;— теченіе его бываетъ скорое, боль сильная и появлению его предшествуютъ обыкновенно желудочныхъ разстройства.— Воспаленіе сіе не переходитъ въ нагноеніе, но оканчивается часто отложеніемъ известкообразныхъ веществъ, отъ коего дѣлаются твердые наращенія. Подобно ревматическому воспаленію оно имѣеть также наклонность къ переносамъ (*metastasis*), однакожъ въ большей степени и при семъ бросается удобно на благородные органы

к. т. на мозгъ, желудокъ, кишки и проч. d) *Золотушное воспаление* (*inflammatio scrophulosa*) поражаетъ наиболѣе лимфатическаяя желѣзы, особливо на шеѣ и въ пахахъ, также вѣки, членосоставные концы костей и пр. Случается чаще у дѣтей и молодыхъ особъ, имѣющихъ золотушный обликъ (*habitus*) и отличается медленнымъ теченiemъ, синеватою, совершенно ограниченою краснотою, слабою болью, твердою опухолью, которая и по прекращеніи боли долго продолжается, оставаясь въ видѣ отвердѣнія, или переходя въ медленно образующееся нагноеніе. e) *Венерическое воспаление* (*inflam. syphilitica*) отличается тѣмъ, что ограничивается совершенно однимъ мѣстомъ, краснота его бываетъ мѣднаго цвѣта и образуетъ кругъ, жаръ при немъ замѣчается умѣренный, боль часто только зудящая, иногда однакожъ сильная, ожесточающаяся почью. Если воспаленіе сie находится въ отдѣлительномъ органѣ, то отдѣленіе его умножается; въ другихъ же органахъ происходитъ быстрое изъязвленіе. Венерическое воспаленіе, причиняемое собственно заразою, обнаруживается всегда, какъ противудѣйствіе къ разрушающимъ вліяніямъ оної;—по сему венерические припадки имѣютъ специфическое воспалительное, собственно псевдопластическое свойство. Подобно венерическому содержатся f) *экзантематическое и прилипчивыя на кожныхъ воспаленія* (*inflam. exanthematicæ et contagioso-impetiginosæ*), которые основываются на воспалительныхъ противудѣйствіяхъ къ разрушающему вліянію существующаго въ тѣлѣ прилипчиваго вещества. Сюда принадлежать *корьное, осеннее, скарлатинное, лишайное и гемотогенное воспаленія*.

g.) *Цынготное воспаление* (inflam. scorbutica), при которомъ воспалительное расположение совершенно почти скрыто въ обрѣтающемся здѣсь разрѣщенномъ состояніи крови (sepsis et colliquatio), оказывается синею, либо віолетовою краснотою, поражаетъ преимущественно слизистую оболочку рта и глаза и переходитъ удобно въ изъязвленія и губчатыя наращенія.

§ 19.

Хотя воспаленіе всегда имѣетъ свое местопребываніе въ системѣ волосныхъ сосудовъ и всякая часть тѣла способна воспаляться; но, по разности строенія и свойства таковыхъ частей, оно представляется въ каждой изъ нихъ собственное теченіе и особенную форму обнаруживанія. Такимъ образомъ въ кожѣ оно воспринимаетъ видъ рожеваго воспаленія, а въ клѣтчатой плевѣ бываетъ всегда флегмонозное; въ серозныхъ и слизистыхъ перепонкахъ обнаруживается иначе, нежели въ синовіальныхъ и волокнистыхъ, въ перепончатыхъ органахъ иначе, нежели въ желѣзистыхъ и паренхимныхъ, въ артеріяхъ, венахъ и первахъ иначе, нежели въ костяхъ и хрящахъ. По сему и самое посологическое расположение воспаленій можетъ быть основываемо лучше всего на таковыхъ разностяхъ строенія и свойства различныхъ системъ оргаизма.

§ 20.

Предсказание въ воспаленіяхъ можетъ быть весь-

ма различно и зависитъ преимущественно отъ причинъ, степени и свойства воспаленія, важности страждущаго органа, состоянія всего организма и вліяній, дѣйствующихъ во время болѣзни, равно какъ и самаго лѣченія. Посему предсказаніе благопріятно, если причина воспаленія скоро проходящая, или можетъ быть скоро удалена и не оказала никакихъ побочныхъ вредныхъ дѣйствій на органъ, если сила воспаленія не очень значительна, свойство его чистое, стеническое, безъ всякихъ сопряженій, если страждущій органъ не очень важенъ для жизни и прежде неподвергался часто воспаленіямъ, если весь организмъ не ослабленъ, страждущій субъектъ молодъ и одаренъ хорошимъ, здоровымъ сложеніемъ, если правильного теченія воспаленія не нарушаютъ какія либо вредныя и неотклонимыя вѣшнія вліянія и паконецъ, если самое лѣченіе назначается во время и съ точнымъ соблюдениемъ потребныхъ къ тому правилъ. Чемъ болѣе таковыя обстоятельства уклоняются отъ означеннаго содержанія, тѣмъ болѣе и самое предсказаніе можетъ быть неблагопріятно.

Особенное вниманіе должно обращать при семъ на то, *какой предвидится исходъ воспаленія*.

Разрѣшенія, какъ самаго благопріятнѣйшаго окончанія болѣзни, можно надѣяться, когда воспаленіе не слишкомъ скоро развивается и не достигаетъ чрезмѣрно высокой степени, когда боль не очень сильная, пебьющаяся и горячка, сопровождающая воспаленіе, разрѣщается критическимъ потомъ, либо мочею, дѣлающею осадокъ на днѣ сосуда. *Нагноеніе*, часто неизбѣжное, а часто необходимо нужное для совершеннаго рѣшенія болѣзни,

можно предполагать при воспаленіяхъ скоро усиливающіхся, при давящей боли, сильномъ напряженіи и значительной опухоли, также въ органахъ, изобилующихъ клѣтчатымъ веществомъ и имѣющихъ слабый составъ. Въ наружныхъ воспаленіяхъ, даже очень сильныхъ, оно составляетъ почти натуральный исходъ, особливо если не распространяется на обширную область, но при внутреннихъ часто переходитъ въ изъязвленіе и подаетъ поводъ къ гектическому состоянію. Переходъ въ изъязвленіе послѣ предшествовавшаго нагноенія случается всегда у худосочныхъ субъектовъ, страждущихъ золотухою, веперическою болѣзнию, цынгою, либо при существіи на гнойную полость вредныхъ мѣстныхъ влияний к. т. испорченного воздуха, неопрятности, задержанія истеченія гноя и проч. *Отвердѣніе* можно ожидать при медленно протекающихъ воспаленіяхъ, въ же лѣзистыхъ частяхъ, одаренныхъ тѣсно скатымъ клѣтчатымъ веществомъ, также у особъ черножелчного сложенія, при употребленіи холодныхъ стягивающихъ средствъ и проч.—*Сращеніе*, происходящее отъ выпотѣнія пластической пасоки, составляетъ вожделѣнныи исходъ только въ травматическихъ воспаленіяхъ, требующихъ соединенія раздѣленныхъ частей; въ другихъ же случаяхъ, напиache при воспаленіи серозныхъ оболочекъ, где оно часто встречается и производить сращеніе внутренностей между собою или со стѣнами полостей, въ коихъ онъ содержится, нарушаетъ весьма много отправленіе страждущаго органа. Тоже бываетъ, если воспаленіе серозныхъ оболочекъ, переходитъ въ *водянисто-серозное выпотѣніе*, чегонадлежитъ опасаться при избыткѣ сероз-

ныхъ влагъ и происходящей отъ того наклонности къ водяной болѣзни, при неправильномъ ослабляющемъ лѣчениі, насилиственномъ нарушеніи теченія воспаленія и при воспашеніи разрѣщенія болѣзни чрезъ потъ, мочу или другое привычное испражненіе. Наконецъ *антоновъ огонь*, какъ самой дурной и опасный исходъ, можетъ быть предполагаемъ при чрезмѣрно сильныхъ, быстро достигающихъ высокой степени воспаленіяхъ, въ изобилующихъ первами и сосудами составахъ тѣла, напичке перепончатыхъ, также при сильныхъ воспаленіяхъ клѣтчатаго вещества, чрезмѣрно сжимаемаго какими либо плотными сухожильными перепонками, далѣе въ глубокой старости и при разрѣщеніи соковъ, въ жестокихъ ушибахъ, разрывахъ и переломахъ при содѣйствіи испорченаго, нечистаго, очень жаркаго воздуха и проч. Всѣ przypadки воспаленія, при наступленіи антонова огня, достигаютъ обыкновенно высочайшей степени, но это продолжается недолго, часто иѣсколько часовъ, потомъ жизненность начинаетъ исчезать и наступаетъ постепенно мѣстное помертвѣніе, съ которымъ вскорѣ прекращается иногда и самая жизнь, если страждущій органъ очень важенъ для онаго. (см. § 69.).

§ 21.

Лѣченіе воспаленій имѣетъ двѣ главныя цѣли: а) удаление существующихъ раздраженій, произведенныхъ и поддерживающихъ воспалительный процессъ и б) приведеніе воспаленія въ такую степень, при коей можетъ послѣдовать приличный исходъ онаго т. е. вообще разрѣ-

шеніе, или по крайней мѣрѣ напиоеніе, если того требуютъ особенные обстоятельства. По сему здѣсь предстоитъ два главныхъ показаній к. т. *причинное*, относящееся до удаленія причинъ и *терапевтическое*, по коему назначаются сообразныя врачебныя средства.

§ 22.

1. *Причинное показаніе* (*indicatio causalis*) требуетъ удаленія тѣхъ раздраженій, кои произвели воспаленіе, если они продолжаютъ еще дѣйствовать и воздержанія отъ новыхъ флогистическихъ раздраженій и другихъ вредностей, могущихъ поддерживать и умножать силу воспалительного процесса. Итакъ сюда относится *удаленіе слугайныхъ причинъ и назначеніе прилагаемаго противовоспалительного содержанія и дѣйствія*. Часто воспалительное раздраженіе, происходящее отъ виѣшнихъ причинъ, само собою уничтожается напр.: при опаленіяхъ, озлобленіяхъ и проч. Если же причина продолжаетъ еще дѣйствовать, то, для избѣжанія сильнѣйшаго развитія воспаленія, надлежитъ заблаговременно удалить ону. Не рѣдко симъ однимъ уже умѣряется воспаленіе до такой степени, что слѣдуетъ само собою разрѣшеніе. Какимъ образомъ производится таковое удаленіе, сіе зависитъ въ каждомъ случаѣ отъ свойства причинъ. Если напр. отломки переломленной кости возбудили воспаленіе въ смежныхъ частяхъ, то онѣ надлежитъ вставить въ свое мѣсто. Когда существуютъ внутренніе причинные моменты, то они устраняются, смотря по свойству ихъ. Буде воспалительного

раздраженія удалить нельзя, то должно стараться притупить вредное дѣйствіе его оболакивающими средствами. Когда воспаленіе составляетъ пришадокъ другой болѣзни и въ причинномъ отношеніи зависитъ отъ оной, то нужно сперва уничтожить таковую болѣзвь, если степень воспаленія незначительна; въ противномъ случаѣ должно умѣрять и самое воспаленіе. Тамъ, гдѣ воспаленіе причинено жестокимъ насилиемъ, либо чрезмѣрнымъ возбужденіемъ сердечнодушевной способности, можно давать для уничтоженія волненія крови прохладающія соли (N 18, 61.) или синеродистую кислоту (N 56.), белену (N 1.), уксусокислый морфей (N 77), кодеинъ (N 2.) и другія пераздражающія наркотическія средства. Впрочемъ удаленіе случайныхъ причинъ не во всякомъ случаѣ нужно къ излѣченію воспаленія. Такимъ образомъ пуля можетъ оставаться въ тѣлѣ безъ вреда до окончанія раздражительного периода воспаленія и токмо въ сie время можетъ быть извлекаема безъ умноженія раздраженія. Вообще здѣсь должно смотрѣть на то, не произойдетъ ли отъ удаленія причины большее раздраженіе, нежели какое сопряжено съ самимъ воспаленіемъ.

§ 23.

Назначеніе противовоспалительного содержанія принадлежитъ къ причинному показанію собственно потому, что онымъ уклоняются всѣ причины, могущія умножать воспалительное расположение и усиливать самое воспаленіе.

Извѣстно, что воспаленный органъ дѣлается гораздо чувствительнѣе, нежели въ здоровомъ состояніи, а посему самыя обыкновенныя раздраженія могутъ быть для него вредны, напр. свѣтъ для глаза, движение для мышицъ и членосоставныхъ соединеній. Слѣдственно назначеніе приличной діэты и содержанія при воспаленіяхъ основывается на умѣреніи и приспособленіи тѣхъ привычныхъ вліяній, кои древніе называли *sex nauci rales*, разумѣя подъ оними воздухъ, пищу, сонъ и бдѣніе, движеніе и покой, страсти, отдѣленія и испражненія. Касательно *создуха* надлежитъ избѣгать всякой крайности температуры: большая теплота и холодъ вредны, а потому воздухъ, въ которомъ находится страждущій воспаленіемъ, долженъ быть умѣренно теплый. *Пища* вообще потребна малопитательная и притомъ совершенно нераздражающая. Если воспаленіе сильное, поражаетъ какой либо благородный органъ и большой крѣпкаго сложенія, то ему запрещается всякая пища, исключая манной кашицы, приготовляемой па водѣ съ сахаромъ, либо супъ изъ овсяныхъ крупъ и взваръ сухихъ садовыхъ плодовъ. Когда же воспаленіе не очень сильно и большой ослабленъ, то позволяетъ ему умѣренно питательная, легковаримая, но вовсе нераздражающая пища, лучше всего супы, приготовляемые изъ легкаго мяса, к. т. цыплять и телятины, безъ всякой впрочемъ пряности, также легкая, молодая овощь, по самаго мяса употреблять нельзя. То же самое можно сказать и о *напиткахъ*: вино, водка, кофій, пиво, медъ, должны быть всячески избѣгаены. Лучше всего употреблять для питья воду съ примѣсью клюквенного морса, ли-

мощного сока, либо уксуса, хороший хлебный квасъ, т.
и. хлебную воду, наипаче настаиваемую на ржачныхъ
сухаряхъ, отварь перловыхъ крупъ съ уксусомъ и ме-
домъ, миндалевое молоко, сыворотку, оршадъ и лимо-
надъ,—каковые напитки больной можетъ пить, сколько ему
угодно, только разомъ по не многу. Отъ сихъ предпи-
саній можно отступать только въ рѣдкихъ случаяхъ, при
особенномъ свойствѣ воспаленія, называемая питательную
и раздражающую пищу и напитки. *Движеніе* при вся-
комъ воспаленіи вредно, а потому больной долженъ вся-
чески соблюдать *покой*, доставляя воспаленной части
такое положеніе, при которомъ кругообращеніе крови,
наипаче въ венахъ, нисколько бы не воспиралось. *Сонъ*
необходимо нуженъ при воспаленіяхъ, потому что въ
ономъ вліяніе вышеупомянутыхъ раздраженій на тѣло умен-
шается и ослабляется, а потому тамъ, где онъ воспир-
щается жестокостію воспалительной боли, нехудо пред-
писывать успокаивающія, даже наркотическія средства,
особливо для весьма чувствительныхъ людей. *Страсти*,
вообще всѣ сильныя впечатлѣнія и возбужденія сердеч-
но-душевной способности больного должны быть избѣ-
гаемы при воспаленіи. Особенный вредъ оказываетъ
гневъ и чрезмѣрная радость. Наконецъ *отдыхенія* и
исправленія при всѣхъ воспаленіяхъ должны быть
споспѣшствуемы. Въ особенности нужно стараться о
свободномъ испражненіи на низъ, производя оное при-
личными внутренними средствами и промывательными.

§ 24.

11. Собственно терапевтическое показаніе (indica-

tio curativa) требуетъ 1.) сообразнаго степени и періоду болѣзни содѣствія на пониженіе болѣзньено-возвышенной жизнедѣятельности въ воспаленномъ органѣ (*indicatio topica*); 2) прилагнаго умѣренія возбужденнаго состоянія общей жизнедѣятельности (*indicatio generalis*); 3) удаленія сопряженій и припадковъ (*indicatio de complicationibus*); 4) примѣненія способа лѣченія къ особенному свойству воспаленія (*indicatio characteris morbi*) и 5) восстановленія жизненныхъ силъ, сообразно существующему состоянію, до совершеннаго выздоровленія (*indicatio de convalescentia*).

§ 25.

Первое требование выполняется собственно употреблениемъ такъ называемыхъ противовоспалительныхъ средствъ (*remedia antiphlogistica*), имѣющихъ способность умѣрять воспаленіе. Они назначаются посему во всѣхъ случаяхъ, где потребно понизить чрезмѣрно возвышенную жизнедѣятельность и тѣмъ привести воспаленіе въ умѣренную степень.

Извѣстно, что легкія воспаленія сами собою разрѣшаются, при чемъ динамическая измѣненія постепенно исчезаютъ и отложеныца органическія вещества опять всасываются, или извергаются. Слѣдственно при лѣченіи должно стараться только, помошью означенныхъ противовоспалительныхъ средствъ, привести воспаленіе въ умѣренную степень, если она возвышена до чрезмѣрности. Въ этомъ преимущественно должна состоять цѣль

искусственаго вспомоществованія, съ которою въ большей части случаевъ гораздо вѣрнѣе можно достигнуть предполагаемаго намѣренія. Истrebленіе воспаленія, при первомъ его появленіи, сильно дѣйствующими средствами, вообще слишкомъ спѣшное, насильственное прекращеніе онаго не всегда благополучно оканчивается и можетъ быть предпринимаемо только въ не многихъ особыхъ случаяхъ. Иногда полезно и даже нужно способствовать теченію воспаленія по всѣмъ его periodамъ и длить излѣченіе онаго нѣсколько времени для достижения какой либо терапевтической цѣли.

§ 26.

Къ числу противувоспалительныхъ средствъ принадлежать: кровопусканіе, производимое чрезъ разсеченіе вены, либо чрезъ вскрытие артеріи, местная кровоотвление, противувоспалительная лѣкарства, отведеніе воспалительного раздраженія и скопленія къ другимъ частямъ, холодъ, теплота и проч.

§ 27.

I. *Кровопусканіе, дѣлаемое 1.) чрезъ разсеченіе вены (phlebotomia), уменьшаетъ количество крови, уменьшая чрезъ то артеріальное скопление въ воспаленномъ мѣстѣ и производя притомъ качественное измененіе крови. Вообще кровопусканіемъ уменьшается относительное количество кровяныхъ шариковъ и волокнистаго ве-*

щества, кровь приводится въ болѣе серозное состояніе и внутренняя жизненность ея к. т. движимость, образовательная сила и створаживаемость ограничиваются. Сверхъ того *энергія* сосудистой дѣятельности вообще, и въ особенности артеріальной, понижается. Впрочемъ дѣятельность венъ, относительно къ уменьшенній дѣятельности артерій, въ такомъ случаѣ иѣкоторымъ образомъ возвышается. Посему кровопусканіе содѣлываетъ возвратъ венозной крови свободнѣйшимъ и споспѣшствуетъ венозному всасыванію.

Кровопусканіе при воспаленіяхъ тѣмъ болѣе показуется, чѣмъ сильнѣе самое воспаленіе, чѣмъ благороднѣе и обильнѣе сосудами поражаемый имъ органъ, чѣмъ опаснѣе нарушеніе или совершение прекращеніе сего отравленія, чѣмъ недавнѣе самое воспаленіе, чѣмъ чище и свободнѣе отъ всякаго худосочія, чѣмъ сильнѣе сопровождающая его горячка, чѣмъ крѣпче сложеніе больнаго, чѣмъ болѣе примѣчается въ тѣлѣ избытка крови и чѣмъ болѣе привыкъ больной къ потерѣ оной. Краснота въ лицѣ, полное, крѣпкое, твердое, трудно сжимаемое жилобіеніе, очень красный цветъ мочи, сухость и жаръ кожи составляютъ показанія къ кровопусканію. Нерѣдко и хроническія воспаленія требуютъ кровопусканій, равно какъ и худосочныя, если они сильны и угрожаютъ опасностію; однакожъ при таکовыхъ состояніяхъ кровопусканіемъ противудѣйствуется только одному элементу болѣзни (воспалительному), а другой (худосочный) отнюдь неограничивается онъмъ, но часто даже развивается въ большей степени. Въ важныхъ, угрожающихъ опасностію воспалительныхъ болѣзняхъ кровопусканія необ-

ходами бывають даже у дѣтей, разумѣется, не въ самомъ пѣжномъ возрастѣ ихъ. Равнымъ образомъ мѣсячное очищеніе, послѣродовое, либо гемерроидальное теченіе, оказывающіяся при воспаленіяхъ несоставляютъ безусловнаго противопоказанія къ тому.

Выборъ вѣны для кровопусканія, по причинѣ общей связи всѣхъ частей сосудистой системы, неограничивается однимъ какимъ либо мѣстомъ и по одному удобству принадлежитъ плечевой венѣ (*vena cephalica mediana*). Особенныя обстоятельства могутъ назначать вскрытие вены на ногѣ (*vena saphena externa s. malleolaris*), на переднемъ плечѣ (*vena basilica*), на тыльѣ руки (*vena cephalica pollicis*), или на шеѣ, наружной яремной венѣ, (*vena jugularis externa*).

Потребное количество крови должно выходить изъ вскрываемой вены стремительно, непрерывною струею. У взрослыхъ количество выпускаемой крови простирается отъ фунта до 20 и 30 унцій, а у дѣтей одною или двумя унціями болѣе лѣтъ ихъ возраста. Но продолжать кровопусканіе до ощутительного облегченія, или даже до обморока, пѣтъ надобности, да и пользы отъ того не предвидится.

Повтореніе кровопусканія назначается при благопріятномъ послѣдствіи онаго, либо при оказавшемся вновь ожесточеніи припадковъ воспаленія и огневицы. Появляющаяся на крови воспалительная плева есть моментъ, на который всегда должно обращать вниманіе, но отнюдь не выводить изъ того безусловнаго показанія къ повторенію кровопусканія. Плева сія часто оказывается на крови только при позднѣйшихъ кровопуска-

ніяхъ, не бывши при первыхъ, что происходит отъ присоединенія въ послѣдствіи къ мѣстному воспалительному страданію т. н. флогистического расположенія. Число повторяемыхъ кровопусканий опредѣлить нельзя; они предпринимаются иногда и несколько разъ, но при этомъ всегда надлежитъ обращать преимущественное вниманіе на сохраненіе силъ.

2. *Кровопусканіе чрезъ разсеченіе артеріи* (arteriotomia), производимое обыкновенно на височной, также лобной и лучевой артеріи, не составляетъ преимущественной выгода передъ кровопусканіемъ изъ вены. Оно облегчаетъ столько же, какъ и венозное кровопусканіе, но производится гораздо труднѣе и вскрытие артеріи въ другой разъ уже не можетъ быть предпринимаемо. Гдѣ оно доставляло рѣшительную и постоянную пользу, тамъ польза сія зависѣла не столько отъ дѣйствія самаго кровопусканія, какъ отъ послѣдующаго затѣмъ перевязыванія и затворенія артеріального ствола; слѣдственно подвязываніе артеріи и безъ разсеченія ея, повидимому, можетъ доставлять одинаковую пользу въ важныхъ какихъ либо хроническихъ мѣстныхъ воспаленіяхъ.

3.) *Мѣстные кровоотводченія* (detractiones sanguinis topicae) въ самомъ началѣ назначаются только при мѣстномъ воспаленіи, безъ развившагося еще флогистического расположенія; но когда существуетъ уже общее конституціональное раздраженіе, то имъ должно предшествовать общее кровопусканіе, безъ котораго нельзѧ ожидать въ такомъ случаѣ никакой пользы отъ нихъ. Въ дѣтскомъ возрастѣ и при худосочныхъ воспаленіяхъ,

часто они одни достаточны бывають. Къ мѣстному отвличенію крови относятся: припущеніе пьявокъ, приложеніе кровососныхъ банокъ и насычки. а) *Припущеніе пьявокъ* (*applicatio hirudinum*) назначается въ достаточномъ числѣ и приличномъ мѣстѣ, наиболѣе приближенномъ къ страждущему органу, но отнюдь не на самомъ воспаленіи и не тамъ, где проходятъ поверхности запацительные стволы артерій и венъ. Поелику раздраженіе, причиняемое пьявками чрезъ прободеніе покрововъ и чрезъ сосаніе, довольно значительно, то для умѣренія его требуется всегда поддерживаніе кровотеченія, раждающагося по отпаденіи пьявокъ. Кровь, высасываемая пьявками въ первомъ періодѣ воспаленія, бываетъ гораздо краснѣе, а послѣ нѣсколько темнѣе; вообще она тяжелѣе и изобилуетъ болѣе створаживающими составными частями, нежели испражняемая чрезъ вскрытие вены. б) *Посредствомъ кровососныхъ банокъ* (*cucurbitae sangvinolentiae*) извлекается кровь съроннимъ давленіемъ воздуха изъ самихъ углубленныхъ частей. Посему употребленіе ихъ наиболѣе прилично при воспаленіи внутреннихъ органовъ, глубоко лежащихъ волокнистыхъ частей, членосоставныхъ связокъ, вообще въ такихъ случаяхъ, где механическое раздраженіе и наружное раненіе удобно переносится к. т. при ревматическихъ и составломныхъ воспаленіяхъ, на менее чувствительныхъ мѣстахъ кожи и на ровныхъ поверхностяхъ тѣла. Одною кровососною банкою, если она довольно велика, можно испрягнуть около фунта и болѣе крови. Прямо на воспаленные мѣста кожи нельзя прикладывать кровососныхъ банокъ, такъ какъ и самыѣ

пъявокъ. с) *Насычки или наркзы для кровоотведения* (*scarificationes*), дѣлаемыя въ самыxъ воспаленныхъ органахъ, приличны только въ немногихъ случаяхъ: при весьма бездѣйственномъ воспаленіи, большомъ обрыхлѣніи клѣтчатой плевы, чрезмѣрионъ напряженіи и опухоли воспаленныхъ частей ипроч.

§ 28.

II. Къ противувоспалительнымъ лѣкарствамъ относятся среднія соли, кои, помошю произшедшей въ нихъ неутральности между двумя главными химическими противуположностями (кислотою и щелочью), производятъ подобное индиферентивное усиленіе къ успокоенію и уравненію возбужденныхъ противуположностей въ органическомъ тѣлѣ. Бѣдучи всосаны въ кишечномъ каналѣ венами, още переходятъ въ кровь (*Tiedemann, Gmelin*), производятъ въ ней измѣненіе смѣшенія, противуположное причиненному флогистическимъ расположениемъ, возстановляютъ безъ всякаго почти раздраженія задержанныя въ такомъ случаѣ отдѣленія и испражненія, наипаче въ кишечномъ каналѣ, въ брюшныхъ внутренностяхъ, въ мочевой системѣ, въ слизистой перепонкѣ вѣтвей дыхательного горла и виѣшней кожной системѣ,— слѣдственно способствуютъ такимъ образомъ, при благородномъ употребленіи, переломамъ острыхъ болѣзней.— Изъ числа сихъ солей *селитра* (*nitras s. azoas potassae*) (*N 11. 61.*) есть преимущественное средство. Она дѣйствуетъ чисто антифлогистически, а потому наиболѣе прилична въ чистомъ воспаленіи и притомъ въ первомъ

періодѣ, но наименѣе при воспаленіи отදлительныхъ органовъ. Другія же *поташныя соли* к. т. виннокаменноокислый поташъ (*tartras potassae*), уксусокислый (*acetas potassae*) и буровокислый поташъ (*boras potassae, kali boraxatum*) оказываютъ болѣе силы при воспаленіи отදлительныхъ органовъ.

Изъ *содовыхъ солей* сѣрнокислый и фосфорокислый натръ (*sulphas et phosphas sodæ*) самимъ нѣжнымъ образомъ возбуждаютъ и умножаютъ отදленіе въ кишечномъ каналѣ. Уксусокислый натръ (*acetas sodæ*) дѣйствуетъ собственцо на печень и почки. *Амміачные соли*, по причинѣ возбуждающаго свойства, зависящаго отъ амміака, который слабо пеутрализованъ въ нихъ кислотою и удобно отрѣшается отъ онѣй; приличны только при особенныхъ воспалительныхъ состояніяхъ. Такимъ образомъ уксусокислый амміакъ (*acetas ammoniæ*) можетъ быть употребляемъ при легкомъ воспалительному, болѣе катарально—ревматическомъ расположениіи, наипаче для произведенія и усиливанія накожныхъ переломовъ; а нашатель (*murias ammoniæ*) при полу涓оспалительныхъ страданіяхъ слизистыхъ перепонокъ и желѣзъ. Сверхъ сего самыя *кислоты*, наипаче *растительныя*, оказываются антифлогистическое дѣйствіе, если онѣ соединены съ растительною слизью и экстрактивными веществами, какъ въ лимонномъ сокѣ, тамаринахъ и проч. Крѣпкія однакожъ кислоты дѣйствуютъ слишкомъ диферентивно.

Изъ металлическихъ солей въ наибольшемъ употреблении *услащенная ртуть* (*submurias hydrargiri, calomelas, mercurius dulcis, chloridum hydrargiri*). Впрочемъ

она не столько прилична въ чистомъ воспаленіи, какъ въ худосочномъ, нестолько въ остромъ, какъ въ хроническомъ, болѣе во второмъ, нежели въ первомъ періодѣ. Дѣйствіе сего средства состоитъ въ томъ, что оно измѣняетъ кровосмѣщеніе и, ограничивая створаживаемость и пластическую силу крови, укрощаетъ излишній органическій образовательный процессъ. Сюда принадлежать также составы сюморы, весьма сродной со ртутью, наипаче *ревотный камень* (*tartras stibii et potassae*) коимъ въ новѣйшее время стали замѣнять услащенную ртуть, особенно при воспалительномъ страданіи серозно-слизистыхъ покрововъ, преимущественно въ дыхательныхъ и воздухопроходныхъ путяхъ. Вообще его предписываютъ, такъ какъ и *suboxydum stibii hydro-sulphuratum et hydrargirum stibia-to-sulphuratum* въ худосочныхъ, наипаче золотушныхъ, ревматическихъ, составлomныхъ воспаленіяхъ, преимущественно желѣзъ, слизистыхъ перепонокъ и пр.

Сверхъ сего въ воспаленіяхъ употребляются иногда и чисто наркотическая лѣкарства, притупляющія возвышенное раздраженіе, непосредственно оказываемымъ на нервы, успокаивающимъ дѣйствиемъ своимъ, какъ синеродистая кислота (N 36.) белена, уксусокислый морфій (N. 77.), лактукарій (N 3) и проч.—

§ 29.

III. Отведеніе воспалительного раздраженія и скопленія основывается на законахъ антагонистического

противудѣйствія и составляетъ предметъ т. н. отвлекающаго способа лѣченія (*methodus revulsiva*). Оно назначается преимущественно при поверхностныхъ воспаленіяхъ, измѣняющихъ свое мѣстопребываніе, также при ревматическихъ, переносныхъ воспаленіяхъ, происходящихъ отъ внутренней измѣняющейся причины и непостоянныхъ флогистическихъ раздраженій. Вообще однакожъ, при существующей возможности, полезно отводить воспалительныя дѣйствія отъ благородныхъ органовъ къ менѣе благороднымъ, напаче къ испражнительнымъ, отъ внутреннихъ на наружныя части тѣла, отъ органовъ, обрѣтающихся въ верхнихъ частяхъ тѣла къ органамъ нижнихъ частей. Производимое такимъ образомъ воспаленіе уменьшаетъ обыкновенно воспалительный дѣйствія первообразного важнѣйшаго страданія.

Отведеніе дѣятельнаго скопленія совершается посредствомъ отвлечений крови изъ венъ или волосныхъ сосудовъ, находящихся въ отдаленности отъ страждущихъ мѣстъ, либо въ такихъ органахъ, кои прежде страдали и отъ коихъ воспалительное раздраженіе отступило послѣ на благородныя части. *Отведеніе воспалительнаго раздраженія и скопленія* отъ верхнихъ частей къ нижнимъ производится посредствомъ пожныхъ ваний, полуваний, горчичниковъ, прикладываемыхъ къ подошвамъ ногъ, на икры и на внутренней сторонѣ ляшекъ, также теплого влажнаго припариванія дѣтородныхъ частей и брюха. Для отведенія къ кишечному каналу, напаче къ толстой кишкѣ, предписываются раздражающія промывательныя изъ мыла, соли, уксуса, раствора рвотнаго камня; слабительныя простыя и

драстической: услащепная ртуть, ялаппа, скамоній, гумигутъ, сабуръ (N 24. 45.) ипроч. Въ семь отношеніи и рвотныя средства (N 104) дѣйствуютъ также весьма хорошо, напиначе при бездѣйственныхъ, упорныхъ воспаленіяхъ, производя сильное раздраженіе верхнечревнаго первнаго сплетенія и оказывая, въ слѣдствіе центральнаго возбужденія, энцентрическое оживотвореніе органической жизнедѣятельности. Для отведенія къ кожѣ служатъ средства, наводящія красноту и пузыри на поверхности кожи, соотвѣтствующей внутреннему страждущему органу, иногда вблизи, а иногда въ возможномъ отдаленіи отъ онаго. При семь много зависитъ отъ выбора мѣста, приличнаго для такового отведенія. Производимое раздраженіе въ кожѣ должно соотвѣтствовать характеру отводимаго воспаленія. При острыхъ воспаленіяхъ, несдѣлавшихся еще псевдопластическими, достаточно наведеніе красноты и простое нарываніе пузрей, а въ хроническихъ, ихорозныхъ, экссудативныхъ воспаленіяхъ потребно продолжительное нагноеніе и изъязвленіе кожи. Мазь изъ рвотнаго камня (*unguentum stibiatum*) предписывается болѣе для отведенія отступившихъ сыпныхъ воспаленій. Искусственныя язвы приличны не только въ язвенныхъ, но и въ другихъ упорныхъ, псевдопластическихъ воспаленіяхъ внутреннихъ органовъ, при которыхъ воспалительное раздраженіе кожи должно всегда пересиливать внутреннее воспаленіе. Фонтанелли или гионные источники (*fonsiculi*), дѣлаемые посредствомъ разрѣза, производятъ язвы не только въ кожѣ, но и въ самой жирной клѣтчатой плевѣ и дѣйствуютъ преимущественно на подкожные нервы.—

При заволокахъ процессъ изъязвленія пропицаетъ еще глубже въ кѣтчатую плеву. *Искусственныя язвы*, производимыя чрезъ приложеніе моксъ, или раскаленнаго желѣза, либо прижиганіемъ ѳдкими веществами, въ разсужденіи отводящаго ихъ дѣйствія, сходствуютъ съ атоповоогненнымъ воспаленіемъ, раждающимся отъ ожогъ и въ дѣйствіи своемъ превосходить всѣ вышеозначенныя.

§ 30.

IV. Холодъ. Лучшее средство для уничтоженія начиающагося воспаленія въ какомъ либо органѣ есть продолжительное пониженіе температуры онаго, ниже той степени теплоты, какой требуетъ обыкновенно воспаленіе для дальнѣйшаго развитія своего. Что отъ такового пониженія температуры уменьшается сила воспаленія, это явственно доказываетъ пріятное ощущеніе получаемое отъ охлажденія воспаленнаго органа, въ которомъ развивается всегда усиленная теплота. Впрочемъ употребленіе холода не во всѣхъ воспаленіяхъ прилично; оно назначается съ пользою только при воспаленіяхъ идиопатическихъ, напаче въ началѣ оныхъ, пока необразовалась еще значительная опухоль, также большую частію въ наружныхъ воспаленіяхъ, происходящихъ отъ механическихъ причинъ и сопряженныхъ съ болѣшимъ кровоизліяніемъ подъ кожу; также при ожогахъ, при воспаленіяхъ, сопровождаемыхъ чрезвычайнымъ жаромъ и раждающихся въ слабыхъ кѣтчатыхъ частяхъ, наконецъ при воспаленіяхъ серозныхъ оболочекъ, склон-

ныхъ наиболѣе къ выпотѣніямъ. Напротивъ -того, если воспаленіе давно уже продолжается, зависить отъ внутреннихъ, дѣйствующихъ еще причинъ, или находится во внутреннихъ, очень углубленныхъ органахъ, соединено съ жестокою болью и чрезмѣрною чувствительностью, имѣть чисто рожевое, либо простудное, ревматическое или составоломное свойство, то дѣйствие холода можетъ причинять значительный вредъ, а потому всегда противупоказуется. Холодъ употребляется лучше всего въ видѣ примочекъ, дѣлаемыхъ посредствомъ грецкой губки, либо легкихъ компрессовъ надлежащей величины, кои обмакиваются для сего въ холодную ключевую воду, либо въ другой приличный составъ, выжимаются до умѣренной влажности и прикладываются на все пространство страждущаго мѣста. При семъ должно всегда смотрѣть на то, чтобы примочки таковыя не дѣлали излишней влажности въ постороннихъ, невоспаленныхъ частяхъ, чтобы приложеніе ихъ весьма прильжно возобновляемо было, тѣмъ болѣе, что онѣ чрезвычайно скоро согрѣваются и даже разгорячаются и что здѣсь равномѣрное состояніе температуры тщательно должно быть наблюдаемо. Льдяные кусочки въ пузырѣ, или въ жестяномъ футлярѣ, сдѣланномъ сообразно расположению страждущей части тѣла, дѣйствуютъ гораздо сильнѣе холодной ключевой воды. Однакожъ приложеніе льда, по причинѣ опасности озаблѣнія и помертвѣнія, требуетъ осторожности. Растворы селитры и нашатыря съ прибавлениемъ уксуса, въ формѣ Шмукеровыkh примочекъ (N 25.), не имѣютъ ощутительной выгоды и для чувствительныхъ, пѣ-

правда

жно организованныхъ частей не могутъ быть назнача-
мы, тѣмъ болѣе, что силою своею, отражающею жаръ,
они непревосходятъ холодной ключевой воды и только
во время растворенія своего бываютъ холоднѣе оной.
Испаренія эфировъ рѣдко предписываются для сего, да
и дѣйствіе ихъ сумнительно, по причинѣ совмѣстнаго раз-
драженія оныхъ. При чисто-травматическихъ воспалені-
яхъ и когда нѣтъ совершенно никакой опасности отсту-
пленія внутрь, полезенъ холодный растворъ уксусо-кис-
лаго свинца (Гулардова или свинцовая вода), который
имѣеть способность притуплять чувствительность нер-
вовъ, ограничивать кругообращеніе крови, наипаче це-
риферическое и задерживать отдѣленіе (воспалительное
выпотъщіе). Растворъ сѣрнокислого цинка (*sulphas zincii*)
полезенъ тамъ, гдѣ примѣчается значительная слабость
сосудовъ, также въ воспаленіяхъ, причиняемыхъ чрез-
мѣрнымъ ушибомъ, въ какомъ случаѣ можно примѣши-
вать нѣсколько камфорного спирта или водки.

§ 31.

V. Теплота. Тамъ, гдѣ употребленіе холода вред-
но, либо не можетъ быть переносимо, назначается теп-
лота и притомъ влажная или сухая, смотря по обстоя-
тельствамъ, но всегда въ такой температурѣ, которая
не превышала бы теплоту крови. а) **Влажная теплота**
предписывается въ примочкахъ и припаркахъ при со-
зревшемъ, или продолжавшемся уже нѣкоторое время
воспаленіи, при жестокой боли, твердой крѣпкой опу-
хли, пачавшемся уже выногѣніи, особенно при неиз-

бѣжко послѣдующемъ, либо наступившемъ нагноеніи. Употребленіе влажной теплоты допускаеть натуральное теченіе воспаленія, не такъ, какъ употребленіе холода, который задерживаетъ и насильственно останавливаетъ его. Впрочемъ таковое споспѣществованіе натуральному прохожденію воспаленія невсегда и непремѣнно должно оканчиваться нагноеніемъ, напротивъ того, при дѣятельномъ всасываніи отдѣленнаго, можетъ воспользовать и самое разрѣшеніе. Посему въ тѣхъ случаяхъ, где нагноеніе угрожаетъ, влажная теплота можетъ производить еще разрѣшеніе, способствуя всасыванію скопившихся прежде соковъ.

Для теплыхъ примочекъ (*fomentationes tepidae*) можетъ служить теплая вода, отваръ слизистыхъ, мало аромы содержащихъ травъ, корней, цветковъ и сѣмянъ к. с. *flores verbasci*, *sambuci*, *flores et herba meliloti*, *herba malvae*, *parietariae*; *radix althaeæ*, *symphliti majoris*, *semina lini*, *foenu graeci* etc.

Еще лучше удерживаютъ теплоту влажно-теплые припарки (*cataplasma*), дѣйствуя гораздо постояннѣе и не требуя столь частаго возобновленія. Приготавляются онѣ изъ веществъ, снабженныхъ порами, легко вздувающихся, воспринимающихъ въ свои промежутки большое количество водяного пара и долго удерживающихъ теплоту. Таковые суть пшеничные отруби, ржаная мука, высушенный и мѣлко истертый бѣлыи хлѣбъ, порошокъ изъ льняныхъ сѣмянъ, мука изъ рисовой крупы ипроч.—Вещества сіи варятся съ водой, либо съ молокомъ до густоты кашицы, прикладываются къ страждущимъ частямъ теплыми непосредственно, или завернутыя

въ рѣдкую пѣжную ветошку и перемѣняются почаще для удержанія ровной температуры. Припарки изъ разрѣшающихъ травъ, изъ печеныхъ яблоковъ съ шафраномъ и лукомъ, очень раздражаютъ и приличны только въ недѣятельныхъ воспаленіяхъ. Лучше всего употреблять для припарки species pro catapl. emollient. Ph. Bogus. Весьма болящія, әретическая воспаленія требуютъ прибавленія къ таковымъ припаркамъ или примочекъ наркотическихъ средствъ к. т. толченыхъ маковыхъ головокъ, белены, болиголова и пр. (N 48.).

b). Сухая теплота. Нѣкоторыя воспаленія напр. чисто рожевое, ревматическія и составоломныя не могутъ переносить влажно-теплыхъ примочекъ и припарокъ, но требуютъ всегда сухой теплоты, которая предписывается въ такомъ случаѣ въ мѣшечкахъ, наполненныхъ порошкомъ изъ бобовой муки, бѣлиль, пшеничной, овсяной муки и надлежащимъ образомъ подогреваемыхъ. Мѣшечки таковые прикладываются непосредственно на самое воспаленіе, которое прежде приложенія присыпается иногда таковыми же порошкомъ, либо другимъ потребнымъ веществомъ. Лучшій для сего составъ есть pulvis absorbens Phar. Castr. Ruth. et Phar. univ. pro us. extero.

VI. Сжимающій аппаратъ Junod^{-a}, посредствомъ коего производится водою, или воздухомъ сжиманіе въ воспаленной части и чрезъ то отвлекается отъ воспаленія кровь къ прочимъ здоровымъ частямъ. Аппаратъ сей весьма выгодно употреблять въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ оскудѣніе жизненныхъ силъ и недостатокъ крови

воспящають дѣлать кровопусканіе, (Revue medicale. Sept. 1834.)

§ 32.

Второе требование терапевтическаго показанія, относящееся до умѣренія возбужденаго состоянія общій жизнедѣятельности, составляетъ при антифлогистическомъ лѣченіи важнѣйшее условіе. Въ семъ отношеніи нужно придерживаться слѣдующихъ правилъ.—Легкія воспалительныя состоянія, не сопровождаемыя общимъ огневичнымъ противудѣйствиемъ, часто могутъ быть уничтожаемы однимъ мѣстнымъ антифлогистическимъ лѣченіемъ, при точномъ однако же выполненіи діатетическихъ правилъ и избѣжаніи новыхъ флогистическихъ раздраженій. Если же воспаленіе нѣсколько значительное и сопровождается уже легкими огневичными движеніями (synoqua mitior), то, для отвращенія сильнѣйшаго развитія ихъ, можно давать внутрь легкія, прохладжающія и укрощающія либо слабительныя средства, особенно растительныя кислоты (N 15. 19.): виннокаменная кислота, очищенный винный камень, тамарины и проч. Тамъ, гдѣ нужно умножить отдѣленіе кишечнаго канала, употребляются нѣжно слабящія соли: сѣрнокислая магнезія, сѣрнокислый и фосфорокислый натръ въ приличномъ соединеніи (N 15. 20). Весьма хорошее средство, уменьшающее возбужденное состояніе организма, составляетъ также насыщеніе углекислого поташа лимоннымъ сокомъ, либо уксусомъ (saturation).

kali carbonici citrata vel acetata). Для произведения болѣе усиленнаго противувоспалительного дѣйствія можетъ служить селитра, умножающая сверхъ того дѣятельность почекъ, особенно съ очищеннымъ виннымъ камнемъ (N 11). Если же сложеніе больнаго тощее, раздражительное, то нужно дѣйствовать не столько на испражненіе соковъ, какъ на успокоеніе раздраженной сосудистой и нервной системы, а потому въ такомъ случаѣ употребляются съ лучшимъ успѣхомъ оболакивающія слизистыя средства съ успокаивающими и прохладжающими (N 18). Таковое лѣченіе прилично вообще при умѣренномъ общемъ противудѣйствіи. Когда же оно *сильное*, оказывается воспалительною горячкою (synocha gravior), скорымъ и твердымъ жилобіеніемъ, большимъ жаромъ и жаждою, то необходимо нужны кровопусканія, чѣмъ болѣе, чѣмъ крѣпче и дороднѣе сложеніе больнаго, чѣмъ тверже жилобіеніе и чѣмъ сильнѣе воспалительные припадки. Смотря по обстоятельствамъ, кровопусканія могутъ быть иногда пѣсколько разъ повторяемы, по крайней мѣрѣ дотолѣ, пока продолжается твердое, частое жилобіеніе, нарочитая воспалительная боль и силы страждущаго значительно не упадаютъ. Вообще въ такомъ случаѣ слишкомъ обильное кровопусканіе менѣе причиняетъ вреда, нежели слабое, или вовсе пребреженіе. Когда общее противудѣйствіе достаточно уже умѣренно кровопусканіемъ изъ венъ, а мѣстные припадки еще очень сильны, то въ это время, но не прежде, назначаются *мѣстныя кровоисправленія* (§ 26). Впрочемъ въ ревматическихъ воспаленіяхъ; при наклонности къ отступлению, въ позд-

пемъ періодѣ воспаленія и при неизбѣжномъ наступленіи нагноенія испражненіе крови всякаго рода должно быть производимо съ осторожностю. Кромѣ кровопусканія, въ такомъ случаѣ потребны и другія противовоспалительныя средства, особенно *селитра*, которой можно предписывать для ежедневнаго употребленія до двухъ драхмъ съ слабительными солями въ порошкѣ (N 11.), либо съ успокаивающими и оболакивающими средствами (N 18.61.). По умѣреніи чрезмѣриаго возбужденія т. е. когда жилобіеніе здѣлается мягче, но все еще будетъ частое, боль въ воспаленіомъ мѣстѣ нѣсколько умалится и перемѣнится въ болѣе давящую и тупую, надлежитъ воспящать отложенію и способствовать всасыванію отложенныхъ уже органическихъ веществъ, для какого иамѣренія наружное и внутреннее употребленіе ртути составляетъ превосходное средство. Снаружи употребляется обыкновенно сѣрая ртутная мазь (ungv. hydrargiri cinereum), коей скрупуль или полдрахмы втирается ежедневно три или четыре раза въ окружности воспаленной части, но не на самомъ воспаленіи для избѣжанія раздраженія, могущаго произойти здѣсь отъ тренія. Весьма полезно также втирать близъ воспаленнаго мѣста порошокъ со слюною изъ трехъ гранъ услащенной ртути и опія. Для внутренняго употребленія избирается всегда *услащенная ртуть*, которая дается иногда въ большихъ приемахъ, всякий часъ отъ 1 — 4 гранъ. Поелику ртуть дѣйствуетъ болѣе на репродуктивную жизнь сосудистой системы, то для пониженія раздражительной стороны оной системы, средство сіе съ пользою можетъ быть соединяено съ паркотическими невозбуждаю-

щими средствами (*narcotica frigida*), к. с. белена, лактукарій, синеродистая кислота, кодеинъ, укусокислый морфій и проч. Средства сіи, дѣйствуя успокаивающимъ образомъ на общее чувствование (*sensus communis*), умѣряютъ и раздражительность сосудистой системы, наипаче синеродистая кислота и лавровишневая вода.

Если воспаленіе находится въ такомъ субъектѣ, который одержимъ *всеобщую слабостію*, то она весьма скоро сообщается въ такомъ разѣ мѣстному страданію и нарушаетъ правильное теченіе воспаленія, отнимая возможность, по причинѣ умаленной жизнедѣятельности, переходить въ разрѣшеніе. При таковыхъ условіяхъ рождается собственно т. н. *атоническое состояніе*, гдѣ эпігрія страждущей части, равно какъ и сила противудѣйстія, находится въ упавшемъ, пониженномъ состояніи. Въ сихъ случаяхъ общее лѣченіе должно быть сообразно особенному свойству горячки. Такимъ образомъ, если она имѣеть *простое астеническое свойство* (*sinochus simplex*), то предписываются легко возбуждающія средства: настой ромашки, бузины, мелиссы съ уксуснымъ насыщеніемъ углекислого поташа, съ уксусокислымъ амміакомъ (N 108.) и проч. *При первозномъ характерѣ горячки* (*slatus nervosus*) показуются летучія, возбуждающія, первыя средства, въ особенности камфора (N 21.) въ соединеніи съ опіемъ, рвотнымъ кампемъ, или услажненою ртутью. Когда же оказывается судорожное состояніе, соединенное съ великою слабостію и предстоитъ опасность скораго перехода воспаленія въ антоновъ огонь, то отличную пользу оказываетъ употребленіе мускуса (*moschus orientalis*), однакожъ

въ большихъ пріемахъ, чрезъ два часа по 4 или 6 гранъ и притомъ одного или въ соединеніи также съ камфорою и услащенною ртутью. Если горячка имѣетъ наклонность къ гнилостному состоянію (*status putridus*), то заблаговременно дается рвотное, а потомъ минеральная кислоты, наипаче acidum muriaticum et aqua oхymuriatica (N 64.) въ соединеніи съ возбуждающими и раздражающими средствами к. т. съ настойкою мауна, баранки, змѣевика, дыгильника и пр. Въ высшей степени таковаго состоянія необходимо нужны крѣпительныя съ различными раздражающими средствами, особенно хина (N 9. 22). Сообразно таковымъ внутреннимъ средствамъ назначается и дѣта т. е. питательная, умѣренно раздражающая, легковаримая пища, бѣлое мясо, мясные бульонь, яйцы въ смятку, хорошее виноградное вино и крѣпкое горькое пиво.

Что касается до мѣстныхъ средствъ, то здѣсь потребны также болѣе или менѣе возбуждающія и раздражающія, между коими камфора занимаетъ преимущественное мѣсто. Она соединяется для сего наилучше съ сѣрою ртутною мазью, либо съ другими разрѣшающими болѣе или менѣе возбуждающими средствами, к. с. полынь, иссопъ, цвѣты лаванды и баранки, можжевельныя и лавровыя ягоды, мелисса, маньчжурка, розмаринъ, цвѣты бузины, ромашки и т. п. Средства сіи употребляются сухими въ мѣшечкахъ, либо въ отварѣ съ виномъ въ видѣ припарокъ, либо въ наливкахъ, какъ примочки. Впрочемъ, если бездѣйственное состояніе воспаленія не очень явственно оказывается и нѣть наклонности къ разложенію соковъ, то лучше и въ семъ слу-

чай дѣйствовать мѣстно антифлогистически, однакожъ съ должною осторожностю и умѣренностию, а потомъ употреблять отводящія средства: горчичное тѣсто, нарывный пластырь, сухія насосныя банки, треніе раздражающими мазями и проч. При наступившемъ же *разрѣшеніи соковъ*, какъ обыкновенно бываетъ въ гнилой горячкѣ, или при наклонности воспаленія къ изъязвленію и антонову огню должно отложить прежнее наружное противувоспалительное лѣченіе, а употреблять мѣстно ароматныя средства, прикрывая страждущую часть согрѣваемыми ароматическими мѣшечками, обмывая ее spiritu camphorae, spir. cochleariae, sp. angelicae и проч. и дѣлая примочки изъ теплого виноградного вина, свинцовой воды съ камфорою либо изъ настоя бузинныхъ цвѣтовъ съ уксусокислымъ свинцомъ и настоякою опія (N 105).

§ 33.

Третье требование: удаление сопрѣженій, изъ коихъ частнѣйшія суть: желудочныхъ нечистоты (zorgdes gastricæ), препятствующія всегда надлежащему ходу воспаленія. При семъ однакожъ должно смотрѣть на то, можетъ ли испражненіе ихъ воспослѣдовать съ успѣхомъ. Если языкъ обложенъ вязкою слизью и очень сухъ, то, прежде испражняющихъ, нужно давать разрѣшающія (N 14. 38. 39) и солянныя средства к. т. murias амтониа, acetas potassæ, sulphas potassæ; а особливо tartarus stibiatus in refracta dosi до тѣхъ поръ, пока нечистоты заѣлаются подвижными, въ чёмъ можно удостовѣриться

изъ влажности языка и рыхлаго обложенія его. Въ семь случаѣ предписываются уже рвотныя или слабительныя, смотря по направленію, какое избираеть натура для испражненія нечистотъ т. е. чрезъ желудокъ или чрезъ кишки, чего однакожъ отнюдь недолжно почитать за одно и тоже, ибо гдѣ показуется рвотное, гдѣ существует *turgescensia sursum*, тамъ нельзя замѣнить его слабительнымъ и наоборотъ.

§ 34.

Четвертое требование: применение способа лъгнія къ особенному свойству воспаленія. Такимъ образомъ, если воспаленіе имѣть эретическое свойство т. е. если страждущій субъектъ весьма чувствителенъ, нѣжнаго сложенія, имѣть слабую силу противодействія и очень большую раздражительность, а пораженный органъ весьма изобилуетъ нервами, то обыкновенныя противувоспалительныя средства не очень приличны. Здѣсь съ общими кровопусканіями надлежитъ поступать очень осторожно, а назначать болѣею частію только мѣстныя кровоотвлеченія, да и то тамъ, гдѣ страждетъ благородный органъ, либо самое воспаленіе очень сильное. Для внутренняго употребленія предписывается въ таковыхъ случаяхъ съ большою пользою услащенная ртуть съ паркотическими, особенно не возбуждающими средствами. Здѣсь также прославлено употребленіе наперстянки (№ 6. 26. 54.), которая впрочемъ, хотя имѣть специфическую силу понижать раздражительность сосудистой системы, но это оказываетъ

она въ послѣдствіи только; первоначальное же дѣйствіе сопряжено съ нѣкоторымъ раздраженіемъ, что зависитъ, конечно, отъ содержанія въ ней острыхъ веществъ, кромѣ наркотизма. Впрочемъ, поелику наперстняника возвышающе всасываніе и умножаетъ отдаленіе мочи, то и прилична, подобно услащенной ртути, въ такихъ воспаленіяхъ, кои имѣютъ наклонность къ органическимъ отложеннымъ. Равнымъ образомъ *опій*, по причинѣ возбуждающаго первоначального дѣйствія своего, можетъ быть употребляемъ внутрь при воспаленіяхъ только тогда, когда дѣятельное состояніе въ сосудистой системѣ совершенно уничтожено, но остается еще сильная боль и первое напряженіе, оказываются судорожныя приступы, малый твердоватый пульсъ, сухая, жгучая кожа, водянистая моча и проч. Въ такомъ случаѣ опій дается внутрь въ соединеніи съ ипекакуаникомъ и сѣрнокислымъ поташемъ (N 7.), либо съ услащенною ртутью.

При воспаленіяхъ травматическихъ, происходящихъ отъ механической причины, разрушающей организацію какой либо части, к. т. отъ чрезмѣрного сотрясенія, растяженія, ушиба и проч., въ коихъ опухоль бываетъ очень большая, слабая и синяя, употребляются болѣе стягивающія средства. Часто воспаленія сіи сопряжены бываютъ съ дѣятельнымъ всеобщимъ противодѣйствиемъ (*synochia*); между тѣмъ какъ местное состояніе ихъ, отъ угнетенія или жестокаго пораженія жизнедѣятельности, представляетъ большую слабость. Посему случаю должноЩательно отличать и дѣйствовать сообщно существующему настроенію жизненныхъ силъ. Если оказывается значительное скопленіе крови въ воспален-

ной части, то можно припускать пьявки. Въ самомъ начальѣ хорошо дѣйствуютъ здѣсь примочки изъ холодной воды съ уксусомъ, также изъ холоднаго раствора уксусокислаго свинца, или сѣрнокислаго цинка, по прошествіи нѣкотораго времени доставляетъ большую пользу *mixtura vulneraria acida* (N 56.), а въ позднѣйшемъ теченіи, наипаче гдѣ примѣчается большое ослабленіе, сильная стягивающія лѣкарства к. т. растворы квасцовъ, отваръ корней узика ивой, либо дубовой корки и проч. не иначе однakoжъ, какъ въ соединеніи съ возбуждающими средствами.

Воспаленіе худосочнаго свойства допускаеть также употребленіе противувоспалительныхъ средствъ и нерѣдко требуетъ даже кровоотвлечений, если оно возышено до значительной степени. Впрочемъ, такъ какъ здѣсь флогистическое расположение смѣшано съ худосочнымъ, основывающимся на раздражительной слабости, то съ противувоспалительными средствами, наипаче съ кровопусканіями, надлежитъ поступать очень осторожно, дабы неувеличить ослабленія, могущаго умножить худосочный элементъ болѣзни. Воспаленіе здѣсь должно почитатъ за припадокъ, независящій собственно отъ худосочія, но произходящій отъ возвышенной воспалаемости, совокупной со всякимъ худосочіемъ. Посему оно, какъ *sympoma irrigens*, должно быть прежде уничтожаемо, сообразно его силѣ и степени, а противъ худосочія могутъ быть назначаемы собственно дѣйствующія средства по прекращеніи воспаленія, к. т. противъ венерического ртутнаго, противъ золотушнаго сурьянаго, вообще разрѣшающе-крѣпительныя и проч.

При переходящемъ или переносномъ воспаленіи, куда относится и критическое, должно избѣгать всего, что можетъ произвести мгновенное исчезаніе воспаленія въ наружныхъ частяхъ, преимущественно отвращать вліяніе холода, закутывая страждущую часть въ согрѣтую фланель, либо прикрывая ее теплыми мѣшечками изъ отрубей, разрѣшающихъ травъ, ромашки и проч. и предписывая впнтурь потогонительныя средства. Здѣсь вообще нужно споспѣществовать переходу въ пагноеніе употребленіемъ смягчающихъ припарокъ (N 48), кои соединяются иногда съ разрѣшающими средствами: печенымъ лукомъ, горчицею (N 105) и проч. наипаче тамъ, гдѣ воспаленіе начинаетъ исчезать, или имѣеть медленное теченіе. Если же воспаленіе отступило на внутреннія части, то всячески надлежитъ стараться возбуждать оное на прежнемъ мѣстѣ употребленіемъ ароматныхъ примочекъ, втираніемъ раздражающихъ или сурманныхъ мазей, жаленіемъ крапивою, прикладываніемъ горчичниковъ, нарывныхъ пластырей, компрессовъ изъ фланели, обмакиваемыхъ въ кипячу воду, пропусканіемъ горячихъ водяныхъ паровъ, прижиганіемъ и проч. Въ тоже время произшедшее послѣ отступленія страданіе, которое большою частію бываетъ воспалительного рода, должно быть пользуемо сообразно свойству его и важности пораженнаго органа.

§ 35.

Платос требованіе: возстановленіе жизненныхъ силъ, сообразно существующему состоянію, до со-

вершенного выздоровления. Если выполнениемъ предложенныхъ правилъ произведена будеть такая степень воспаленія, при которой можетъ послѣдовать исходъ въ разрѣшеніе, то этому надлежитъ способствовать, продолжая бывшій дотолѣ въ употребленіи способъ лѣченія, только гораздо въ слабѣйшей степени. Здѣсь также должно обращать вниманіе, какъ на мѣстное страданіе, такъ и на общее состояніе силъ, имѣя всегда въ виду, что для благополучаго разрѣшенія воспаленія необходимо нужна извѣстная степень жизненныхъ силъ. Посему отнюдь не должно ослаблять ихъ очень долговременнымъ и усиленнымъ антифлогистическимъ лѣченіемъ, въ особенности ненужно продолжать слишкомъ долго употребленіе холода. Лучше всего, произведши потребную для разрѣшенія степень воспаленія, дѣйствовать болѣе отрицательно, предохраняя часть отъ всякаго вреднаго вліянія и споспѣшствуя всасыванію, наипаче мѣстно, употребленіемъ ртутныхъ составовъ. Когда воспаленіе было очень сильное и противъ оного употреблено дѣятельное антифлогистическое лѣченіе, когда оно долго продолжалось и отъ того навлекло состояніе слабости въ воспаленномъ органѣ, то ртутныя средства соединяются съ раздражающими, наипаче съ камфорою и настойкою опія. Въ сіе время весьма приличны также отводящія средства, особенно парыиной пластырь, уничтожающій въ такомъ случаѣ остатокъ воспаленія. Вообще однакожъ при таковсмъ состояніи болѣе или менѣе необходимо употребленіе того способа лѣченія, который назначается обыкновенно при атоническихъ воспаленіяхъ (§ 52). Подобнымъ образомъ надобно посту-

пать и съ общимъ состояніемъ, назначая по обстоятельствамъ либо умѣренныя антифлогистическія, либо раздражающія и укрѣпляющія лѣкарства. Если оказываются переломы, то ихъ всячески нужно поддерживать, усиливая появившіяся испражненія (ч. 1. стр. 158). Крѣпительное лѣченіе, по окончаніи воспаленія, не во всѣхъ случаяхъ нужно. У крѣпкихъ особъ и тамъ, гдѣ воспаленіе имѣло среднюю силу и стеническое свойство, можно оканчивать лѣченіе одними антифлогистическими средствами, не давая внутрь раздражающихъ и крѣпительныхъ, особенно очень рано; да и тамъ, гдѣ они, по причинѣ слабости, должны быть употребляемы, надлежитъ дѣлать онымъ приличный выборъ, смотря по сложенію больнаго и другимъ обстоятельствамъ. Такимъ образомъ при значительномъ ослабленіи тѣла и для вялыхъ субъектовъ предписываются болѣе летучія и раздражающія средства, какъ змѣевикъ, дягильникъ, баранка и проч. либо эфирногоркія, какъ ирины корень, полынь (N 55) и проч., а при противныхъ условіяхъ легко укрѣпляющія, чисто горкія, напр. квассія, (N 96) горечавка и проч. Тамъ, гдѣ слабость произошла отъ большой потери крови, свойственна хина и желѣзные составы (N 9. 10.) вмѣстѣ съ зозбуждающими и питательными (N 69. 70.).
