

В.) Хроническое воспаление шулятъ.

(*Orchitis chronicā*).

§ 348.

Явление. Болѣнь сія начинается твердою опухолью падшулятика, которая спачала не сопровождается болью и открывается обыкновенно случайнымъ образомъ послѣ того уже, какъ страждущая часть достигнетъ значительной величины. Она постепенно умножаясь безъ всякихъ впрочемъ болей, подвергаетъ на копецъ состраданію самыя яички. Увеличенный падшулятикъ удерживаетъ свое очертаніе и можетъ еще явственно быть отличаемъ отъ яичка, которое, несмотря на умноженіе въ объятности и окрѣпость свою, не теряетъ свойственной ему гладкости на поверхности, хотя и бываетъ круглѣе обыкновеннаго. Во многихъ случаяхъ изливается во влагалищную оболочку водянистая жидкость. Общее здравье больнаго, по видимому, мало нарушается и только при значительномъ умноженіи объятности яичка и падшулятика, больной жалуется на нѣкоторую боль и чувство тягости въ пояснице и яичкахъ. Въ таковомъ состояніи болѣнь остается въ продолженіи пѣсколькихъ мѣсяцовъ. Накопецъ въ слѣдствіе какого либо новаго раздраженія, небольшаго ушиба во время верховой езды, неумѣреннаго употребленія спиртныхъ напитковъ

и т. п. опухоль яичка умножается и въ ономъ какъ и въ пояснице оказываются сильныя боли, при чемъ распухаетъ и краснееть мошонка. Состояніе таковое при спокойствіи тѣла, употребленіи пьявокъ и слабительного на нѣсколько времени облегчается, а потомъ, когда больной возвращается къ привычному роду жизни и начинаетъ дѣлать тѣлесное движеніе, оно опять мгновенно ожесточается, наступаютъ тѣ же самые припадки и облегчаются также вышеозначенными лѣченіемъ. Частые возвраты болѣзни доводятъ больного до того, что онъ рѣшается на конецъ на отнятіе страждущей части.

§ 349.

Исходы. а.) *Нагноеніе* обнаруживается при возвышенной степени воспаленія, при сильныхъ боляхъ и покраснѣніи мошонки. Скопленіе гноя можно въ семь случаѣ явственно ощущать въ концѣ прибавка и въ яичкѣ. б.) *Свищевыя лазы*, одна или нѣсколько, оказываются чаще послѣ произвольного вскрытия и источаютъ жидкость, подобную сѣмени, которая высыхая на холстинѣ, дѣлаетъ ее очень жесткою. с.) *Водяная болѣзнь* (hydrocele) рождается при воспаленіи серознаго покрова влагалищной оболочки. д.) *Мясистыя парашенія*, образующія опухоль, состоящую изъ разросшихся мясныхъ сосочковъ, кои, будучи стѣсняемы бѣлочною оболочкою, выдаются изъ парыма и часто примѣщаются даже на мошонкѣ.

В.) Хроническое воспаление шадшутъ.

(*Orchitis chronicā*).

§. 348.

Явленіе. Болѣнь сія начинается твердою опухолью падшутъника, которая сначала не сопровождается болью и открывается обыкновенно случайнымъ образомъ послѣ того уже, какъ страждущая часть достигнетъ значительной величины. Она постепенно умѣложаясь безъ всякихъ впрочемъ болей, подвергаетъ на копецъ сострадашю самыя яички. Увеличенный падшутъникъ удерживаетъ свое очертаніе и можетъ еще явственно быть отличаемъ отъ яичка, которое, несмотря на умноженіе въ объятности и окрѣпость свою, не теряетъ свойственной ему гладкости на поверхности, хотя и бываетъ круглѣе обыкновеннаго. Во многихъ случаяхъ изливается во влагалищную оболочку водянистая жидкость. Общее здоровье больнаго, по видимому, мало нарушается и только при значительномъ умѣложеніи объятности яичка и падшутъника, больной жалуется на нѣкоторую боль и чувство тягости въ пояснице и яичкахъ. Въ таковомъ состояніи болѣнь остается въ продолженіи нѣсколькихъ мѣсяцівъ. Наконецъ въ слѣдствіе какого либо новаго раздраженія, небольшаго ушиба во время верховой езды, неумѣреннаго употребленія спиртныхъ напитковъ

и т. п. опухоль личка умножается и въ ономъ какъ и въ полсницѣ оказываются сильныя боли, при чёмъ распухаетъ и краснѣеть мошонка. Состояніе таковое при спокойствіи тѣла, употребленіи пьявокъ и слабительнаго на нѣсколько времени облегчается, а потомъ, когда больной возвращается къ привычному роду жизни и начинаетъ дѣлать тѣлесное движеніе, опо опять мгновенно ожесточается, наступаютъ тѣ же самые припадки и облегчаются также вышеозначеннымъ лѣченіемъ. Частые возвраты болѣзни доводятъ больнаго до того, что онъ рѣпается на конецъ на отнятіе страждущей части.

§ 349.

Исходы. а.) *Нагноеніе* обнаруживается при возвышенной степени воспаленія, при сильныхъ боляхъ и покраснѣніи мошонки. Скопленіе гноя можно въ семь случаѣ явственно ощущать въ концѣ прибавка и въ личкѣ. б.) *Свищевыя лазы*, одна или нѣсколько, оказываются чаще послѣ произвольного вскрытия и источаютъ жидкость, подобную сѣмени, которая высыхая на холстинѣ, дѣлаетъ ее очень жесткою. с.) *Водяная болѣзнь* (*hydrocele*) рождается при воспаленіи серознаго покрова влагалищной оболочки. д.) *Мясистыя парашенія*, образующія опухоль, состоящую изъ разросшихся мясныхъ сосочковъ, кои, будучи стѣсняемы бѣлочною оболочкою, выдаются изъ пахива и часто примѣ чаются даже на мошонкѣ.

§ 350.

Причины сей болѣзни зависятъ нерѣдко отъ консти-
туционального предрасположенія. Она оказывается чаще
всего у тѣхъ, кои въ юности страдали золотухою, ослабили
тѣло свое неумѣреннымъ употребленіемъ спирт-
ныхъ напитковъ, продолжительнымъ ртутнымъ лѣченіемъ
и проч. Частыя вліянія простуды, холода и влажности
и чрезмѣрное удовлетвореніе дѣтороднаго побужденія
могутъ быть также побудительными причинами къ то-
му. Болѣе всего однакожъ дѣйствуютъ на произрожденіе
сей болѣзни страданія мочеиспускательного канала, со-
стоящія въ органическомъ измѣненіи слизистой перепонки
онаго.

§ 351.

Предсказание. Болѣзнь сія довольно важна, напа-
че по своимъ послѣдствіямъ, причиняющимъ болѣе или
менѣе значительное разрушеніе личекъ. Впрочемъ она
не представляетъ злокачественнаго страданія, покрай-
ній мѣрѣ такого, которое бы требовало отсеченія лич-
ка, почитавшагося въ прежнія времена необходимымъ,
по ложному предубѣждению въ злокачественности бо-
лѣзни.

§ 352.

Леченіе. Для успѣшнѣйшаго уничтоженія сей бо-
лѣзни необходимо нужно совершенное спокойствіе и го-

ризонтальное положение, соблюдаемое строго въ продолженіи цѣлаго мѣсяца. Внутрь должны быть даваемы, въ продолженіи значительного времени, по утру и вечеромъ достаточные пріемы услащенной хлористой ртути съ опіемъ. По прошествіи трехъ дней на четвертый, предписывается по утру на тощакъ слабительное изъ наливки александрийскаго листу съ сѣрнокислою магнезіею или другою солью (N 101.). Что касается до мѣстнаго лѣченія, то два раза въ недѣлю нужно припускать пѣвки къ мошонкѣ, ежедневно три раза дѣлать теплую припарку и употреблять обмываніе изъ уксусо-кислого амміака съ прибавленіемъ къ нему виннаго спирта, либо изъ камфорнаго уксуса. Таковое лѣченіе, продолжаемое долгое время, предотвращаетъ всегда переходъ воспаленія въ нагноеніе и другія неблагопріятныя послѣдствія (*C. Куперъ*).

Если болѣзнь состоитъ въ сочувственной связи съ мочеиспускательнымъ каналомъ, то, при значительномъ токмо съуженіи онаго, можно употреблять бужи и и другія потребныя для того средства, пока больной не оставляетъ еще горизонтального положенія; буде же существуетъ одна возвышенная раздражительность мочеваго канала, либо маловажное токмо съуженіе, то лучше полагаться на вышеозначенное лѣченіе и неупотреблять никакихъ механическихъ средствъ.

Масныя разрастанія въ легкой степени могутъ быть уничтожены сжимающею перевязкою и липкимъ пластыремъ, либо ежедневнымъ присыпаніемъ язвенной поверхности сѣрнокислою мѣдью, квасцами, красною осадочною ртутью въ порошкѣ и проч. При огромной опу-

холи и весьма уменьшномъ яичкѣ, лучше всего производить отнятие его. Если послѣ пары, образовавшагося въ яичкѣ, или надшуплятище произойдутъ свищи, то и въ семъ случаѣ, весьма хорошо давать внутрь сладкую ртуть съ опіемъ, рекомендовать горизонтальное положеніе и предписывать для впрыскиванія въ язву растворъ сѣриокислой мѣди, или сулемы. Въ упорныхъ случаяхъ, съ успѣхомъ дѣлаемъ быдъ глубокій разрѣзъ свищеваго отверстія, а иногда доставляла пользу заволока, проводимая во всякое отверстіе.

Воспаленіе предстательной железы.

(*Prostatitis*).

Syn. Inflammatio gl. prostatæ, prostatoncus phlogisticus.

§ 353.

Воспаленіе сіе рѣдко развивается первоначально въ существѣ самой желѣзы, но всегда почти образуется чрезъ распространеніе на ону другихъ страданій, особенно мочеиспускательного канала.

Явленія. Больной жалуется на чувство тяжести и усиленный жаръ въ шейкѣ мочеваго пузыря, къ чему

вскорѣ присоединяется безпрерывная бьющаяся боль, которая умножается при давлѣніи на проходную промежность и при всякомъ покушеніи испразнить мочу. Во время испражненія пиза болѣй ощущаетъ болѣзниную тягость, оказывающую давлѣніе на прямую кишку и какъ бы восп�ывающую выхожденіе экскрементовъ. Испражненіе мочи совершается съ затрудненіемъ и жгучею болью, а иногда и совершение восп�ащается. По прошествіи 3—4 дней отъ начала болѣзни можно ощущать введеніемъ въ прямую кишку пальцемъ значительное умноженіе въ объемности предстательной жељзы, которая дѣлается такъ же весьма чувствительною къ прикосновенію. Введеніе катетера, по причинѣ чрезмѣрныхъ болей, часто бываетъ невозможно.

Къ симъ мѣстнымъ припадкамъ присоединяется часто разстройство общаго здоровья съ ускореннымъ жилобієніемъ, жаркою кожею, обложеніемъ языкомъ, вообще съ явленіями огневичнаго противудѣйствія, которое бываетъ тѣмъ значительне, чѣмъ моложе и крѣпче больной.

§ 354.

Исходы. Воспаленіе предстательной жељзы, при остромъ теченіи, оканчивается обыкновенно въ 2—3, либо въ 7 дней *разрѣшеніемъ*, нагноеніемъ или отвердѣніемъ, но никогда не переходитъ въ антоновъ огонь (*Amussat*). Въ хроническомъ состояніи оно длится очень долго и переходитъ наиболѣе въ отвердѣніе. Наступленіе *нагноенія* въ началѣ бываетъ непримѣтно, когда

же оно достигнетъ большаго развитія и образуется нарывъ, то проходная промежность дѣлается очень чувствительна и оказываетъ примѣтную распухлость и твердость. Если нарывъ предоставляетъ самому себѣ, то онъ вскрывается иногда въ мочеиспускательный каналъ, чаще же пролагаетъ путь чрезъ кѣтчатую плену и мышицы проходной промежности къ наружѣ. *Отвердѣніе* желѣзы остается болѣею частію послѣ медленнаго воспаленія и сопряжено всегда съ значительною опухолью, затрудняющею мочеиспусканіе.

§ 355.

Причины. Болѣзнь сія рождается чаще всего отъ насильственнаго прекращенія перелойнаго теченія, либо отъ распространенія на предстательную желѣзу воспаленія мочеиспускательнаго канала, также отъ вышеупомянутыхъ насилий, дѣйствующихъ на проходную промежность, отъ неправильнаго введенія катетера, болѣе или менѣе застарѣлаго съуженія мочеваго канала у старыхъ людей и проч. Иногда причиной воспаленія бываетъ распутство въ физической любви, онанія, злоупотребленіе спиртныхъ напитковъ и т. п.

Предсказаніе. Острое воспаленіе сего рода рѣдко бываетъ очень трудною болѣзнию, но важно потому, что оно располагаетъ къ хронической распухлости и окрѣпости предстательной желѣзы, которая всегда чрезвычайно трудно излечивается. Сверхъ сего переходъ въ

парывъ можетъ подать поводъ къ образованію мочевыхъ свищей. Хроническое воспаленіе весьма упорно.

§ 356.

Леченіе. Если больной полнокровенъ и существуютъ признаки возвышенаго общаго противудѣйствія, то назначаются: кровопускание изъ руки (*Amussat*), теплые ванны; скудная но раздражающая диатета, горизонтальное положеніе въ постель, теплые смягчающія примочки и припарки, въ особенности же припущеніе пьявокъ къ проходной промежности и къ самому корнию уда, а если возможно, то еще лучше приложеніе кровососныхъ банокъ. Испражненію кишечнаго канала надлежить способствовать услажненою ртутью и средними солями, (N 15,20) также смягчающими и болеутолительными промывательными (N 37.). Въ послѣдствіи времени можно ежедневно предписывать клистиры изъ двухъ унціовъ жидкаго раствора крахмала и половины драхмы шаффранной настойки опія, давая также по временамъ легкое слабительное (*Brodie*). Когда существуетъ при семъ совершиное задержаніе мочи, то введеніе катетера должно производитьсь возможною бережливостію, лучше всего употреблять эластической, очень тонкій катетъ безъ проволоки, наблюдая притомъ, что бы онъ не оставался на долго въ мочеиспускательномъ каналѣ. Если есть поводъ думать, что парывъ образовался, то надлежить стараться доставлять гною свободное вытеченіе къ наружки и предотвращать вскрытие его въ моче-

испускательный каналъ. Посему, когда при означепыхъ признакахъ нагноенія (§ 354) откроется въ проходной промежности возвышенное, очень чувствительное мѣсто, то, не ожидал вѣрныхъ признаковъ нарыва, тотчасъ нужно здѣлать проколъ опухоли ланцетомъ въ направлении, ведущемъ прямо къ предстательной желѣзѣ. Часто случается при семъ, что для достиженія мѣста нарыва, нужно погружать ланцетъ до самаго черенка; чего однажды бояться не должно, ибо отъ такового прокола дурныхъ послѣдствій не бываетъ. Если бы и не находилось еще нарыва въ предстательной желѣзѣ, то и въ такомъ случаѣ проколъ доставляетъ ту пользу, что производить испражненіе крови и удаляетъ воспалительное напряженіе частей проходной промежности.

Когда по вскрытию нарыва, медленное заживленіе поддерживаетъ слабость во всемъ организмѣ, то съ успѣхомъ можно употреблять сѣриокислый хининъ, желѣзныя и другія крѣпительныя средства. Иногда оказываетъ пользу внутреннее употребление хвостистаго перца (*p. cubeba*) 20—50 гранъ, три раза въ день (*Brodie*). При переходѣ воспаленія въ хроническое состояніе и въ отвердѣніе должно испытывать соляные и сѣрия ванны, употребленіе внутрь щелочныхъ и соляныхъ минеральныхъ водъ, также отведенія и противураздраженія на ляшкахъ посредствомъ нарывныхъ пластырей, моксы и пр.; а при затруднительномъ мочеиспусканіи поступать какъ при сжатіяхъ мочеиспускательного канала.

D.) Воспаления кровеносно-сосудистыхъ желѣзъ.

Воспаление щитообразной железы.

(*Thyreoadenitis*).

Syn. Inflammatio gland. thyreoideæ, cynanche s. angina thyreoidea, thyreophyma acutum, struma inflammatoria, thyreonus inflammatiorius; воспалительный зобъ.

§ 357.

Полегіл. Боли въ томъ мѣстѣ, гдѣ имѣеть положеніе щитообразная железа, умножающіяся отъ прикосновенія къ онѣй, а иногда и отъ глотанія. Желѣза сія въ скоромъ времени при этомъ увеличивается въ обхватности своей и обнаруживаетъ возвышенную температуру. Таковые припадки могутъ оказываться какъ при существующемъ уже зобѣ, такъ и безъ оного съ произрожденiemъ небольшой, либо довольно значительной опухоли. Въ обоихъ случаяхъ однакожъ обнаруживаются нерѣдко сильные приступы одышки, что зависитъ, по видимому, отъ случающагося въ тоже время накопленія крови и корчей въ мягкихъ частяхъ горла. Большой чувствуетъ мучительныя отягощенія головы и шумъ въ ушахъ, лицо его дѣлается краснымъ, сонные артеріи сильно бьютъ.

си, иногда оказывается кровотечение изъ носу и къ этому присоединяется обыкновенно воспалительная горячка.

Воспаление сіа имѣетъ иногда *острое*, а иногда *продолжительное течение*; *разрешение* его совершается постепенно и при обыкновенныхъ критическихъ явленияхъ. Нѣкоторыми замѣченъ былъ переходъ *въ налоеніе* (*P. Frank, Baumgärtner*), при чмъ воспалительная опухоль сильно напрягается и дѣлается сперва твердою, а потомъ опять мягкою, кожа на щитообразной желѣзѣ воспаляется, наконецъ нарывъ вскрывается къ наружн., оставляя не рѣдко по себѣ свищъ, который можетъ долгое время гноиться и совершило разстроить желѣзу. Примѣчено также вскрытие нарыва въ дыхательное горло. Иногда остается послѣ воспаленія частное *затвердѣніе* желѣзы, или образованіе окостененія и землянистыхъ паразеній. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ оказывался даже переходъ въ *антоноевъ огонь*.

§ 358.

Случайные причины сего воспаленія суть напаче механическія поврежденія к. т. сильныя сжатія горла и удавка его, чрезмѣрныя напряженія при надувашіи д. инструментовъ, при трудныхъ родахъ и пр. также простуда и переходженіе на желѣзу катаррального раздраженія, даже будто бы вліяніе венерической заразы. (*F. v. Walther*).

Предсказаніе. Болѣзнь сія рѣдко бываетъ смертелью, впрочемъ иногда случаются przypadки удушенія столь сильные, что угрожаютъ значительную опасно-

стію. Весьма дурно, если по образованиі нагноенія, вскрытие нарыва произойдетъ въ дыхательное горло, хотя это случается очень рѣдко.

§ 359.

Лѣченіе назначается здѣсь обыкновенно противуспалительное. Часто необходимо нужно бывать общее кровоиспражненіе, составляющее вѣрнѣйшее средство къ отвращенію опасности припадковъ удушенія, при чемъ однакожъ достаточно всегда вскрывать плечевую вену; вскрытие же наружной яремной вены (*Fr. v. Walther*), можетъ быть дѣлаемо въ самыхъ крайнихъ случаяхъ. Въ легчайшей степени болѣзни приставляются плавки на сторонѣ опухоли. Изъ внутреннихъ лѣкарствъ одобряется преимущественно услащенная хлористая ртуть, которую въ позднѣйшес времія стали замѣнять съ отличнѣйшимъ успѣхомъ рвотнымъ камнемъ въ большихъ пріемахъ (N 104.). Если образуется нарывъ, то его заблаговременно надлежитъ вскрывать. По переходженіи воспаленія въ хроническое состояніе предписывается раздражающе-разрѣшающій способъ, состоящій изъ юдиновыхъ, сѣрыхъ и щелочныхъ приготовленій, также изъ разрѣшающихъ мазей и пластырей (N 122, 155).



Воспаление селезенки.

(*Splenitis*).

Synon. *Inflammatio splenis v. lienis; lienitis, pleuritis splenica.*

§ 360.

Язленія. Въ сторонѣ селезенки оказывается боль, либо тупая, давящая напрягающая и бьющая (когда воспалается внутренній составъ селезенки), либо очень острая, колющаia и раздирающаia, (когда поражается перепончатый покровъ ея); боль таковая умножается отъ давленія на лѣвое подреберье, отъ кашля, глубокаго выханія, измѣненія положенія, напаще съ лѣвой на правую сторону и распространяется нерѣдко на лѣвое плечо и на спину. Сверхъ сего, при ощупываніи страждущаго мѣста замѣчается твердоватая, болящая, ограниченная, форму селезенки представляющаia опухоль. Мѣстныя пораженія сіи сопряжены съ чувствомъ боли и жженія въ желудочної сторонѣ, съ тошнотою, наклонностію къ рвотѣ, часто также съ изверженіемъ желчной, а иногда и кровь содержащей жидкости. Большой имѣетъ головокруженіе, наклонность къ обморокамъ и очень затрудняется положеніемъ на лѣвомъ, а иногда и на правомъ боку. Сопутствующая огневица, часто бываетъ перемежающаia, либо непрерывнаa съ вечерними ожесточеніями, но въ началѣ болѣзни большую частью неправильнаa. Жилобіе сіе только въ пароксиз-

макъ бываетъ ускоренное, твердое и полное, въ другое же время иногда малое, скорое и твердоватое, а иногда неправильное и перемежающееся; моча скудная, желтая или красная, прозрачная; кожа сухая, жаркая, иногда желтая безъ прочихъ признаковъ желтухи. Нерѣдко случается также кровотечеіе изъ носа, паппаче изъ лѣвой ноздри. Въ дальнѣйшемъ теченіи болѣзни присоединяется иногда сильная кровавая рвота и кровянистый испражненія низа; болѣй дѣлается блѣднымъ, ослабленнымъ, иногда страждеть икотою и общими судорогами.

Гораздо чаще случается такое болѣзненное состояніе селезенки, при которомъ настоящихъ признаковъ воспаленія большею частію не находится, но такъ какъ оно сопровождается измѣненіемъ существа въ органѣ, то и считается многими за *скрытое воспаленіе* (*splenitis occulta*). Больные при семъ имѣютъ видъ блѣдноземлянистый, желтымъ отливающій, душевное расположение мрачное, не веселое, страждуть часто брюшными припадками, кислотою и вѣтрами, чувствуютъ не рѣдко давленіе, а иногда и колотье въ лѣвомъ подреберьѣ и при изслѣдованіи открывается часто большая или меньшая опухоль селезенки. Во многихъ случаяхъ появляется также кровавая рвота и удобно развивается водяная болѣзнь, а наконецъ и лихорадка изнурительная.

§ 361.

Воспаленіе селезенки можетъ *разрыва*ться, что происходитъ иногда послѣ кровотеченія изъ лѣвой ноздри,

послѣ оказавшагося почечнаго теченія, либо даже послѣ кровавой рвоты. Если образуется *нагноеніе* въ селезенкѣ, то можетъ произойти гнойное и кровянистое чревное теченіе (*fluxus spleniticus*). Частѣйшіе исходы суть: *разрастаніе* (*physconia lienis*) и *отвердѣніе* селезенки, также *сращеніе* съ окололежащими частями отъ пластического выпотѣнія въ переполочатый покровъ. *Антоновъ огонь* весьма рѣдко встрѣчается; а *смерть* наносится преимущественно кровоизлѣяніями, водяною болѣзнью и истощеніемъ.

§ 362.

Причины. Наибольшее расположение къ сему воспаленію, переходящее часто по наслѣдству, замѣчается въ мужественномъ возрастѣ при холерикомеланхолическомъ темпераментѣ. Къ случайнѣмъ причинамъ принадлежать механическія вліянія, раненія головы, переломы реберъ, подниманіе грузныхъ тяжестей. Иногда дѣйствуютъ на произрожденіе сей болѣзни болотный, влажныя страны, употребленіе въ избыткѣ мучной пищи, грубой, нечистой застоявшейся воды и спиртныхъ напитковъ, угнетающія страсти, переносы кори и составлена, отвердѣніе печени, поджелудочной желѣзы и проч. Чаще всего развивается она въ слѣдствіе венозныхъ застоевъ и разрастанія селезенки въ перемежающихся и мокротныхъ лихорадкахъ, при цынготномъ и почечнѣномъ расположеніи, въ желтой горячкѣ, тифѣ, патужномъ поносѣ, золотухѣ, легочной чахоткѣ и болѣзняхъ сердца.

Вообщѣ однакожъ воспаленіе селезенки, паипаче въ острой формѣ, принадлежитъ къ рѣдкимъ болѣзнямъ, можетъ быть потому, что мы неимѣемъ прямыхъ и вѣрныхъ наблюдений о разстройствахъ отправлениія селезенки, а должны выводить иѣкоторыя заключенія объ онъхъ только изъ разстройства отправлений другихъ органовъ.

По всему вѣроятію отправление селезенки состоитъ въ освобожденіи изъ крови водотвора, сообщающаго брюшной крови водотворное качество, также въ отведеніи и воспріятіи крови отъ желудка, къ коему, паипаче во время пищеваренія, притекаетъ она въ различно большемъ количествѣ. Посему, если означенные отправления селезенки разстроиваются, то также какъ при вырываніи селезенки у животныхъ, скопляется въ печени очень густая кровь, желчь дѣлается чрезъ то обуглетвореною и густою, и кожа окрашивается желтымъ цвѣтомъ, безъ дальнѣйшихъ однакожъ измѣненій, замѣчаемыхъ въ желтухѣ. Отъ воспященнаго развитія водотвора и задержанія крови въ селезенкѣ, умножается до чрезмѣрности количество кислотвора въ желудкѣ и чрезъ то произраѣдаются припадки разстроеннаго пищеваренія, сопровождающіе всегда воспаленіе селезенки; а отъ застоя крови, дѣлающагося при воспаленіи селезенки въ малыхъ сосудахъ опой, изливается кровь въ желудокъ и чрезъ то происходитъ кровавая рвота (*Marcus*).

§ 363.

Предсказаніе въ воспаленіи селезенки гораздо благопріатиѣ, нежели въ таковомъ же страданіи другихъ

внутренихъ органовъ; и притомъ тѣмъ благопріятнѣ, чѣмъ проще воспаленіе, чѣмъ менѣе худосоченіе болѣй и чѣмъ заблаговременнѣ доставляется приличное вспомоществованіе. Смерть рѣдко приключается здѣсь и при самомъ остромъ воспаленіи; большою же частію остающіяся послѣ него измѣненія въ существѣ селезенки, причиняя худосочіе въ тѣлѣ, напослѣдокъ смертельныя послѣдствія.

§ 364.

Лѣченіе. а.) *По причиннымъ показаніямъ.* Если причиною воспаленія прекращенное почечуиное теченіе, то приставляются пьявки къ проходной промежности; а если застои въ воротной системѣ, то употребляются легкія разрѣшающія средства (см. лѣч. скопл. печени част. 1. ст. 54.). Когда при этомъ продолжается еще перемежающаяся лихорадка, то, для уклоненія ея возвратовъ, необходимо нужны достаточные приемы сѣрно-окислого хинина (*Bally*), въ соединеніи иногда съ наштыремъ.

б.) *По существеннымъ показаніямъ* назначается противувоспалительный способъ, впрочемъ здѣсь рѣдко требуются столь обильныя кровопусканія (производимыя изъ лѣвой руки), какъ въ вѣкоторыхъ другихъ воспаленіяхъ,—и въ большей части случаевъ достаточно одно припущеніе пьявокъ, или приложеніе кровососныхъ бандажъ къ лѣвому подреберью. Послѣ сего предписывается втирание на страждущемъ мѣстѣ сѣрой ртутной мази, также отводящія на кожу средства. Изъ внутреннихъ

лѣкарствъ приличны паиболѣо прохладжающія и умѣренно слабящія к. т. сыворотка, приготовляемая съ виннымъ кампемъ, тамарииды (N. 13), pulpa cassiae fistulæ, kali citratum, лимонады и пр. Польза употребленія услажненной хлористой ртути вполнѣ еще недоказана. Въ хроническомъ воспаленіи селезени, сопряженномъ съ разрастаніемъ оной, одобряются производящія рвоту припарки изъ табаку (*Stedman*), либо изъ травы крестовника (*Senetio vulgaris*), также слабая наливка толокнянки (*Vetch*); слабительные вмѣстѣ съ крѣпительными, напр. винный камень, ревень, ялappa съ корнемъ коломбо и сѣриокислымъ желѣзомъ (*Abercrombie*); разрѣшающіе щелочные и сѣрые составы (N. 38—44), морскія ванны, солянныя минеральныя воды, какъ киссингенскія и другія, преимущественно же ѡодиокислое желѣзо на приемъ отъ 4—6 капель въ соединеніи съ сахарною водою (*Schönlein*).

с.) *По припадочнымъ показаніямъ.* Самой дурной припадокъ въ семъ воспаленіи составляетъ сильная кровавая рвота, для уничтоженія коей употребляются обыкновенные средства противъ сей болѣзни (см. 1. ч. стр. 102), въ особенности сѣрная кислота и Галлеровъ кислый элексиръ.



Е.) Воспаленія лимфатическихъ желѣзъ.

Воспаленіе паховыхъ желѣзъ.

(*Adenitis inguinalis*).

Син. Воспалительная опухоль въ пахахъ, воспалительный паховикъ; *bubo inflammatorius*, *adenophyuma inguinalis inflammatum*.

§ 365.

Такъ называется воспалительная опухоль паховыхъ желѣзъ, произражающаяся либо отъ одного мѣстнаго раздраженія, либо отъ внутреннихъ причинъ, обрѣтающихся въ самомъ организмѣ, либо отъ всасыванія постороннаго раздражающаго вещества, напр. венерическаго яда.

По таковыемъ причиннымъ содержаніямъ можно раздѣлить болѣзнь сю на два главныхъ рода, весьма важныхъ въ практическомъ отношеніи к. т. *на доброкачественный и венерический паховикъ*.

§ 366.

А.) *Доброкачественный паховикъ* (*bubo insons*) обнаруживается обыкновенными явленіями воспаленія желѣзъ (*adenitis*), представляя однакожъ въ теченіи и ис-

ходахъ своихъ иѣкоторыя измѣненія, смотря по разности причинъ, производящихъ онъ. Сюда принадлежать слѣдующіе роды паховика:

а.) *Bubo sympathicus* составляетъ сочувственное распуханіе паховыхъ желѣзъ, произходящее отъ обрѣтающагося вблизи, или въ отдаленіи мѣстнаго раздраженія. Чаще всего замѣчается онъ при переломѣ; — впрочемъ не представляетъ значительного страданія и проходитъ всегда съ уменьшеніемъ раздраженія, отъ коего онъ зависитъ. При неуклонялемъ однако же содѣйствіи вышеупомянутыхъ вредностей онъ возвышается иногда до сильнаго воспаленія и можетъ отъ небреженія переходить въ нагноеніе.

б.) *Bubo crescentium* образуетъ малоболящую, иѣсколько твердую, подвижную опухоль паховыхъ желѣзъ, отличающуюся болѣе воспалительнымъ раздраженіемъ, нежели дѣйствительнымъ воспаленіемъ. Опухоль сія замѣчается преимущественно у молодыхъ особъ, кои очень скоро растутъ и приближаются къ периоду способности дѣторожденія. Ближайшая причина оной состоить, по видимому, частію въ раздраженіи всей лимфатической системы, зависящемъ отъ возвышенного образовательного стремленія, а частію отъ раздраженія и умноженнаго сочувствія, какое обыкновенно бываетъ при развитіи системы отправлений пола.

с.) *Bubo rheumaticus s. catarrhalis* есть воспалительная опухоль паховыхъ желѣзъ, достигающая различной степени, обыкновенно соединенная съ воспалительнымъ распуханіемъ лимфатическихъ сосудовъ и раждающаяся отъ сильной простуды, наипаче погъ и нижней стороны брюха. Иногда болѣзнь сія начинается воспаленіемъ

лимфатическихъ сосудовъ, происходя отъ нижнихъ конечностей и утверждалась наиболѣе въ паховыхъ желѣзахъ, а иногда бываетъ припадкомъ ревматической горячки.

д.) *Bubo scrophulosus*. Болѣзнь сїа случается чаще въ отроческомъ возрастѣ до развитія дѣтородной способности и составляетъ всегда припадокъ очень усилившейся золотухи. Нерѣдко также оказывается она и у взрослыхъ, по большему частію въ соединеніи съ ревматизмомъ, или венерическою болѣзнью. Отличительные признаки сего паховика суть: твердая, упругая, ограниченная опухоль, состоящая изъ многихъ распухшихъ желѣзъ, шарообразно округленныхъ; краснота оной бываетъ болѣе синяя, пепельносѣрая, въ окружности постепенно исчезающая, боль тупая и теченіе столь медленное, что она въ совершенное нагноеніе переходить только по прошествіи нѣсколькихъ недѣль и мѣсяцевъ.

е.) *Bubo metastaticus et criticus* рождается часто въ періодѣ преобразованія огневичныхъ болѣзней, наипаче кори, оспы, скарлатина, злокачественныхъ горячекъ, также въ родильной горячкѣ, во время родовыхъ очищепій и въ чумѣ (*Bubo pestilentialis*).

§ 367.

Лѣченіе доброкачественнаго паховика назначается сопротивлению свойству и происхожденію его. При собственномъ паховикѣ должно дѣйствовать на умѣреніе того раздраженія, отъ коего онъ произошелъ, съ

уничтожениемъ коего онъ обыкновенно самъ собою проходитъ. Если впрочемъ отъ небреженія, или неправильнаго лѣченія паховикъ таковой восприметъ высшую степень воспаленія, угрожающаго нагноеніемъ, то для предотвращенія онаго потребно усиленное противувоспалительное лѣчение посредствомъ пьявокъ, приставляемыхъ вокругъ паховыхъ желѣзъ, втирашеніе сѣрой ртутной мази ниже опухоли и употребленіе смягчающихъ припарокъ съ свинцовою водою (N. 105), кои при соблюденіи спокойствія и умѣренной иерадражющей діеты способствуютъ всегда разрѣшенію воспаленія. Когда воспаленіе сопровождается парочитою болью и представляетъ болѣе эретическое свойство, то весьма хорошо втирать теплое льняное масло, *oleum linoesinum* со *сочин.*, успокаивающія мази (N. 49) прикладывать припарки изъ льняной муки съ беленою, болиголовомъ (N. 48) и пр. Если же по устраниеніи воспаленія останется твердость въ опухоли, то она можетъ быть уничтожаема ртутнымъ пластиремъ (N. 135), втираніемъ ртутной и летучей мази съ камфорою и опіемъ. По переходѣ въ нагноеніе должно поступать такъ, какъ при паривахъ желѣзъ вообще.

Паховикъ, случающійся у молодыхъ особъ при наступлении периода возмужалости (*B. crescentium*) проходитъ самъ собою и требуетъ только спокойнаго содержанія и иерадражющей діеты.

Ревматический, простудной паховикъ обыкновенно имѣеть острое теченіе и въ большей части случаевъ самъ собою проходитъ при спокойномъ содержаніи и соблюденіи легкой противувоспалительной діеты. Если впрочемъ воспалительные явленія достигаютъ высокой

степени, то можно назначать общее и местное антифлогистическое лечение, такъ какъ при воспаленіи околоушныхъ желѣзъ (§ 326) и лимфатическихъ сосудовъ.

Золотушный паховикъ требуетъ специфическихъ разрѣшающихъ средствъ, особенно юдина, даваемаго по способу *Люголя*, наперстники (N. 6.), экстракта одуванчиковъ (N. 38), шандры (N. 39), бычачей желчи (N 52), мыльныхъ, ревеневыхъ и др. приготовлений, снаружи Ронкалевой мази, состоящей изъ бычачей желчи, орехового масла и поваренной соли, также ртутныхъ, мыльныхъ пластырей; а въ упорныхъ случаяхъ каменнаго масла, камфоры, соли оленяго рога и пр. приведенныхъ въ форму мази (N. 122.)

Въ переносномъ и критическомъ паховикъ большою частію потребно споспѣшствовать наглоенію и вообще лѣчить воспалительную опухоль такъ, какъ критическое воспаленіе околоушныхъ желѣзъ (§ 326 — 2). Если онъ неразвивается надлежащимъ образомъ или даже начинаетъ, по видимому, исчезать, то предписываются раздражающія припарки (N. 106.); если же напротивъ того оказываются жестокія боли, то ихъ нужно укрощать смягчающими болеутолительными припарками. *Чумный паховикъ* пользуется точно такъ, какъ заранееенный вередь (§. 124.).

§ 368.

B.) *Венерический паховикъ* (*bubo venereus s. syphiliticus*) есть воспалительная опухоль паховыхъ желѣзъ,

произошедшая отъ распространенія венерического яда, доселъ мѣстно-дѣйствовавшаго на лимфатическую систему и означающая посему стремленіе мѣстной, первоначальной венерической болѣзни содѣлаться послѣдстви-
емъ и общею.

Предположеніе, что венерическій ядъ можетъ во время заразительного совокупленія непосредственно всасы-
ваться, непроизводя прежде шанкра или перелоя, и пе-
репесвшись въ лимфатическую желѣзы, раждать въ онъхъ
т. н. венерическій паховикъ, не подтверждается новѣй-
шими опытами (*Kluge*), въ слѣдствіе коихъ оказалось, что
венерическому паховику всегда предшествуетъ шанкръ,
который впрочемъ часто пропускается безъ вниманія,
или не усматривается по своей малости, либо воспал-
щается въ дальнѣйшемъ распространеніи употребленіемъ
свинцовыхъ и другихъ средствъ, производящихъ виѣш-
шее заживленіе его. По сему паховикъ таковой всегда
должно почитать послѣдственнымъ венерическимъ стра-
дашеніемъ (*morbis secundarius*), а не первоначальнымъ
(*m. idiopathicus*). Вообще онъ представляетъ простую
форму венерической болѣзни въ чистомъ видѣ, форму
воспаленія въ лимфатической системѣ, отличающуюся
чрезмѣрнымъ собственнаго рода отдѣленіемъ, соединен-
нымъ съ большою наклонностію къ разрушенію орга-
нической массы.

§ 369.

Явленія и течение. Болѣзнь начинается: а.) *пред-
вѣстниками* (*stadium invasionis, stadium prodromorum*),

кои суть собственно первые слѣды образующагося воспаленія. Больной чувствуетъ сперва непріятное напряженіе и боль, простирающуюся отъ язвы дѣтородныхъ частей вверхъ къ пахамъ; движение ногъ и хожденіе дѣлается трудноватымъ; желѣза въ паху одна или многія распухаютъ и оказываются въ видѣ небольшихъ ограниченныхъ узелковъ, кои, постепенно увеличиваясь, возрастаютъ до голубинаго лѣца, по покровы на опухоли удерживаютъ еще натуральный свой цвѣтъ. б.) Послѣ сего наступаетъ настоящій воспалительный *періодъ болѣзни* (*stadium inflammatorium*), въ коемъ означенные припадки умножаются и достигаютъ высшей степени, боли усиливаются, дѣлаются напрягающими, колющими, въ почное время ожесточаются и позволяютъ ходить только съ большимъ затрудненіемъ и при согнутомъ туловищѣ. Опухоль возрастаєтъ до значительной величины, покровы на оной получаютъ ограниченный мѣднокрасный цвѣтъ и при давленіи ея чувствуется боль и твердость. Въ высшей степени сего воспаленія распухаютъ нерѣдко и лимфатические сосуды въ направлении отъ шанкра къ паховымъ желѣзамъ и рождаются сочувственная горячка болѣею частию послабляющаго свойства, болѣе или менѣе сильная, смотря по сложенію больнаго. с.) При наступленіи *третьаго* или *періода нагноенія* (*stadium suppuraforium*) оказывается ознобъ, колющая боль перемѣняется въ тупую и бьющуюся, опухоль смягчается, въ серединѣ своей возвышается и покрывающая ее кожа болѣе и болѣе истощивается, наконецъ прорывается; при чёмъ истекаетъ сперва какъ бы доброкачественный гной, но вскорѣ гной-

ная поверхность превращается въ язву, которая быстро распространяется въ объятности, а края увеличиваясь, выворачиваются и покрываются бѣлымъ, живру подобнымъ веществомъ, такъ какъ и самое дно язвы. Въ сіе время открытая паховая желѣза есть ничто иное, какъ большая венерическая язва, коей гной имѣеть преимущественную заразительную способность и отъ коей можетъ послѣдовать всеобщее зараженіе, если не предпринято будетъ дѣятельныхъ мѣръ основательнаго лѣченія.

§ 370.

Разности. Паховики венерическіе не всегда имѣютъ одинаковыя явленія и течениe, по разнствуютъ въ семъ отношеніи болѣе или менѣе по свойству воспаленія. Шведіоръ раздѣляетъ ихъ на *длѣтѣльные* или *стенические* и *бездлѣтѣтельные* или *атонические* паховики. Первые отличаются высокимъ мѣднокраснымъ цвѣтомъ покрововъ, стеническимъ состояніемъ воспалительныхъ явленій и сопряженіемъ съ горячкою, особенно въ высшей степени болѣзни и предъ наступленіемъ патоноенія. Атонический паховикъ случается у слабыхъ, худосочныхъ особъ, имѣетъ болѣе темнокрасный цвѣтъ покрововъ и соединенъ вообще со слабою силою мѣстнаго и общаго противудѣйствія. Теченіе его различно. Иногда онъ скоро переходитъ въ нагноеніе и разрушаетъ окружающія части на значительное пространство, чаще же, вскрываясь во многихъ мѣстахъ, образуетъ *свищевые язвы*.

Что касается до исходовъ, то кроме нагноенія, свищевыхъ язвъ и частныхъ окрыпостей, венерическій паховикъ переходитъ не рѣдко въ антиносъ огонь, особенно при вредной атмосфѣрѣ, окружающей боливаго, какъ случается въ очень наполненныхъ госпиталяхъ, или при безрасудномъ возбуждающемъ лѣченіи.

§ 371.

Распознаваніе. Если находится дѣйствительный шанкръ и къ нему присоединяется распухлость близлежащей желѣзы, то таковую опухоль всегда должно почитать венерическимъ паховикомъ, ибо не вѣроятно, чтобы опухоль могла произойти въ семь случаѣ чрезъ сочувствіе отъ одного воспалительнаго раздраженія, а не отъ распространенія яда. Вообще настоящій венерическій паховикъ поражаетъ большею частию одну какую либо паховую желѣзу и при томъ наиболѣе въ верхнемъ ряду ихъ. Онъ всегда имѣетъ наклонность къ нагноенію, которое образуется въ немъ довольно скоро. Боль, сопровождающая его, бываетъ очень сильна, опухоль тверда, и притомъ мѣдио-красного цвѣта. Сочувственный паховикъ напротивъ того не имѣеть ни значительной твердости, ни боли, увеличивается медленно, обнаруживаетъ чистую воспалительную красноту и исчезаетъ обыкновенно вскорѣ самъ собою, если причиняющее его раздраженіе уменшается или устраивается. Такимъ же образомъ могутъ быть отличаемы отъ него и разные виды доброкачественнаго паховика. (§. 362). *Полсничные и т. п. конгестивные пары,*

образующіеся въ пахахъ, имѣть только форму паховиковъ, но чрезъ сравненіе явлений тотчасъ могутъ быть отличаемы. Часто грыжи, напаче небольшія бедренныя, ущемляемыя при первомъ ихъ выпаденіи, смѣшиваются съ паховиками. Въ такомъ случаѣ, кроме свойственныхъ грыжамъ явлений, могутъ руководить къ распознаванію существующіе przypadки ущемленія и точное изслѣдованіе рукою.

§ 372.

Предсказание въ венерическихъ паховикахъ всегда хуже, нежели въ первоначальныхъ венерическихъ болѣзняхъ (шанкръ и перелотъ), потому что паховики означаютъ уже начавшійся переходъ мѣстной въ общую венерическую болѣзнь. Хотя они въ началѣ и могутъ разрѣшаться, однако же переходъ ихъ въ нагноеніе благопріятнѣе, ибо до тѣхъ поръ, пока существуетъ въ нихъ такое состояніе воспаленія, какое необходимо для надлежащаго нагноенія, общее зараженіе въ другихъ органахъ не обнаруживается, слѣдственно въ отношеніи заразы онъ оказываетъ какъ бы отводящее дѣйствіе. Стеническаго рода паховики допускаютъ благопріятнѣйшее предсказаніе, нежели атоническіе, кои часто сопряжены бываютъ съ значительнымъ разрушениемъ мягкихъ частей и произведеніемъ свищевыхъ ходовъ и язвъ. Слишкомъ слабая степень воспаленія бываетъ не рѣдко причиною перехода въ упорное отвердѣніе. Антоповъ огонь составляеть всегда очень неблагопріятное явленіе, хотя замѣ-

чено, что произрождениемъ его общее и местное венерическое зараженіе истребляются (*C. Kluge*).

§ 373.

Лѣченіе. Поелику венерической паховикъ означаетъ уже начало общей венерической болѣзни, которая впрочемъ до тѣхъ порь, пока она воспаляется и гноится, не заражаетъ прочихъ составовъ тѣла, то при лѣченіи онаго должно стараться всегда споспѣшствовать переходу его въ нагноеніе, дабы тѣмъ предотвратить разпространеніе венерической заразы на благороднѣйшіе органы, либо на волокнистые оболочки и кости, гдѣ она гораздо труднѣе истребляется. Разрѣшеніе сей болѣзни противувоспалительными средствами, к. т. пьявками, холодною водою, местнымъ давленіемъ и проч., даже въ самомъ началѣ болѣзни, неумѣсто, ибо послѣ того, венерическая болѣзнь и при скоромъ употреблении ртути открывается въ весьма легкой степени въ другомъ мѣстѣ и глубже вкореняется. Способъ *Гунтера*, *Белла* и *Шведіора* разрѣшать паховикъ втираніями сърой ртутной мази на самыхъ пораженныхъ желѣзахъ, продолжаемыми до слюнотеченія, кромѣ упоминутой невыгоды разрѣшенія, оказываетъ еще тотъ вредъ, что паховикъ удобно воспринимаетъ отъ того такъ называемое *меркуріальное свойство*. Внутреннее употребленіе ртути, хотя, по видимому, необходимо для истребленія специфической болѣзни, отъ коей зависитъ паховикъ, но такъ какъ она действуетъ анти-

флогистически, следственно ослабляет силу воспаления, потребную для образования нагноения, то употребление опей может быть всегда отлагаемо до вскрытия паховика, темъ болѣе, что общаго зараженія венерическою болѣзнию въ семъ случаѣ опасаться нельзя, ибо при столь измѣненіи отправлениіи лимфатическихъ сосудовъ и при противоположномъ направленіи ихъ дѣятельности всасываніе не можетъ имѣть мѣста (*Rust*).

По сему при лѣченіи венерического паховика должно стараться: а) приводить его въ нагноеніе и скорѣйшее созрѣніе; б) по вскрытии парыма дѣйствовать сообразно свойству отдѣлительной поверхности; с) уничтожать особенные припадки, исходы и послѣдствія такового болѣзеннаго состоянія.

§ 374.

1.) Въ выполненіи *перваго показанія* надлежитъ сообразоваться со свойствомъ паховика. Ежели онъ представляетъ дѣятельное, стеническое состояніе, то назначаются теплые смягчающія припарки (N. 48) изъ муки льняныхъ сѣмянъ, изъ набора смягчающихъ средствъ (*species emollientes*) и проч., къ коимъ, при аретическомъ характерѣ болѣзни можно примѣшивать траву болиголова или белены и пр. Атолическій паховикъ требуетъ означенныхъ смягчающихъ средствъ въ соединеніи съ раздражающими, каковы суть: лукъ, медъ, мыло и проч. Если же паховикъ совершенно бездѣйственнаго свойства и не показываетъ никакой наклонности къ нагноенію, то нужны острыя раздражающія припарки *Керндалл* (N. 106),

прикладываемыя днемъ нѣсколько разъ и оставляемыя дотолѣ, пока болѣй можетъ стерпѣть. Въ ночное время опухоль можно прикрывать ртутнымъ или дихильнымъ пластыремъ, а при совершенной недѣятельности даже парывнымъ пластыремъ, соединяемымъ съ двумя частями сложнаго свицового пластиря (*empl. lithargyri compositum*).

Употребленіе сихъ средствъ подобно продолжать до тѣхъ поръ, пока вся твердость опухоли въ окружности смягчится и въ то время тотчасъ вскрывать нарывъ ланцетомъ, или бистуреемъ во всю длину его и при томъ параллельно съ продольною осью тѣла (*Rust*). Натурѣ можно предоставить вскрытие только при малыхъ паховикахъ. Употребленіе ъдкаго средства, или крестообразный разрѣзъ заслуживаютъ преимущество при атоническомъ свойствѣ болѣзни.

§ 375.

2.) По вскрытии паховика искусствомъ или натурою, дальнѣйшее *лѣченіе* должно быть *сообразно свойству отдалительной поверхности нарыва*. Въ семъ отношеніи надлежитъ поступать слѣдующимъ образомъ:

a.) Если дио паховика покрыто доброкачественными мясными сосочками и показываетъ наклонность къ скорому заживленію, то нужна только простая перевязка или употребленіе смягчающихъ припарокъ, буде существуетъ твердость въ обятыности нарыва. Таковое состояніе болѣзни показываетъ, что она не имѣеть венеп-

рическаго свойства, или что свойство такоеое уничтожено до вскрытия паховика ртутью, которая даваема была въ достаточномъ количествѣ для истребленія шанкра, либо даже употреблешемъ средствъ, способствующихъ нагноенію (*Bonorden*). Внутреннее ртутное лѣченіе можетъ быть назначаемо въ семъ случаѣ только тогда, когда остаются еще шанкры несовершенно заживленными, или когда отъ онаго язва паховыхъ желѣзъ приходитъ въ лучшее состояніе.

б.) Когда же вскрывшійся паховикъ представляетъ гноящуюся полость, какъ бы жиромъ покрытую, а снаружи ограниченную красноту мѣднаго цвѣта и тѣмъ показываетъ венерическое свойство, то употреблеше ртути необходимо нужно. Лучшій составъ для сего есть *хлористал услащеннал ртуть* (*chloridum hydrargiri*), дѣйствующая на желѣзы сильнѣе всѣхъ ртутныхъ приготовленій. Никогда однакожъ не должно давать ее въ умножаемыхъ слишкомъ скоро приемахъ, ибо теченіе болѣзни сей медленное и прежде, нежели уничтожится венерическое свойство онай, часто по причинѣ очень усилившагося слюнотеченія, нужно бываетъ прекратить употреблеше ртути. Самая лучшая форма для сего есть порошокъ, въ которомъ услащенная ртутьдается по утру и вечеромъ отъ $\frac{1}{4}$ до 1 грана, въ соединеній съ корнемъ или сгущеннымъ сокомъ локричника и черезъ два или три дня умножается приемъ половиною грана. Порошокъ таковыи удобнѣе можетъ быть принимаемъ сухой, власыпаемый на языкъ и запиваемый водою (*Bonorden*). Мѣстное лѣченіе должно ограничиваться въ такомъ случаѣ только паліативнымъ употреблешемъ какой либо не

раздражаютъ припарки или мази. Въ особенности нужно остерегаться местнаго употребленія ртутныхъ средствъ, напр. мази красной осадочной ртути, которая возбуждала въ язвѣ хорошее ростопроизводство, можетъ заставить думать врача о совершенномъ истребленіи венерического свойства болѣзни, между тѣмъ какъ внутреннее зараженіе остается вовсе неувидѣннымъ и раждаетъ въ послѣдствіи гораздо упорнѣйшую форму страданія (*Dzondi*). Впрочемъ *Rust* правило сіе почитаетъ не столь существеннымъ и пользуетъ местно язвенную поверхность, смотря по разности свойства ея и состоянію жизнедѣятельности (§ 57.58.), утверждая даже, что безъ местнаго и ртутнаго содѣйствія заживленіе оной всегда происходитъ очень медленно.

с.) Иногда вскрывшійся паховикъ обнаруживаетъ такъ называемое *меркуріальное свойство*, представляюще (по наблюденіямъ *K. Клуге*) значительную твердость въ обѣяности нарява, почти всегда сильное припадочное распуханіе многихъ желѣзъ, синекрасную окружность язвы, твердые, перегнутые края оной, снабженные всегда съ отдельной поверхности узкою, красною закраиною, а дно болѣе бѣловатое, усаженное красными точками, при чёмъ больной имѣть особенный меркуріальный обликъ и десны его обложены на краю краснымъ цветомъ. Сіи явленія, оказывающіяся панболѣе у особъ, имѣющихъ венозное расположение (*haemorrhysis*) доказываютъ излишнее употребленіе ртути, которое нужно тотчасъ прекратить. Послѣ сего язва обыкновенно въ скоромъ времени, при простомъ местномъ лѣченіи, поправляется; если же нетъ, то должно

употреблять сѣрныя ванны, сѣрныя приготовленія и другія специфически дѣйствующія противъ ртути средства, или Циттманна декоктъ, который, по опытамъ Клюге и Руста доставляетъ въ семъ случаѣ наилучшую услугу. Для наружнаго употребленія, т. е. для обмыванія и впрыскиванія, очень похвается разведенная по поламъ водою соляная кислота, если впрочемъ воспалительное состояніе допускаетъ употребленіе оной. Весьма полезенъ также растворъ полудрахмы селитро-кислого сплавленнаго серебра въ 10 унцахъ воды.

§ 376.

3.) *Третье показаніе* требуетъ лѣченія исходовъ и послѣдствій паховика, изъ коихъ главнѣйшіе суть: антоновъ огонь, злокачественное перерожденіе, отвердѣніе и свищевыя язвы.

а.) Если венерическій паховикъ переходитъ въ антоновъ огонь, то надлежитъ удалить побудительную причину къ тому, содержать больнаго въ чистой атмосфѣрѣ, доставлять ему питательную, раздражающую пищу, давать внутрь хину, а мѣстно поступать по общимъ правиламъ лѣченія антонова огня (§ 77). По устраниніи антоново-огненнаго разрушенія употребленіе ртути не нужно, ибо означеннымъ разрушениемъ уничтожается венерическій ядъ, какъ мѣстно, такъ и во всемъ организмѣ.

б.) Иногда, при продолжаемомъ употребленіи ртути, вместо улучшенія, язва постепенно переходитъ *въ зло*

качественное перерождение, разрушающее сильно мягкия части, подобно госпитальному антонову огню, и зависящее отъ таковых же причинныхъ условий. Въ семъ случаѣ должно поступать по всемъ правиламъ лѣченія антонова огня (§ 74—81.).

с.) Не рѣдко паховикъ по вскрытии своею переходить въ *отвердлніе* и *свищевыя язвы*, къ чему подаютъ поводъ золотушное, а особливо ревматическое расположіе и дурное содержаніе большаго, либо слишкомъ раннее вскрытие паховика (*Rust*). Что касается до лѣченія, то оное можетъ быть производимо по общимъ правиламъ лѣченія нарывовъ (§ 57.58.). Тамъ, гдѣ подало поводъ къ таковому исходу ревматическое или золотушное расположаніе, превосходно действуетъ сулима, даваемая ежедневно вечеромъ по $\frac{1}{10}$ грана при употреблении общихъ теплыхъ ваннъ и совершенно не раздражающемъ мѣстномъ лѣченіи болѣзни. Весьма полезно также давленіе, производимое прикладываніемъ камня. Сѣрыя ванны, особливо естественные, суть весьма важныя средства, напаче тамъ, гдѣ предшествовало чрезмѣриое или неправильное употребленіе ртути.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

ВОСПАЛЕНИЯ ПАРЕНХИМНЫХЪ ОРГАНОВЪ.

(*Parenchymatitides*).

§ 377.

Паренхимъ (*parenchyma*), отъ слова *παρεγχύω*, *переливаю*, въ тѣскомъ смыслѣ означаетъ собственно внутреннее существо только такого органа, въ коемъ кровь, приносимая сосудами, измѣняется собственнымъ образомъ, не разлагаясь однакожъ на ближайшія составныя части свои, какъ бываетъ въ отдалительныхъ органахъ. Существенное устройство паренхимы составляютъ кровеносные и лимфатические сосуды и нервы, переплетенные либо очень мягкимъ, растяжимымъ, либо очень плотнымъ клѣтчатымъ веществомъ. Таковое устройство и отправлениe мы находимъ только *съ легкото* и отчасти въ *маткѣ*, и потому воспаленія обоихъ сихъ органовъ, на основаніи принятой пами анатомико-физиологической системы въ раздѣленіи сихъ болѣзней, относимъ къ одному отдѣлу.

Воспаление легкихъ.

(*Pneumonitis*).

Syn. Pneumonia, peripneumonia; erysipelas pulmonum, pulmonaria, febris pneumonica.

§ 378.

Легкія, по причинѣ очень иѣжнаго устройства своего, избытка кровеносныхъ сосудовъ, безпрестанного разширения и сжатія при вдыханіи и выдыханіи, превращенія угледворныхъ качествъ втекающей крови въ болѣе флогистическихъ свойства и восприятія съ воздухомъ всѣхъ утонченныхъ разпородныхъ примѣсей къ нему и всѣхъ атмосферическихъ измѣнений, чаще другихъ органовъ тѣла подвергаются воспаленію, которое гораздо рѣже поражаетъ воздухоносные пузырки (*Andral*); но въ большей части случаетъ легочную клѣтчатую плеву, переплетенную сосудами (*Bouillaud*). Воспаленіе сіе, при столь частомъ приключениіи своемъ, естественнымъ образомъ не можетъ имѣть одинакового свойства, которое измѣняется преимущественно потому, происходитъ ли болѣзнь сія отъ идиопатически дѣйствующихъ вредоносныхъ вліяній, или отъ симпатического, припадочнаго либо конституціональнаго страданія, въ коемъ легкія воспринимаютъ участіе. Посему и самая болѣзнь раздѣляется на двѣ главныя формы: на а) простое и б) измѣненное воспаленіе легкихъ.

§ 379.

1.) *Простое воспаление легких* (pneumonitis simplex, vera) имѣеть большею частію острое теченіе, рѣдко протекаетъ медленно подъ видомъ хронического воспаленія.

А.) *Острое воспаление легкихъ* выражается какъ мѣстными, такъ и общими явленіями. Къ первымъ принадлежитъ: а.) *боль въ груди*, почти всегда тупая, давящая, умножающаяся при глубокомъ вдыханіи и кашлѣ и сопряженная съ ощущеніемъ жара и тяготѣнія въ той сторонѣ, где находится воспаленіе; б.) *затруднительное дыханіе*, большею частію стѣсненное, короткое и прерывистое, усиливающееся при лежаніи на сторонѣ, противоположной страждущему мѣсту и сопровождаемое иногда мучительною тоскою, удушеніемъ (essoufflement) и трудностію произносить слова; с.) *кашель*, сперва сухой, а потомъ мокрый, наиболѣе учащенный при совокупномъ пораженіи вѣтвей дыхательного горла, но во всякомъ случаѣ очень мучительный; д.) *харкотина*, въ началѣ не оказывающаяся, но съ дальнѣйшимъ продолженіемъ воспаленія всегда умножающаяся и состоящая изъ пѣнистой, желтоватой или сѣроватой вязкой мокроты, покрытой полосками крови или единообразно смѣшанной съ кровью. Изъ общихъ или сочувственныхъ явленій главнѣйшая суть: а.) *огневичные движения*, развивающіяся всегда въ сильной степени при семъ родѣ воспаленія. Они начинаютъ появляться почти въ одно время съ воспаленіемъ и обнаруживаются обыкновенно болѣе или менѣе сильнымъ оз-

вобомъ, который переходитъ потомъ въ непрерывный жаръ, распространенный по всей поверхности тѣла и соединенныи либо съ сухостію и жесткостію кожи, либо съ легкимъ потѣнiemъ оной и значительнымъ покраснѣнiemъ лица. б.) *Сохувственныя пораженія сосудистой системы* содержатся различно. Жилобіеніе въ первомъ періодѣ болѣзни вообще бываетъ полное, напряженное, частое; въ дальнѣйшемъ же тѣченіи оной, особенно при усиленіи распространеніи воспаленія, оно дѣлается малымъ, сжатымъ и очень ускореннымъ (120 — 140 удар. въ мин.). Впрочемъ въ некоторыхъ случаяхъ жилобіеніе, какъ въ скорости, такъ и силѣ почти не превосходитъ нормальной своей мѣры. Бѣсіе сердца, соответствуетъ обыкновенно жилобіенію. с.) *Со-страданія нервной системы* и мозга выражаются безсонницею, оглушенiemъ, весьма сильною головною болью и бредомъ, оказывающимся почти всегда при очень усилившейся степени болѣзни. д.) *Разстройства пищеварительныхъ отправленій*, бываютъ та-кія же, какъ и при другихъ огневичныхъ воспаленіяхъ и заключаются въ совершающей потерѣ аппетита, въ болѣе или менѣе сильной жаждѣ, въ обложенномъ смуглой нечистотою языкомъ, а иногда въ горечи во рту и давлениіи подъ ложечкою.

§ 380.

В.) *Хроническое воспаленіе (pneumonitis chronicus)* отличается отъ предыдущаго тѣмъ, что оказывается въ гораздо легчайшей степени, продолжается долгое время

(вѣсколько мѣсяцомъ) и распространяется обыкновенно на самую малую обятность легкаго. Оно либо остается послѣ несовершенно разрѣшившагося острого воспаленія, либо развивается первообразно, въ слѣдствіе особеннаго предрасположенія къ тому. Обыкновенныя явленія его суть: сперва слабыя, но постепенно умножающіяся стѣсненія въ груди, кашель и боль, сопровождаемыя легкими огневичными движеніями, умножающимися къ вечеру.

§ 381.

2.) *Измѣненное воспаленіе легкихъ* (*pneumonitis modificata*) есть то, при коемъ находятся еще другіе болѣзненные процессы, не принадлежащиѣ простому воспаленію и болѣе или менѣе измѣняющіе форму его. Сюда относятся:

a.) *Желчное воспаленіе легкихъ* (*pneumonitis s. pleuropneumonitis biliosa*), причиняемое отъ дѣйствія существующихъ въ крови желчныхъ веществъ на паренхимъ легкихъ. Здѣсь, кромѣ явленій, свойственныхъ простому воспаленію легкихъ (§ 579), находится еще желчная горячка, разстройство отправлений печени, признаки многожелчія (част. 1. § 178.) въ первыхъ пустахъ, желтизна всего тѣла, особенная смуглая краснота щекъ, желтоватая, желтозеленоватая, или совершенно желтая харкотина и желтая или очень мутная моча (*urina jumentosa*).

b.) *Антоновоогненное воспаленіе легкихъ* (*pneumonitis gangraenosa*), составляющіе самостоятельную фор-

му, не зависящую отъ исхода, но отъ собственныхъ свойствъ самого воспаленія и имѣеть либо очень быстрое, либо медленное теченіе. Въ первомъ случаѣ силы больнаго тотчасъ упадаютъ, стѣсненіе въ груди бываетъ чрезвычайное, жилобеніе малое и очень частое, кашель съ выхаркиваніемъ разрѣщенной, зеленоватой, весьма зловонной мокроты, которая въ скоромъ времени, отъ недостатка силъ, воспращается и больной умираетъ отъ удушенія. При медленномъ теченіи въ началѣ обнаруживается умѣренное воспаленіе легкихъ; но сопровождающая его огневица скоро воспринимаетъ изнурительный характеръ, къ чему присоединяется упадокъ силъ, тоска, частый кашель съ изверженіемъ зеленоватой или пепельносѣрой мокроты, издающей гангренозный запахъ, либо съ кровохарканіемъ; въ кожѣ примѣчается колющій жаръ, а отъ дыханія глиной, смрадный запахъ.

c.) *Специфическое воспаление легкихъ* (pneumonitis specifica) есть то, которое произраждается отъ специфическихъ вліяній и потому сопряжено всегда съ другими важными страданіями. Сюда относятся воспаленія легкихъ, случающіяся въ заразительныхъ горячкахъ, наипаче въ тифѣ и скарлатинѣ (pneumonitis typhosa) въ разныхъ сыпяхъ (p. exanthematica, variolosa, morbilllosa etc.), въ составоломѣ (arthritica), катаррѣ (p. catarrhalis), ревматизмѣ (p. rheumatica) и проч.

§ 382.

Течение. Острое воспаленіе легкихъ продолжается обыкновенно 7—14 дней, по истеченіи коихъ либо на-

ступаетъ разрѣшеніе переломами, либо дѣлается смертельное окончаніе, либо остаются послѣдственныя страданія отъ болѣзниенныхъ исходовъ. Хроническое воспаленіе проходитъ тихо, медленно, продолжалось не сколько мѣсяцовъ и переходя большою частію въ скрытое нагноеніе. Измѣненіе воспаленіе легкихъ продолжаетъ различно. При желчномъ измѣненіи оно удерживаетъ всегда острую форму; а при атоновоогненному напоитъ смерть или въ не сколько дней, или по прошествіи значительного времени. Въ семь послѣдніемъ случаѣ болѣй весьма скоро изнуруется, представляясь совершенно чахотнымъ, но умираетъ прежде, нежели изнуреніе достигаетъ высшей степени.

§ 383.

Исходы. а.) *Разрѣшеніе* слѣдуетъ часто послѣ предшествовавшаго кровотеченія изъ носу или другихъ мѣстъ; чаще при обнаруживаніи критической, густой, какъ бы въ шарики свернутой харкотини вмѣстѣ съ потомъ и мочею критического свойства. Иногда рѣшаютъ болѣзнь ипоносы, рѣдко опухоли заушныхъ желѣзъ, рожа или сыпи. б.) *Смерть* наступаетъ различно. Въ рѣдкихъ случаяхъ причиняется она отъ одного удушенія; при чѣмъ стѣсненіе груди усиливается до чрезвычайной степени, больной можетъ дышать только въ распрямленномъ положеніи, мучится сильною тоскою и беспокойствомъ. Чаще слѣдуетъ смерть при явленіяхъ слабости, когда больной дѣлается очень изнеможеннымъ, лицо его бы-

ваетъ блѣдное, впалое, кожа холодная, покрытая kleйкимъ потомъ и пр. Наконецъ третьяго рода смертельное окончаніе случается при болѣе или менѣе явственномъ *страданіи мозга*. Больной впадаетъ при семъ въ легкій бредъ и сопливое состояніе, глаза его судорожно искривляются или закрываются, дыханіе затрудняется и жилобеніе, безпрестанно умалляясь, дѣлается наконецъ не примѣтнымъ.

Болѣзненные исходы воспаленія легкихъ суть:

1.) *Нагноеніе*, которое можетъ быть предполагаемо тамъ, где въ обыкновенное критическое время переломы не обнаруживаются и на мѣсто оныхъ, при послабленіи иѣкоторыхъ воспалительныхъ явлений, напичке боли, появляется яркая краснота и жаръ въ щекахъ, либо вздуность и блѣдность лица, частые приступы озноба съ весьма ускореннымъ жилобеніемъ и гноеобразное измѣненіе харкотини. Доброкачественное, необширное нагноеніе переходитъ иногда въ здоровье, при чёмъ гной всасывается и выводится изъ тѣла, вѣроятно чрезъ мочу. Въ иѣкоторыхъ случаяхъ таковое нагноеніе легкаго излѣчивается уже въ 14 дней; а въ другихъ, по прошествіи иѣсколькохъ мѣсяцевъ. Если же нагноеніе въ легкомъ значительное и продолжается долго, то тѣло истощается, обнаруживается огневица съ изнурительными потами и поносами, зависящими отъ изъязвленія въ кишечномъ каналѣ, и болѣзнь съ достовѣрностію не можетъ быть отличена отъ обыкновенной чахотки легкихъ, даже посредствомъ стетоскопа.

Иногда, вмѣсто хорошаго гноя, отдѣляется зловонная сукровичная матерія (*suppuratio exulcerativa*), разрушаю-

щая быстро существо легкаго, отъ чего вскорѣ приключается смерть.

2.) *Серозное выпотыніе* въ паренхимѣ легкаго (oedema pulmonum) есть частѣйшій исходъ воспаленія легкихъ, но произрожденіе его трудно узнается, даже посредствомъ стетоскопа, ибо трескучій шумъ отека весьма подобенъ тому звуку, какой замѣчается и при усиленномъ наполненіи легкаго кровью, тѣмъ болѣе, что оба сіи состоянія часто существуютъ вмѣстѣ.

3.) *Выпотыніе пластической пасоки* въ паренхимѣ легкаго, по видимому, рѣдко случается, и при жизни не можетъ быть отличаемо отъ печенообразнаго измѣненія легкихъ (hepatisatio).

4.) *Отвердѣніе легкаго* (scirrhis pulmonum), которое по исчезаніи воспалительныхъ припадковъ, обнаруживается остающимся часто до глубокой старости сухимъ кашлемъ и умѣренной одышкою. Если къ этому присоединяется новое воспаленіе, то оно переходитъ въ дурное нагноеніе (Berends).

5.) *Антоновъ огонь* или *помертвѣніе* (sphacelus pulmonum), кажется, рѣдко бываетъ слѣдствиемъ прошаго воспаленія, развѣ причиняемаго чрезмѣрнымъ травматическимъ вліяніемъ, но преимущественно слѣдствіемъ измѣненнаго, особенно т. н. антоновоогненнаго воспаленія, въ какомъ случаѣ смерть слѣдуетъ въ скоромъ времени.

§ 384.

Результаты вскрытия умершихъ отъ воспаленія легкихъ. Laennec въ разсужденіи патологико-анатоми-

ческаго измѣненія принимаетъ три степени сего воспаленія. Въ первой степени (*engouement*) легкое бываетъ тяжелѣ и плотнѣ натуральнаго и имѣть красный, или виолетовый цветъ. При сжиманіи его перстами можно чувствовать, что оно плотно и какъ будто палито какою то жидкостю и, хотя издастъ еще хрустѣніе, но оно гораздо слабѣе бываетъ, нежели въ здоровомъ состояніи. На вдаленномъ мѣстѣ остается впечатлѣніе. При разрѣзѣ обнаруживается внутри составъ кровянокрасный, или черноватосиній и напитанный болѣе или менѣе кровянистою, пѣнящеюся и мутною жидкостю, которая обильно вытекаетъ изъ поверхности парѣза. При семъ можно еще хорошо разпознавать кѣтчатое и пѣкоторымъ образомъ поздреватое устройство легкихъ. Во второй степени (*hepatisation*) составъ легкаго не издастъ уже хрустѣнія и достигаетъ тяжести и плотности, подобной печени. Извѣнѣ легкое не представляется столько черноватосинимъ, какъ въ первой степени, а внутри показывается оно красный цветъ съ отливомъ отъ сѣроватовиолетового до синекраснаго. Цвѣты сіи, уподобляющіеся пѣкоторымъ родамъ мрамора или гранита, прерываются воздухоносными пузырками, кровяными сосудами, пятнами, образующимися изъ черпаго легочнаго вещества и тонкими кѣтчатыми стѣнками, кои раздѣляютъ составъ лѣгкаго на различно большія массы или куски. Если измѣненное такимъ образомъ легкое разрѣзывается на несколько кусковъ, то изъ разрѣзныхъ поверхностей почти ничего не вытекаетъ, но при скоблении ложемъ выжимается пѣкоторое количество кровяноводянистой мутной и густой жидкости, въ

которой часто примѣчается также густая темноватая или блѣдоватая и гноеобразная матерія. Держа къ свѣту разрѣзанную поверхность, нельзя замѣтить въ легочномъ существѣ ничего клѣтчатаго, а только явственно зернистую поверхность, или малыя, красныя кругловатыя, нѣсколько сплющенныя зернушки. Въ третьей степени (*infiltratio suppuraſira*) зернистое существо легкаго воспринимаетъ соломенный цвѣтъ; небольшія желтоватыя точки (образующіяся гной) умножаютъ пестрый видъ, да коемъ сіи гноинные точки стекаются болѣе или менѣе, и изъ разрѣзанныхъ поверхностей легкаго вытекаетъ по каплямъ желтая гноина матерія. Существо легкаго бываетъ влажнѣе и мягче, нежели въ печенкообразномъ измѣненіи, зернистый составъ исчезаетъ по мѣрѣ образования гноя и прежде, нежели оно обнаружится въ полной мѣрѣ, легочное существо разрѣшается отъ давленія перста въ мылкія грудочки. Гной проходитъ различныя степени смягченія, пока достигнетъ разжиженія, приближающагося болѣе къ слизи. Если легкое заключаетъ большое количество черной матеріи, что случается не рѣдко у старыхъ людей, то гной и наполняемое имъ легкое воспринимаютъ пепельносѣрый цвѣтъ. Таковыя три степени воспаленія встрѣчаются обыкновенно соединенными между собою различнымъ образомъ.

Нарывъ легкаго (vomica) значительной величины весьма рѣдко рождается отъ воспаленія легкаго. Стѣнки такового нарыва не покрываются особеною перепонкою, какъ полости размягченныхъ бугорковъ; по образуются изъ легочнаго существа наполненнаго гноемъ,

которое, паиняще поближе къ мѣсту нагноенія, находится въ состояніи гнилостнаго смягченія.

Антоновъ огонь, по *Zaenepes*—у, бываетъ неограниченный и ограниченный. Въ первомъ легочной составъ кажется влажнѣе и разрывается легче, нежели въ натуральномъ состояніи, однакожъ удерживаетъ такую же плотность, какъ въ первой степени воспаленія, или въ отекѣ легкаго; цвѣтъ измѣняется отъ грязно-блѣдаго и зеленоватаго до темнозеленаго и почти чернаго, иногда съ примѣсью смуглаго и землянистаго цвѣта. Нѣкоторыя мѣста представляются явственно размагченными и перешедшими въ гнилостное разжиженіе. При разрѣзѣ вытекаетъ мутная, сѣровелеватая сукровища неспоснаго гангренознаго запаха. Измѣненіе это занимаетъ большую часть легкаго и бываетъ неограниченное.

При ограниченномъ антоновомъ огнѣ легкихъ страждащія мѣста находятся въ троекомъ состояніи: а.) въ состояніи только начавшагося потуханія жизненности, или антоновоогненнаго струпа; б.) въ состояніи помертвѣлаго разрѣшенія и с.) въ состояніи опустѣнія.

Антоновоогненные струпы образуютъ массы различной величины, черноватаго цвѣта съ зеленымъ отливомъ и бываютъ гораздо влажнѣе и плотнѣе, нежели составъ легкаго; по виду они сходствуютъ съ обыкновеннымъ струпомъ на кожѣ, но имѣютъ весьма сильный гангренозный запахъ. Окружающая ихъ часть легкаго находится въ первой, или во второй степени воспаленія. Когда струпъ таковой смягчается и превращается въ вѣкоторый родъ гнилаго, сѣровелеватаго, иногда кро-

вянистаго и весьма зловоннаго тѣста, то это предста-
вляетъ *помертвѣлое разрѣшеніе* (*colliquatio sphacellosa*). Если означеннаго матерія испражняется, то остает-
ся настоящая извѣсная пустота (пустыніе.) Стѣнки по-
лости сей покрываются сѣроватою, или грязножелтою
непрозрачною перепонкою, которая отдѣляеть мутный
гной таковаго же цвѣта, или чорную сукровицу.

§ 385.

Распознаваніе воспаленія легкихъ можетъ быть со-
вершенно вѣрно, если примѣчаются всѣ вышеозначенные
(§ 581.) признаки, какъ то: боль, кашель, стѣсненіе
груди, вязкая, единообразно окрашенная краснымъ цвѣ-
томъ харкотина и пр. Иногда однакожъ означаенныхъ
припадковъ небываетъ, особенно боли; харкотина имѣть
только въ извѣстномъ періодѣ болѣзни упомянутое ха-
рактерическое свойство, которое она воспринимаетъ так-
же въ другихъ болѣзняхъ, особенно въ кровохарканіи.
Слѣдственno, для достовѣрного распознаванія сей болѣз-
ни, лучше прибѣгать къ тѣмъ признакамъ, кои сообщаетъ
намъ *слушаніе* (*auscultatio*) и *удареніе* (*percussio*).
При первомъ изслѣдованіи мы замѣчаемъ всегда въ вос-
паленіи легкаго трескучее хрюпаніе въ груди (*râle crepi-
tant*; *rhonchus crepitans*), которое составляетъ очень
постоянныи и вѣрныи признакъ. Посредствомъ опаго
открывается часто воспаленіе легкихъ въ трудныхъ го-
рачкахъ и другихъ болѣзняхъ, въ коихъ необнару-
живается боли, стѣсненія въ груди, кашля или харко-

тины, Сверхъ того чрезъ употреблениe стетоскопа въ этомъ случаѣ, показывающаго явственно звуки, замѣчаемые при таковомъ страданіи, можно въ точности определить мѣстопребываніе и степень воспаленія, — что при лѣченіи составляетъ большую важность, напаче при употребленіи мѣстныхъ средствъ. Конечно, окрашенная краснымъ цветомъ харкотина есть столь же вѣрный и, можетъ быть, вѣрѣйшій признакъ, нежели трескучее хрюканіе, но за то онъ не столько постояненъ.

Самые труднѣйшіе случаи для распознаванія болѣзни суть: 1.) тѣ, въ коихъ, при недостаткѣ прочихъ признаковъ, трескучее хрюканіе бываетъ неявственное, что въ особенности случается при существующемъ вмѣстѣ сильномъ скрипѣніи слизи, и 2.) тѣ, въ коихъ можно сомнѣваться, происходитъ ли трескучее хрюканіе отъ преполненія кровью (engouement), или отъ отека легкихъ. Впрочемъ таковые случаи рѣдки, да и самыи образъ произхожденія болѣзни, равно какъ и прочие признаки могутъ всегда достаточно решить сомнѣніе. Если имѣется подозрѣніе на отекъ легкаго, и при этомъ, кроме трескучаго хрюканія, оказывается означеннаго характеристическая харкотина, то можно съ достовѣрностю заключать о воспаленіи легкаго, хотя бы въ тоже время въ одной части его находился и отекъ. Воспаленіе грудной плевы, равно какъ и вѣтвей дыхательнаго горла, могутъ быть съ достовѣрностю отличаемы отъ воспаленія легкихъ чрезъ отсутствіе при опыхъ трескучаго хрюканія. При образовавшемся нагноеніи въ легкомъ стетоскопъ показываетъ грудной говоръ (pectoriloquie) и сильное трескотаніе съ надуваніемъ, которое явственно

произходитъ какъ бы изъ полости. Тоже почти замѣчается и въ антоповомъ огнѣ. Если опустѣліе легочнаго существа, произшедшее отъ антоповоогненнаго разрушенія, открывается къ грудной плевѣ, то появляются признаки воздухоскопленія груднаго (pneumothorax) съ изливаніемъ жидкости; если же опустѣніе таковое открывается въ тоже время въ вѣтви дыхательного горла, то слышенъ металлическій звукъ, или втореніе горшечнаго звона. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ при вслушиваніи непримѣчается и обыкновеннаго шума отъ дыханія, можно предполагать отвердѣніе или печенкообразное измѣненіе. Въ семъ случаѣ удареніе въ грудь производить совершило глухой отголосокъ, какъ бы при удареніи въ ляшку: *tanquam percussi femoris.*

§ 386.

Причины. Особенное расположение къ воспаленію легкаго замѣчается у такихъ особъ, которыя имѣли уже одинъ или иѣсколько разъ эту болѣзнь. Сангвинико-эретическое сложеніе наиболѣе располагаетъ къ тому, но разность возраста и пола, по видимому, едвали имѣть особенное вліяніе.

Случайные причины суть наипаче: сильная напряженія дыхательныхъ органовъ, механическія вліянія, дѣйствующія на грудь, продолжительный сухой холдъ, а еще болѣе быстрая смыкаемость температуры или простуда при разгоряченномъ и потѣющемся тѣлѣ; излишество въ употребленіи спиртныхъ напитковъ, сильные движения тѣла, особенно натужная бѣганія

противъ восточнаго и съвернаго вѣтровъ; прекращеніе кровотечепій, отдѣлений или накожныхъ сыпей, также горячки, преимущественно воспалительного свойства.

Хроническое воспаленіе легкаго произраждается отъ долговременнаго продолженія вредныхъ вліяній на легкое напр. отъ вдыханія раздражающей пыли или острыхъ паровъ, непримѣтно дѣйствующихъ на тѣло и пр. Оно остается также послѣ несовершенно-излѣченаго острого воспаленія и присоединяется часто къ чахоткѣ легкихъ.

Измѣненное воспаленіе приключается либо отъ существованія въ крови постороннихъ веществъ, дѣйствующихъ на паренхимъ легкаго напр. желчи, разныхъ заразъ и остротъ, либо отъ сочувственныхъ и антагонистическихъ вліяній, либо отъ особенныхъ эпидемическихъ и конституціональныхъ состояній.

§ 387.

Предсказаниe опредѣляется а) по періоду болѣзни: воспаленіе легкихъ въ первой степени, т. е. при одномъ завалѣ ихъ жидкую кровью, вообще не очень опасно, по гораздо труднѣе во второмъ періодѣ или при печеккообразномъ измѣненіи легкаго; а въ третьемъ, т. е. при гнойномъ просасываніи, большею частію бываетъ смертельно; б) по большему или меньшему распространѣнію воспаленія, узнаваемому посредствомъ стетоскопа и с) по общему здоровью больнаго. Вообще, если онъ очень ослабленъ или старъ, если воспаленіе сопровождается очень сильною, напаче злокачественною горячкою, если оно сопряжено съ другими

важными страданіями, или зависитъ отъ оныхъ, то предстоитъ большая опасность. Чѣмъ болѣе ускорено и затруднено дыханіе, чѣмъ чаще и мучительнѣе кашель, чѣмъ явственнѣе признаки печенообразнаго измѣненія легкихъ или нагноенія, тѣмъ хуже.—Гнойная, смуглая, сѣрая или черноватая харкотипа предвещаетъ дурной исходъ; а зловонная, лурногнойная или совершенно приставленная съ хранищимъ, очень тоскливымъ дыханіемъ, съ охлажденіемъ конечностей, также очень слабымъ, неправильнымъ, перемежающимся жилобіемъ показываетъ скорое наступленіе смерти.

§ 388.

Лѣченіе. а.) По причинамъ [показаніямъ] надлежитъ устраниять, сколько можно скорѣе, всякое вліяніе, подавшее поводъ къ воспаленію, если оно продолжаетъ еще дѣйствовать. Химическія вредности всякаго рода должны быть тотчасъ удалены; воспященныя кровотечения требуютъ замѣнныхъ кровоиспрѣженій, а переносы отводящихъ и противураздраждающихъ средствъ. Сверхъ сего нужно отклонять всѣ вліянія, могущія усиливать и распространять воспаленіе к. т. всѣ душевныя и тѣлесныя раздраженія, въ особенности дѣйствующія на самыя легкія. Большой долженъ тщательно избѣгать всего горячительнаго, всякой слишкомъ питательной пищи, всякаго движенія и раздраженія, возбуждающаго кашель и всякаго ненужнаго разговора; содержаться въ умѣренно теплой комнатѣ, въ чистомъ воздухѣ и наход-

диться въ постѣли съ возвышенною головою и грудью, подъ легкимъ покрываломъ.

§ 389.

b.) *По существеннымъ показаніямъ.* Такъ какъ легкия способствуютъ кровотворенію и въ нормальномъ состояніи заключаютъ въ себѣ гораздо болѣе крови, нежели прочіе органы, то при воспаленіи ихъ, гдѣ жидкость сія всегда играетъ важную роль, кровоисправненія должны быть обильны. Количество ихъ опредѣляется здѣсь а.) *по обширности воспаленія*, что вѣрно всего узнается посредствомъ точнаго изслѣдованія стетоскопомъ; б.) *по периоду воспаленія*, кото-раго однакожъ нельзя опредѣлить столь вѣрно по продолженію болѣзни, какъ по тѣмъ признакамъ, кои показываетъ стетоскопъ (§ 381). Если воспаленіе находится еще въ той степени, при которой поражаемая воспалительнымъ процессомъ кровь бываетъ еще жидкая (*engouement*), следствіенно въ воспаленныхъ частяхъ слышелъ еще трескучій или хрустящій звукъ, то кровопусканія должны быть обильны и часто повторяемы, ибо здѣсь сильнымъ испражненіемъ кровеносныхъ сосудовъ можно надѣяться вскорѣ разрѣшить воспаленіе. Когда же болѣзнь перейдетъ во вторую степень или въ печенкообразное измѣненіе легкихъ, при коемъ не только не ощущается трескучаго звука, но даже въ пѣкоторыхъ частяхъ легкаго не бываетъ и обыкновеннаго шума отъ дыханія, то хотя и можно пускать кровь, ибо и въ семъ случаѣ можетъ быть еще произведено разрѣшеніе воспаленія.

пія, однакожъ это происходитъ уже гораздо медленнѣе и требуетъ дѣлайшаго времени, а потому сильныя кровопусканія здѣсь бесполезны и могутъ повредить ослабленіемъ силъ. Въ третьей степени, при существующихъ признакахъ гнойнаго просасыванія, рѣдко пускается кровь. Здѣсь кровопусканіе должно быть предпринимаемо съ осторожностю, тѣмъ болѣе, что оно не въ состояніи ограничить образованія гноя, да и силы больнаго, изнуренные долговременнымъ продолженіемъ болѣзни, не переносятъ вообще кровоиспражненій, наипаче обильныхъ.

с.) По общему состоянію больнаго, съ особенностями по состоянію силъ его и свойству горла.

Если силы находятся уже въ большомъ упадкѣ, то выгоднѣе дѣлать повторительныя небольшія кровопусканія, нежели разомъ испражнять очень много крови; впрочемъ, такъ какъ часто одни только сильныя накопленія крови въ легкихъ бываютъ причиной воспященія отправленія ихъ и угнетенія общей жизнедѣятельности, то не рѣдко обильное кровопусканіе служитъ къ возстановленію силъ. Здѣсь дѣйствія самаго испражненія крови могутъ рѣшить пользу и количество онаго. Если жилобіе во время кровопусканія не упадаетъ, но даже возвышается и больной чувствуетъ себя болѣе облегченнымъ, нежели ослабленнымъ, то можно выпускать значительное количество крови. Напротивъ того, если жилобіе дѣлается меньше, а больной слабѣе, то кровопусканіе надлежитъ тотчасъ прекращать. Такимъ образомъ дѣйствіе первого кровопусканія можетъ рѣшать пользу и потребность предпріятія втораго и третьаго.

Когда съ воспаленіемъ легкихъ сопряжена воспалитель-

ная горячка, то можно болѣе испражнить крови. Воспалительную плеву (*crusta inflammatoria*), появляющуюся на крови, не всегда должно почитать показаніемъ къ обильному кровоисправлению, ибо она можетъ образовываться иногда въ третьемъ періодѣ и даже при другомъ состояніи, отличномъ отъ воспаленія. Когда воспаленіе легкаго оказывается въ слѣдствіе первой или гнилой горячки, то кровь должна быть сколько возможно щадима. У крѣпкихъ субъектовъ, въ первомъ періодѣ воспаленія и при большой обширности онаго, кровопусканіе должно быть обильное (12—14 унцій и болѣе), повторяемое, смотря по обстоятельствамъ, въ теченіи несколькиихъ сутокъ два, три раза и болѣе. У дѣтей припускается на груди отъ 4—5—10 пьявокъ, смотря по возрасту и обширности воспаленія; впрочемъ кажется и у нихъ можно дѣлать общее кровопусканіе, особенно при угрожающей опасности. У взрослыхъ пьявки или кровососныя банки назначаются только тогда, когда сила воспаленія уменьшена уже и оно ограничивается небольшимъ мѣстомъ, или когда силы больного не позволяютъ скораго отвлеченія крови. Противопоказаній къ кровопусканію въ семъ воспаленіи почти нѣть. Часто при значительной степени слабости, во время мѣсячнаго очищенія, въ дѣтскомъ и старческомъ возрастѣ *кровь испражняется* съ ощущительной пользою.

Кромѣ кровопусканій, по древнему способу, употребляются здѣсь: селитра (N. 61. 62.), винный камень (N. 11. 14.), сѣриокислый соли (N. 20.), прохладительные напитки N. 19.), въ особенности уксусомѣдъ, рекомендованный еще *Гиппократомъ* и дѣлаются большому смягчающія (N. 57.) либо прохладжающія изъ

среднихъ солей промывательныя. Въ недавнее время прославленъ рвотный камень въ большомъ пріемѣ (N. 104.). По *Laeppes*—у соль сія доставляетъ помощь даже и въ то время, когда существуетъ гнойное просасываніе. Онъ, сдѣлавши одинъ разъ кровопусканіе въ 8 или 12 унцій, даетъ его до одного грана въ двухъ съ половиною унцахъ настоя померанцовыхъ цвѣтовъ съ половиною унца алтейнаго сиропа и повторяетъ таковой пріемъ чрезъ два часа, пока болѣй пріиметъ два пріема; послѣ чего прекращается пріемъ лѣкарства на 7 или 8 часовъ. Въ трудныхъ случаяхъ средство сіе дается непрерывно всякие два часа, пока припадки облегчатся. Иногда всѣкій пріемъ рвотнаго камня усиливается однимъ, двумя и болѣе гранами его. Большая часть больныхъ имѣютъ два или три раза рвоту и пять или шесть испражненій низа, но потомъ въ слѣдующіе дни испражненія таковыя прекращаются. Если однажды они продолжаются и на второй день, или когда въ первый день рвотное очень трудно переносится, то *Laeppes* къ шести пріемамъ рвотнаго камня, которые должно принять въ 24 часа, прибавляетъ одинъ или два унца опіатнаго сиропа (*syrupus Diacodii*). Способъ сей въ самыхъ трудныхъ случаяхъ гораздо дѣйствительнѣе, нежели обыкновенное лѣченіе воспаленія легкихъ.

Прибавленіе опія къ рвотному камню, при правильномъ показаніи, заслуживаетъ также всякое одобрение. Средство сіе дѣйствуетъ благотворно не только потому, что ограничиваетъ частые поносы, но и потому, что умѣряетъ раздраженіе въ легкихъ. Впрочемъ опій доставляетъ пользу въ воспаленіи легкаго только въ сое-

дипенії съ рвотнымъ камнемъ, а самъ по себѣ оль можетъ быть вреденъ. Если существуетъ значительная степень слабости, то продолжительное употребление рвотного камня неприлично. У дѣтей онъ доставляетъ также пользу въ сей болѣзни, подобно какъ и въ крупѣ; во вообще, предписывая его въ большихъ пріемахъ, надобно чаще посѣщать больныхъ для вищшаго осѣдомленія въ дѣйствіи и приличнаго измѣненія въ употреблениі.

Рекомендуемая здѣсь многими врачами услажненная хлористая ртуть не столь дѣйствительна, какъ рвотный камень. Она дается въ слабительныхъ пріемахъ по два грана чрезъ два часа и дѣйствуетъ безъ сомненія антагонистическимъ образомъ, подобно рвотному камню, чрезъ возбужденіе отдѣленія въ кишечномъ каналѣ и цечени. Нѣкоторую пользу доставляютъ также средства, дѣйствующія на притупленіе возвышенной раздражительности и чувствительности. Сюда принадлежатъ: слизистые вещества (N. 72), масляные микстуры (N. 55.), грудные лизуанцы (*linctus*); втиранія жирныхъ масъ и болеутолительныхъ мазей (N. 49.), влажныя теплныя припарки на груди изъ льняной муки съ отваромъ болиголова, белены и пр. (N. 48.). Белена (N. 1.), лактукарій (N. 5.), кодеинъ (N. 2.) и синеродистая кислота (N. 56.) предписываются внутрь преимущественно въ то время, когда въ легкомъ оказывается высшая степень чувствительности съ сильнымъ кашлемъ или чрезмѣрною болью.

Когда наступаютъ признаки появленія переломовъ, то должно способствовать испаренію кожи и отдѣленію

слизи въ легкихъ уксусокислымъ амміакомъ (N. 108.), пашатыремъ (N. 110.114.), златоцвѣтною сюрмою (N. 121.), обильнымъ теплымъ питьемъ настоемъ алтайныхъ корней съ солодковымъ корнемъ (N. 120.), либо набора травъ для грудного чая (*species ad infusum pectorale*) и пр.

Если при воспаленіи легкихъ силы находятся въ большомъ упадкѣ, какъ случается напримѣръ при большомъ потрясениі первовъ въ первої горячкѣ, то часто потребны бываютъ тѣ средства, кои употребляются противъ страдательнаго преизнанленія легкихъ кровью (см. 1. ч. стр. 28.)

§ 390.

с.) *По припадочнымъ показаніямъ.* Изъ припадковъ, сопровождающихъ воспаленіе легкихъ, наиболѣе заслуживають вниманія сильный кашель и продолжительная безсонница. Впрочемъ они умѣряются вышеупомянутыми, притупляющими чувствительность средствами, преимущественно осторожнымъ употребленіемъ лактукарія и другихъ наркотическихъ не возбуждающихъ лѣкарствъ (N. 1—5).

§ 391.

При хроническомъ воспаленіи легкихъ должно изслѣдовать причины его и удалить, если онѣ продолжаютъ еще дѣйствовать, въ особенности обращать вниманіе на худосочія, напр. золотуху. Впрочемъ и здѣсь также употребляется антифлогистический аппаратъ, въ умѣренной только степени, к. т. повторительная ис-

большія кровопусканія, пъявки, отведенія на кожу, разводящіе напитки съ прибавленіемъ нѣсколько селитры и виннаго камня (N. 18.19.), успокаивающія лѣкарства (N. 2.5.), слизистыя вещества (N. 72), сыворотки, средства, содержащія синеродистую кислоту (N. 35.), пастой изперстянки и белены (N. 1. 6.), равно какъ и лѣкарства, дѣйствующія на лимфатическую систему, к. т. сюрмляныя, ртутныя и проч. (N. 26.).

Въ желчномъ воспаленіи, хотя и показуются кровоиспражненія, но они не должны быть столь обильны, какъ въ простомъ воспаленіи. Главное вниманіе заслуживаетъ здѣсь состояніе печени, напаче если желчное воспаленіе легкихъ встрѣчается вмѣстѣ съ воспаленіемъ печени. Буде вѣть ни какого препятствія, то употребляются средства, испражняющія желчь, напаче рвотный камень въ большихъ пріемахъ (N. 104), или усаженная хлористая ртуть и пр.

При антоновоогненному воспаленіи легкихъ предписываются противугнилостные средства: aqua Rabellii (N. 16), aqua oxymuriatica (N. 64), mixtura sulphurico-acida (N. 57), а для спомоществованія отдѣленію антоновоогненныхъ частей баранка (N. 21. 29), сенега (N. 27.), камфора (N. 28.), цвѣты роснаго ладана (N. 50.) и проч.

Воспаление матки.

(*Metritis*).

Syn. Inflammatio uteri, hysteritis, inflam. s. febris uterina.

§ 392.

Явленія. Въ острой форме, имѣющей мѣстопрѣбываніе въ паренхимѣ матки, болѣнь начинается обыкновенно припадками сильной горячки к. т. ознобомъ и жаромъ, довольно жгучимъ, занимающимъ наиболѣе брюхо и поясницу, между тѣмъ какъ конечности ощущаются иногда холодными. Къ сему присоединяются: большая усталость, неудобство въ движеніи нижнихъ конечностей, напряженіе брюха, патужное понужденіе къ испражненію низа и трудное мочеиспускание. Жиlobіеніе бываетъ напряженное и скорое, рѣдко полное, большею частію малое; жажда очень сильная, языкъ сухой и красный. Гораздо явственнѣе однакожъ выражается страданіе сіе болью, которая бываетъ давящая, сверлящая, бьющая, раздирающая, колюща или грызуща и простирается отъ лобковой стороны къ крестцу, въ одну или въ обѣ стороны, распространяясь иногда на чресла и колѣна и сопровождалась обыкновенно непріятнымъ ощущеніемъ тяжести въ болѣномъ органѣ. Раздутое, напряженное брюхо не переноситъ ни малѣйшаго прикосновенія, часто даже не терпитъ давленія покрывала. При внутреннемъ изслѣдовании влагалищ-

ная часть матки оказывается твердою, растяженою, очень болящею, а маточный рукавъ сухий и жаркимъ. Испражненія кала и мочи воспащаются или совершаются съ трудомъ и болью, движеша тѣла также трудны, а иногда, по причинѣ жестокихъ болей и совершенно невозможны. Кромѣ сего здѣсь всегда оказываются общія или сочувственныя пораженія, къ коимъ относится явственное измѣненіе лица, представляющаго блѣднымъ, обезображеніемъ; холодъ въ конечностяхъ; первое и большею частію малое жилобіеніе при явственномъ біеніи въ животѣ; тошнота и наклонность къ рвотѣ, даже дѣйствительная рвота; въ некоторыхъ случаяхъ также икота; большое беспокойство и тоска, короткое, тоскливо дыханіе; большая, мгновенно наступающая слабость; сильная головная боль и бредъ, особенно къ вечеру, когда и всѣ означенныя припадки ожесточаются.

§ 393.

Рѣдко впрочемъ матка поражается воспаленіемъ во всей своей объятности, въ какомъ случаѣ всѣ припадки достигаютъ высочайшей степени жестокости. Чаще страждеть при семъ какая либо сторона оной, и чрезъ это болѣзненныя явленія измѣняются слѣдующимъ образомъ.
1.) Когда воспалается дно матки, то можно иногда выше лобковыхъ костей ощущать твердую шарообразную, очень болящую опухоль, при чѣмъ обнаруживается также наклонность къ рвотѣ, дѣйствительная рвота, а часто и самая икота. 2.) При воспаленіи маточной шейки и рильца влагалищная часть матки ощущается

твърдою, напряженою, сухою, жаркою, при дотрогиваніи очень чувствительною и опавшею гораздо ниже въ полость таза; при чмъ самыи рукавъ матки дѣлается столь жаркимъ, распухшимъ и чувствительнымъ, что невозможно его изслѣдоватъ въ точности перстомъ; не рѣдко поражаются даже воспаленіемъ клиторъ и устье мочеиспускательного канала, въ слѣдствіе чего родовальное побужденіе усиливается, рождается сильное жженіе при мочеиспусканіи и движениіи ляшекъ, равно какъ и хожденіе совершаются съ большою болью. 3.) Если поражается воспаленіемъ передняя поверхность матки, то больная жалуется на боль тотчасъ позади лобковыхъ костей, сопровождающую обыкновенно страданіемъ мочеваго пузыря, труднымъ мочеиспусканіемъ или совершеннымъ задержаніемъ мочи, а въ послѣдствіи неизвѣтными теченіемъ оной. 4.) Если же воспалется задняя поверхность матки, то боли обрѣтаются преимущественно въ крестцѣ и пояснице и отправленія прямой кишкѣ разстроиваются, въ слѣдствіе чего рождается запоръ на низъ съ мучительными натугами при испражненіи, геморроидальные припадки, кровянистый либо гноеобразный поносъ и проч.

§ 394.

Въ хронической формѣ воспаленіе сіе обнаруживается неявственною, большею частію давящую болью въ нижней сторонѣ брюха, распространяющеюся на чресла, ляшки, полосицу, а иногда и на груди и умножаю-

пдеюся обыкновенно при сонитіи, хождевіи и долговременному стояніи. Въ некоторыхъ случаяхъ появляются болѣе или менѣе обильныя кровоизрѣженія изъ дѣтродныхъ частей и мѣсячное очищеніе большею частію не прекращается. Жилобіеніе бываетъ обыкновенно скорое, напряженное, а иногда оказываются и огневичные движения. При наружномъ изслѣдованіи примѣчается падь лобковыми костями кругловатая опухоль, причиняющая, при сильномъ впечатлѣніи руки, парочитую боль. Внутреннее изслѣдованіе также мучительно и ожесточаетъ боль. Маточное рыльцо ощущается при семъ распухшимъ, длиннымъ, закрытымъ либо полуоткрытымъ.

§ 395.

Течение сей болѣзни неодинаково. Острое воспаленіе, обнаруживающееся означенными припадками, возрастає всегда скоро до известной степени. Припадки его умножаются въ силѣ и распространяются часто до седьмого или девятаго дня, въ какое время наступаетъ обыкновенно хорошій или дурной исходъ. Прохожденіе хронического воспаленія длится не рѣдко очень долгое время, распространяясь не только на мѣсяцы, но даже на годы. Очень часто припадки его умаляются не вдругъ, но постепенно, оставляя по себѣ болѣе или менѣе значительное умноженіе матки въ величинѣ съ ощущеніемъ тяжести въ пояснице.

§ 396.

Что касается до исхода, то разрѣшеніе есть самое благопріятѣйшее окончаніе болѣзни. Оно слѣдуетъ

рѣдко прежде седьмаго и послѣ четырнадцатаго днія, обыкновенно при обильныхъ испражненіяхъ пота и мочи, также слизистой, гноеобразной, или кровянистой зловонной жидкости изъ маточного рукава, при наступлении мѣсячнаго очищенія и другихъ кровотечей.

Переходъ въ *нагноеніе* рѣдко случается. О произрѣженіи его можно заключать, если въ какомъ либо очень болящемъ мѣстѣ оказывается чувство дерганія и биенія, появляется снова ознобъ, смѣняющійся къ вечеру сухимъ, жгучимъ жаромъ, жилобіеніе дѣлается мягче и равномѣрнѣе, напряженіе брюха уменьшается, испражненія происходятъ не съ такимъ мученіемъ, моча вытекаетъ обильная, мутная, съ слизистымъ клошковатымъ осадкомъ. Иногда матка въ большей части разстроивается нагноеніемъ при всѣхъ знакахъ гектического изпуренія (*phthisis uterina*); когда же только не значительное мѣсто переходитъ въ нагноеніе, особенно если это случается на внутренней поверхности матки, то гной испражняется чрезъ рукавъ безъ дальнѣйшихъ разстройствъ. Въ другихъ случаяхъ онъ проникаетъ въ полость брюха или таза и производить важныя, часто смертію оканчивающіяся разстройства.

Антоновъ огонь рождается только при чрезмѣрно сильномъ воспаленіи, и появление его можно предполагать, если жестокія боли разомъ прекращаются, брюхо опадаетъ, лицо разительно измѣняется, наступаетъ ощущеніе чрезвычайной слабости, жилобіеніе дѣлается очень скорымъ, малымъ и даже перемежающимся, обнаруживаются холодные поты, непроизвольные испражненія низа, холодъ въ копечностяхъ и т. д.

Къ прочимъ, несоль важнымъ исходамъ припадлежать: *отвердѣніе*, случающееся напаче при хроническомъ воспаленіи; *сращеніе* матки съ окололежащими частями; *затвердѣніе маточной шейки и маточныхъ трубъ*, также водянистаго скопленія въ полости матки.

§ 397.

Причины. Расположеніе къ острой формѣ сего воспаленія имѣютъ преимущественно женщины полносочинаго, тѣлеснаго сложенія, а къ хронической чрезмѣрно раздражительного, но слабаго сложенія. Сверхъ сего, на эти казываются вліяніе общія эпидемическія состоянія, времена года и періоды менструального очищенія. Тѣ же женщины, у коихъ менструальное очищеніе неправильно, или прекращено, наиболѣе расположены къ воспаленію матки.

Къ случайнымъ причинаамъ относятся весьма многое вліянія, действующія физически, или психически возбуждающимъ образомъ на дѣтородныя части, либо раздражающія механически матку. Таковыми считаются чрезмѣрные душевные движения, особенно во время менструального очищенія, сильная неудовлетворенная любовь у весьма чувствительныхъ живыхъ особъ, возвышенное плотское побужденіе, слишкомъ частое и съ наглостью производимое совокупленіе, опапія, горячительная пища, напитки и лѣкарства, действующія специфически на раздраженіе матки (*menagoga, abortiva*), драстическая слабительная, разгоряченіе и простуда, напаче во врем-

мя мѣсячнаго очищенія (холодныя обмыванія, ванны); воспаленіе нормальныхъ или болѣзненныхъ отдѣленій напр. мѣсячнаго очищевія, бѣлей, геморроидальнаго течея і проч. переносы болѣзнетворныхъ матерій и сыпей; иногда гастрическая раздражепія, ревматизмъ и венерическая болѣзнь. Въ механическомъ отношеніи могутъ быть причинами раненія матки, давленіе оной при неправильномъ положеніи, выпаденіи, выворотѣ и грубомъ пользованіи таковыхъ пороковъ дурными маточными кольцами, неумѣстное лѣченіе полиповъ, раздраженіе матки острыми впрыскиваниями, частое, грубо изслѣдованіе матки, удары и паденія на брюхо, грязенія и чрезмѣрный сжатія онаго слишкомъ тѣсныя латыни, особенно въ беременномъ состояніи, оченьильная и продолжительная натуги при родахъ, ущемленіе дѣтской головки или другихъ частей при выхожденіи изъ таза, насильственное разширеніе маточнаго отверстія, неосторожныя, очень часто и бѣль падобности повторяемыя подаванія помощи при родахъ, особенно инструментами, вложеніе руки въ полость матки, цесарское сѣченіе, разрывы, и пр.

§ 398.

Предсказаніе опредѣляется: а.) по продолженію болѣзни. Острое воспаленіе гораздо опаснѣе, нежели хроническое, потому что первое, переходя въ антоновъ огонь, можетъ наносить смерть, а послѣднее восприимчастъ неблагопріятный исходъ только отъ послѣдстви-

ныхъ страданій. b.) *По припадкамъ.* Наступающая въ самомъ началѣ крайняя слабость и скорый упадокъ силъ предвѣщаютъ близкую смерть, особенно если они оказываются послѣ мгновеннаго прекращенія болей. c.) *По исходамъ.* Самое неблагопріатное предсказаніе обѣщаетъ переходъ въ антоновъ огонь; нагноеніе сумнительное, а отвердѣніе, сращеніе и перерожденіе угрожаютъ только будущими страданіями. d.) *По мъстопребываанію и распространенію болезни на смежныя час-ти.* Поверхностное воспаленіе нестоль опасно, какъ поражающее самый паренхимъ матки, а обрѣтающееся въ венахъ маточныхъ (*phlebitis uterina*) большою частію бываетъ смертельно. То воспаленіе, которое занимаетъ дно матки гораздо опаснѣе, нежели то, которое поражаетъ шейку и влагалищную часть ея; распространеніе его на брюшину очень неблагопріятно; а на мочевой пузырь и прямую кишку болѣе мучительно, нежели опасно. e.) *По пригинамъ.* Наибольшою опасностію угрожаетъ то воспаленіе матки, которое рождается отъ переносовъ и прекращенныхъ отдѣленій въ оной, также отъ динамическихъ вліяній, дѣйствующихъ на весь составъ матки. f.) *По времени отправленій маточныхъ.* Случающееся у дѣвицъ при первомъ наступлении менструа очищенія и въ слѣдствіе прекращенія онаго, гораздо опаснѣе, нежели въ то время, когда отправленія матки прекращаются, или необнаруживаются. Воспаленіе матки въ беременности опасно, во время родовъ еще опаснѣе, а во время послѣродового очищенія не рѣдко вдругъ оканчивается смертію, особенно если распространяется на брюшину и другіе органы.

§ 399.

Лъченіе. а.) *По пригіннимъ показаніямъ* должно обратить вниманіе на случайныя причины и уклонять вліяніе ихъ въ возможной скорости. Если болѣзнь произошла отъ прекращенія мѣсячнаго очищенія въ слѣдствіе простуды, то надлежитъ предписывать заблаговременно теплое содержаніе, ванны и потогонительныя лѣкарства к. т. уксусокислый амміакъ съ рвотнымъ камнемъ (N. 108.) и проч. до востановленія усиленной испарини. Въ другихъ случаяхъ пріостановленія означеннаго очищенія назначается покойное положеніе, строгая діета, теплые припарки къ дѣтороднымъ частямъ, полу-ванны и ножныя ванны, либо припущеніе паровъ, мѣстныя кровоотвлеченія и средства, умѣряющія возвышенную дѣятельность сосудовъ (N. 18.62.), но отнюдь не горячительныя (pellentia). При гастрическихъ раздраженіяхъ рвотное можетъ оказывать пользу только въ то время, когда воспаленіе угрожаетъ еще своимъ наступлениемъ, послѣ же оно вредно; а гораздо вѣрѣше дѣствуетъ прохладжающее слабительное (N. 13.14.15.). Сверхъ сего должно избѣгать всякаго раздраженія матки, особенно соитія, а накопленія твердаго кала въ кишкахъ удалать пѣжными масляными промывательными.

б.) *По существеннымъ показаніямъ* нужно противодѣйствовать воспалительному процессу. Въ остромъ воспаленіи матки, у молодыхъ, полносочныхъ особъ, при жестокихъ боляхъ необходимы общія кровопусканія, назначаемыя въ числѣ и количествѣ, сооб-

разномъ степени болѣзни и состоянію больныхъ, но не слабости, которая въ семъ случаѣ всегда бываетъ ложная. Послѣ общихъ весьма приличны мѣстныя кровоотвleченія, дѣлаемыя на томъ мѣстѣ, гдѣ въ сильвѣйшей степени ощущаются боли и повторяемыя при всякомъ ожесточеніи болѣй. Въ пѣкоторыхъ случаяхъ они могутъ быть предпринимаемы также для отведенія крови чрезъ припущеніе пѣваковъ къ проходу, или къ вѣнѣніи дѣтороднымъ частямъ, чрезъ приложеніе кровососныхъ банокъ за ляшкахъ и чрезъ кровопусканіе на ногѣ. Противувоспалительныя лѣкарства к. т. селитра и другія среднія соли должны быть даваемы въ эмульсіяхъ (N. 62.) либо въ слизистыхъ отварахъ и при томъ въ небольшомъ количествѣ. Для слабительнаго лучше всего можетъ служить клещевинное масло, манна, тамаринды (N. 12.13.), коихъ дѣйствіе поддерживается промывательными (N. 37.). По уменьшѣніи силы воспаленія, для споспѣществованія скорѣйшему разрѣшенію, можно предписывать съ большою пользою услащенную хлористую ртуть вмѣстѣ съ втираніемъ сѣрої ртутной мази на брюхѣ и прикладывать нарывной пластырь на внутренней сторонѣ ляшекъ. Сверхъ сего при большой чувствительности и судорожныхъ припадкахъ употребляются внутрь наркотическія перадражающія средства (N. 1—5), а снаружи болеутолительныя примочки и мази (N. 49.), припущеніе смягчающихъ паровъ, полувианны и общія ванны, осторожныя впрыскиванія нѣжныхъ смягчающихъ средствъ въ маточный рукавъ и пр. Если разрѣшеніе вполнѣ неоказывается и огневичное раздраженіе вмѣстѣ съ болями, хотя и уменьшенными,

продолжается, то успешное излечение производятъ и погада наружное и внутреннее употребление ртути, лавровишиевая вода (N. 5.), вытяжка болиголова (N. 134), отводящія средства на икрахъ и ляшкахъ, а иногда и мѣстныя кровоотвличенія.

Въ хроническомъ воспаленіи матки, вместо обшихъ, предписываются почти всегда мѣстныя кровопускания посредствомъ кровососныхъ банокъ и плавокъ, приставляемыхъ въ разныхъ мѣстахъ, смотря по мѣсту пребыванію воспаленія въ той, или другой сторонѣ матки. Нѣкоторые советовали даже припускать плавки къ маточному рыльцу посредствомъ вводимаго въ рукавъ влагалищнаго зеркала (*speculum vaginae*); но это едва ли можетъ имѣть успѣхъ. Кроме сего здѣсь доставляютъ пользу смягчающія и успокаивающія впрѣскиванія изъ настоя бѣлены, болиголова, маковыхъ головокъ и проч., также полуванны и общія ванны, противураздраждающія и нарывныя средства на лобкѣ или внутренней поверхности ляшечекъ, либо фонтанели на верхнемъ плечѣ. Услажденія хлористая ртуть дается здѣсь вместѣ съ вытяжкою одурника или болиголова (N. 134).

c.) *По припадочнымъ показаніямъ.* Жестокія боли, оказывающіяся здѣсь какъ въ острый, такъ и хронической формѣ, укрощаются успокаивающими и смягчающими средствами к. т. болеутолительными мазями (N. 49.) и припарками (N. 48.), теплыми ваннами, впрѣскиваніемъ въ рукавъ матки отвара маковыхъ головокъ, либо травы болиголова въ молокѣ и употребленіемъ внутрь кодеина, лактукарія (N. 2. 3.) и пр. Чрезмѣрная слабость, обнаруживающаяся послѣ долгаго продолж-

женія болѣзни, требуетъ иногда укрѣпляющихъ средствъ, покрайней мѣрѣ приличной питательно-кѣпительной діатеты, особенно если со слабостю сопряжено и изнуреніе тѣла. Равнымъ образомъ, если замѣчаются припадки антическаго огня, и горячка воспринимаетъ гнилой или первый характеръ, то нужно всячески поддерживать силы для споспѣществованія отдѣленію мертвыхъ частей отъ живыхъ. Въ сіе времена предписываются летуче-возбуждающія средства к. т. мокусъ, камфора, маунъ, змievикъ, также минеральная кислоты (N. 9.), эфиры (N. 22), вмѣстѣ съ кѣпительною діетою и наружнымъ употребленіемъ ароматныхъ припарокъ на брюхѣ, ароматныхъ ваннъ и проч. Когда же на противъ того появляются признаки нагноенія, то надлежитъ способствовать скорѣйшему созрѣванію и вытеченію гноя къ варужи. Для сего назначаются смягчающія примочки или припарки, впрыскиванія и паровые ванны. Если вытеченіе гноя происходитъ чрезъ маточный рукавъ, то для очищенія рукава, потребны частыя впрыскиванія. Когда же вытеченіе гноя совершается другимъ путемъ, то назначается особенное лѣченіе въ разсужденіи положенія, перевязки и проч. Во всякомъ случаѣ однакожъ должно поддерживать силы исландскимъ мохомъ, салепомъ, перуанскою коркою, мясными бульонами, яйцами въ смятку и проч.



ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

ВОСПАЛЕНИЯ ПЕРЕПОНЧАТЫХ ОРГАНОВЪ.

(*Emprestata membranosa*).

§ 400.

Перепончатыми органами называются тѣ, кои состоятъ изъ нѣсколькихъ оболочекъ, большею частію въ трубку свернутыхъ, или сферически расположенныхъ и служащихъ къ провожденію либо къ воспріятію разныхъ жидкостей и веществъ, необходимыхъ для тѣла. Нѣкоторые изъ нихъ устроены только изъ плотныхъ, болѣе или менѣе тонкихъ, волокнистыхъ и плевистыхъ перепонокъ, (вены, всасывающіе сосуды, яичники) также съ примѣсью мышечныхъ волоконъ (артерій), другіе изъ кіѣтчатой, мышечной и весьма чувствительной слизистой перепонокъ (пищепріемное, дыхательное горло, его вѣтви и проч.); а иные изъ волокнистой, мышечной, нервной, сосудистой и слизистой оболочекъ (желудокъ, кишки, мочевой пузырь и пр.). Воспалительный процессъ, развивающійся въ ихъ органахъ, хотя также различно измѣняется, смотря по различному, болѣе или менѣе важному отправленію ихъ и избытку въ нервахъ и сосудахъ; однако жъ онъ имѣеть всегда отличительныя черты отъ предыдущихъ и послѣдующихъ родовъ воспаленій, зависящія собственно отъ устройства сихъ перепончатыхъ орудій (см. § 119).

Воспаление артерий.

(*Arteriitis.*)

§ 401.

Воспаление сие чаще всего случается во внутренней серозной оболочкѣ артерій и занимаетъ либо иѣкоторыя части сосудовъ, либо распространяется по всей системѣ артерій; по чому и раздѣляется на общее и частное воспаление.

§ 402.

Общее или повсемѣстное воспаление артерий (*arteriitis universalis*) представляетъ елѣдующія *явленія*: чрезмѣрное сосудистое раздраженіе, выражющееся жестокими огневичными припадками, сильнымъ биеніемъ всѣхъ артерій, иногда примѣтнымъ даже для зрѣнія; необыкновенно полнымъ и твердымъ, впрочемъ равномѣрнымъ и только слегка ускореннымъ жилобиеніемъ; сильнымъ, по правильнымъ движеніемъ самаго сердца и чувствомъ, какъ будто въ начальственной артеріи остановилось раскаленное желѣзо, что распространяется иногда до самой бедренної артеріи. Къ сему при соединяется чрезвычайное беспокойство и жестокая тоска, боль въ головѣ и въ членахъ, неутолимая жажды, кровотеченіе изъ носа, давленіе въ груди, паклошность къ обморокамъ и проч.

§ 403.

Частное воспаление артерий (arteritis partialis) отличается следующими явлениями: в томъ мѣстѣ, гдѣ находится воспаленная артерія, существуетъ очень повышенная температура и жгучая, раздирающая, по течению артеріи распространяющаяся боль съ весьма сильнымъ біеніемъ, отличающимся отъ обыкновенного біенія артерій какъ чрезмѣрою силою, такъ и особыннымъ чирикающимъ ощущеніемъ; жилобіеніе въ прочихъ частяхъ тѣла, въ слѣдствіе участія, воспринимающаго всею артеріальною системою, дѣлается полнымъ, твердымъ и несолько ускореннымъ, усиливающимся всегда отъ движенія и раздражающихъ лѣкарствъ. Коль скоро въ слѣдствіе произшедшаго выпотѣнія начинается затвореніе больнаго сосуда, то животная теплота въ частяхъ тѣла, соответствующихъ прохожденію его уменьшается; причемъ отъ времени до времени наступаютъ припадки озноба и жилобіеніе въ воспаленномъ мѣстѣ теряется; напротивъ того біеніе прочихъ артеріальныхъ стволовъ и самаго сердца становится тѣмъ сильнѣе, чѣмъ значительнѣе начинаетъ быть мѣстное препятствіе въ большой артеріи. Иногда артерія во второмъ періодѣ воспаленія, отъ накопленной въ ней створоженной пасоки, ощущается твердою. Части, содѣлавшіяся холодными и почти тупыми, при движеніи возбуждаются чувство, какъ будто опѣ вѣвши пугты.

Нельзя отвергнуть, что воспалительный процессъ въ артеріахъ часто имѣеть хроническое свойство и обна-

руживается весьма умъренными припадками и медленнымъ, долговременнымъ течениемъ; однако же въ такомъ случаѣ онъ зависитъ наиболѣе отъ аневризматическихъ разширений или болѣзненной дряблости сосудистыхъ стѣнокъ. Мягкость и дряблость сердца, происходящія отъ всеобщаго ослабленія, бываютъ также частымъ слѣдствиемъ хронического воспаленія сердца (*Corvisart*).

Исходы суть а) *совершенное разрушение*, обнаруживающееся наипаче при общемъ воспаленіи сильными критическими испражненіями кожи и почекъ, также кровотеченіями, особенно изъ носа; б) *болѣзненныя измѣненія* у устройства артерій, к. т. отолстѣніе артеріальныхъ стѣнокъ, суженіе сосудистаго канала и совершенное затвореніе онаго, превращеніе артеріи въ хрящевое существо, окостенѣніе, изъязвленіе, частное разрушеніе сосудистыхъ стѣнокъ, образованіе аневризмъ и проч. с.) *Смерть* произраждается чаще всего отъ параличнаго ослабленія сердца послѣ предшествовавшей чрезмѣрно напряженной дѣятельности его.

§ 404.

Причины важнѣйшія суть: 1) всякое непомѣрное и долговременное ускореніе кругообращенія крови, причиняемое сильными раздраженіями кровеносной системы, движеніями тѣла, доводящими до крайняго изнеможенія, чрезмѣрнымъ употреблениемъ спиртныхъ напитковъ, сильными страстами и т. п.; 2.) мгновенное прекращеніе усиленной накожной дѣятельности, какъ бываетъ

при потѣвіи и сыпяхъ (простуда и скрывшіяся внутрь сыпи); 3.) составоломное, венерическое и ртутное худосочіе; 4.) мѣстныя поврежденія артерій при переломахъ костей, ушибѣ, раненіи, перерѣзываніи и подвя-зываніи артерій во время отсѣченія члена, при артері-отоміи, остановленіи кровотечеій, при операціи надъ аневризмою и таковецъ распространеніе воспаленія на артерію при воспалительномъ страданіи смежныхъ частей.

§ 405.

Предсказание. Воспаленіе большихъ или главныхъ артерій представляетъ всегда опасное состояніе, ибо при оному воспалительное раздраженіе удобно распространяется на центральные органы сосудистой системы. Опасность бываетъ тѣмъ большая, чѣмъ ближе находится страданіе къ сердцу. Въ частномъ воспаленій предсказаніе зависитъ отъ значительности причинъ, свойства, степени и продолженія болѣзни, также отъ большаго или меньшаго состраданія всей артеріальной системы. При семъ должно также обращать вниманіе и на исходы воспаленія.

§ 406.

При леченіи, наипаче частнаго воспаленія артерій, необходимо нужно удаленіе случайныхъ причинъ.

Огломки костей, или другія тѣла, раздражающія артерію, должно устранить, лигатуру спать, давленіе уничтожить и воспаленіе окружныхъ частей разрѣшить. Послѣ сего надлежитъ предпринимать лѣченіе, сообразное свойству болѣзни и сопровождающей ону горячкѣ. Въ большей части случаевъ при частномъ воспаленіи мы должны имѣть дѣло съ синохальною или стеническою болѣзнию, и потому назначать противовоспалительный способъ лѣченія, приличный степени страданія. Сюда принадлежать общія кровопусканія, доставляющія преимущественную пользу въ началѣ болѣзни, противовоспалительные лѣкарства, въ особенности селитра въ порошкѣ (N 11, 61.) и хлористая услащенная ртуть; слабительныя изъ среднихъ солей (N 19, 20) при соблюденії очень утонченной водянистой діеты; местно пѣявки въ запачительномъ числѣ, холодные примочки, свинцовая вода, растворъ сѣриокислого цинка, ртутныхъ и смягчающія масляныхъ втираний. Въ дальнѣйшемъ теченіи одобряется рвотный камень съ приличными соединеніями (N 26.) для усиленія отдѣленій въ желѣзахъ и слизистыхъ оболочкахъ. Если же таковое воспаленіе восприиметъ страдательный характеръ, то при выборѣ лѣкарствъ должно поступать съ осторожностю и вниманіемъ, избѣгая всѣхъ горячительныхъ средствъ, ускоряющихъ кругообращеніе и соблюдала пѣжную діету. Для внутренняго употребленія похваляются въ такомъ случаѣ услащенный минеральный (N 57, 64, 16.) кислоты (*Frank, Sprangenbergs*), также наперстянка (N 6, 54.), а снаружи примочки изъ настоя ароматныхъ травъ также изъ вина и уксуса, раствора квасцовъ, от-

вара хинны и пр. unguentum camphoratum, nervinum cum opio и проч.

Нѣкоторые предполагаютъ, что можно отвратить распространеніе воспаленія въ сосудистомъ кавалѣ къ верху посредствомъ скатія артеріи, особенно если воспаленіе существуетъ во внутренней артеріальной оболочкѣ; однакожъ способъ сей болѣе сумнителенъ, нежели надеженъ.

Что касается до хронического воспаленія артерій; то въ ономъ также приличенъ болѣе антифлогистической способъ лѣчепія к. т. умѣренная, нераздраждающая діета, спокойный образъ жизни, производимыя по временамъ кровоотвлеченія и противураздраженія, удаление различныхъ причинныхъ моментовъ, и пр.

Воспаленіе венъ.

(*Phlebitis*).

Воспаленіе венозныхъ оболочекъ, наиболѣе внутренней, случается гораздо чаще, нежели артеріальныхъ и даже въ то время, когда оно произраѣдается въ мѣлкихъ венахъ, сопровождается первѣко жестокими явленіями и угрожаетъ опасными послѣдствіями.

§ 408.

Лолепія. При воспаленіи наружныхъ венъ оказывается сперва растягивающая боль, умножающаяся отъ давленія и имѣющая свое мѣстопребываніе въ явственно ощущаемомъ, твердомъ, узловатомъ канатикѣ, образовавшемся изъ венъ. Мало помалу воспаленіе распространяется на обрѣтающуюся вблизи кѣтчатую плеву и кожу, такъ что на ней развивается рожеобразное воспаленіе (*pseudoerysipelas*), которое занимаетъ не рѣдко большую объятность и переходитъ въ нагноеніе либо въ отечное распуханіе (*oedema*). Сверхъ того, иногда раждаются небольшіе нарывы въ венахъ, частію въ томъ мѣстѣ, гдѣ первоначально произошло воспаленіе, а частію выше онаго. Въ некоторыхъ случаяхъ они встрѣчались даже въ отдаленныхъ мѣстахъ: въ легкихъ, между грудными мышцами и проч.

При таковыхъ *млѣтныхъ* страданіяхъ обнаруживаются также *припадки общаго противудѣйствія* и при томъ въ такой силѣ, какой нельзя бы было ожидать отъ воспаленія небольшаго венознаго ствола. Припадки сіи состоять въ слѣдующемъ: съ чувствомъ слабости, стѣсненія и болей въ груди, также унынія духа наступаетъ довольно сильный огневичный ознобъ, за которымъ слѣдуетъ жаръ, иногда надолго оставляющій въ перстахъ особенное чувство колотья (*calor mordax*); жилобіеніе бываетъ удивительно частое, а иногда полное, твердое, сжатое, мягкое и неправильное. Весьма скоро, почти при первомъ огневичномъ развитіи, оказывается уже

бредъ, боль въ головѣ, спинѣ, членахъ и брюхѣ, сильная жажда, въ началѣ красный, но вскорѣ потомъ смуглый и сухой языкъ, трудное дыханіе, чрезвычайное ослабленіе мышечныхъ спль и наконецъ безчувственное первознное состояніе, напосящее не рѣдко смерть.

Отличительные признаки воспаленія внутреннихъ венъ очень мало еще извѣстны (*Balling*), а потому и неописываются здѣсь.

§ 409.

Исходы. Совершенное *разрѣшеніе* оказывается только въ благополучныхъ случаяхъ, при критическихъ явленіяхъ, наипаче, если заблаговременно употреблены были приличныя средства. Иногда образуются *нарывы и язвы*, затвореніе сосудистаго канала, отолщеніе венозныхъ стѣнокъ, полипозныя наращенія, ложныя перепонки, свертки крови въ полости сосуда и проч. *Смерть* слѣдуетъ здѣсь чаще всего отъ усилившагося перваго страданія и параличнаго состоянія сердца.

§ 410.

Распознаваніе сего воспаленія во вѣпніихъ частяхъ неподлежитъ почти никакому затрудненію, особенно если принять во вниманіе предшествовавшія причины. Въ такомъ случаѣ воспаленіе венъ едвали можно смышать съ воспаленіемъ артерій, лимфатическихъ судовъ и первовъ. Первое состояніе, оказывающееся

при воспаленіи венъ, хотя и не можетъ служить къ временному распознаванию; однакожъ въ практическомъ отношеніи чрезвычайно важно и изъ ошага правильно можно судить о послѣдствіяхъ венознаго воспаленія. Хотя причину сего состоянія и опасныхъ припадковъ, соединенныхъ съ онимъ, некоторые приписываютъ воспрѣятію въ потокъ крови гноя и другихъ жидкіхъ веществъ, образующихся при семъ въ воспаленномъ венозномъ каналѣ (*Magendie*), однакожъ это зависитъ, кажется, отъ другихъ обстоятельствъ, тѣмъ болѣе что первая система разстроивается въ отправленіяхъ своихъ не только при воспалевіи, но и при весьма многихъ другихъ страданіяхъ венъ (*Puchell*). Воспаленія внутреннихъ венъ к. т. воротной и полой, доселе извѣстны намъ только по однимъ результатамъ, находимымъ при вскрытии мертвыхъ тѣлъ.

§ 411.

Причины, а) *внутреннія* мало извѣстны. Наибольшее расположение къ сей болѣзни имѣютъ особы, кои страждуть механическими задержаніями движенія крови въ венахъ, к. т. геморроидалисты, беременныя женщины и пр. Что же касается до *внѣшніхъ* причинъ, то чаще всего воспаленіе сіе приключается послѣ кровопусканія, если оно производится неискуснымъ образомъ, или когда при ономъ дѣлается большая рана, а особенно когда занаетъ нечисть или напитанъ вреднымъ веществомъ; сверхъ сего послѣ отрѣзыванія членовъ, подвязыванія венъ, либо пуповины; послѣ уши-

бовъ, ранъ и переломовъ, иногда отъ распространенія на вены воспаленія близлежащихъ частей. Сюда же можно отнести и иѣкоторыя хирургическія операциіи, также случайныя механическія поврежденія, сильно растягивающія вены и пр.

§ 412.

Предсказание въ сей болѣзни благопріятно только тогда, когда она заблаговременно узнается, надлежащимъ образомъ пользуется, поражаетъ особъ, бывшихъ до того здоровыми и имѣетъ мѣстопребываніе въ венахъ, не подвергавшихся разширению. При противуположныхъ же обстоятельствахъ, особенно если больной худосоченъ или обнаружились уже первыя явленія, надлежитъ всегда опасаться дурнаго исхода, какой чаще замѣчается при воспаленіи плечевыхъ венъ.

§ 413.

Лечение. Первая потребность состоитъ здѣсь въ доставленіи страждающей части горизонтальнаго положенія, въ удаленіи всякаго давленія, всякаго сильнаго движенья оной и вообще въ избѣжаніи всѣхъ причинъ. Самое воспаленіе умѣряется общими и мѣстными кровоотвлеченіями, назначаемыми преимущественно въ началѣ болѣзни. Часто однакожъ припущеніе пьявокъ къ страждающему мѣсту (не очень близко) доставляетъ еще большую пользу, нежели общее кровопусканіе (*Puchelt*). Сверхъ сего здѣсь употребляются холодныя примочки

изъ воды и уксуса, либо изъ свинцовой воды до тѣхъ поръ, пока неѣть рожевиднаго воспаленія; когда же оное произойдетъ, то предписываются сухія припарки и только при чрезмѣрномъ напряженіи и болѣхъ теплныя, смягчающія и успокаивающія примочки. Въ семъ послѣднемъ случаѣ вмѣсто пьявокъ одобряются лучше наѣчки глубиною въ 1 линію, а длиною въ 5 линій (*Schönlein*). Произведеніе сращенія въ венѣ посредствомъ давленія на оную, выше или ниже воспаленнаго мѣста весьма опасно и потому никогда не должно быть предпринимаемо. Изъ внутреннихъ противувоспалительныхъ средствъ рекомендуются наиболѣе тѣ, кои способствуютъ испражненію низа к. напр. тамарины (N 13.), очищенный винный камень (N 14.), сѣрнокислая соли (N 20.), рвотный камень въ большихъ пріемахъ (N 104) или хлористая услащенная ртуть, которая во многихъ отношеніяхъ заслуживаетъ одобреніе. При семъ потребна также скудная малопитательная диета и спокойствіе. Большая слабость, оказывающаяся въ самомъ началѣ болѣзни, отнюдь не должна отводить отъ противувоспалительного способа и принуждать къ употребленію возбуждающихъ и нервныхъ средствъ, кои даже въ то время, когда окажутся первыя припадки, должны быть предписываемы съ большою осторожностю и выборомъ, какъ и вообще въ первыхъ горячкахъ съ воспалительными явленіями. Съ этимъ согласны лучшіе наблюдатели сей болѣзненій формы. Если первое состояніе продолжалось уже долгое время и достигло высшей степени, то полезно давать небольшіе пріёмы камфоры въ соединеніи съ селитрою (*Jos. Frank*).

Исходы и все вышеозначенныя послѣдствія сего воспаленія уничтожаются свойственнымъ каждому изъ нихъ лѣченіемъ.

Воспаленіе лимфатическихъ сосудовъ.

(*Lymphangioitis*).

Syn., Lymphangitis, inflammatio vasorum lymphaticorum; phlegmasia alba, sparganosis.

§ 414.

Леленіл. По теченію какого либо лимфатического сосуда ощущается канатикообразная опухоль, продолжающаяся къ ближайшимъ желѣзамъ и соединенная съ распухлостію близлежащей клѣтчатой плевы и съ рожеобразнымъ покраснѣніемъ виѣшней кожи по теченію опухоли. При остромъ воспаленіи болѣй ощущаетъ обыкновенно сильныя, жгучія, растягивающія и рвущія боли съ чрезмѣрнымъ жаромъ; а при хроническомъ сихъ болей и жара не бываетъ и, вместо рожеобразной подосы, распухшій сосудъ представляется болѣе бѣлымъ.

Воспаленіе лимфатическихъ сосудовъ встрѣчается чаще на конечностяхъ, особенно нижнихъ и на мошонкѣ. Оказывающееся на ногахъ начинается болью и опухолью въ подошвѣ ноги и простирается вверхъ до паховъ, гдѣ, такъ какъ и въ подколенной чашкѣ, замѣчается значительная твердость и опухоль желѣзъ. Опухоль сія бы-

ваетъ очень жаркая и чувствительная, распространяется паконецъ чрезъ всю ляшку и представляется ровною и блестящею, но не показываетъ никакого дурного цвѣта. Въ иѣкоторыхъ случаяхъ воспаленіе ограничивается одною голевью. При воспаленіи сихъ сосудовъ въ верхнихъ конечностяхъ обнаруживаются совершенно подобныя явленія: воспаленная, весьма болѣющая, красная, канатикообразная опухоль продолжается до самыхъ подмышекъ. Такъ называемая phlegmasia alba dalens, случающаяся преимущественно у женщинъ послѣ родовъ, развивается весьма часто изъ воспаленія лимфатическихъ сосудовъ; но здѣсь опухоль бываетъ гладкая, неровная, очень обширная, блѣдная, напряженная, упругая и весьма болѣющая.

Исходы. Въ благопріятныхъ обстоятельствахъ большою частію слѣдуетъ разрѣшеніе болѣзни, но при существующемъ худосочіи обнаруживается иногда отвердѣніе, занимающее болѣе желѣзы и клѣтчатую плеву. Острое воспаленіе, при небрежномъ лѣченіи, часто оканчивается нагноеніемъ и даже антоповымъ огнемъ, при чемъ клѣтчатая плева разрушается довольно глубоко подъ кожею.

§ 415.

Причины. Золотушные и вообще худосочные особы, также ранній возрастъ и роженицы имѣютъ, по видимому, преимущественное расположение къ образованію воспаленія лимфатическихъ сосудовъ. Частѣйшая возбуждающія причина онаго суть: раны, язвы и дру-

гія поврежденія тѣла, раздражаемыя какими либо острыми веществами, укушенія ядовитыхъ животныхъ, преимущественно змѣевъ, ужаленія пчель, ось и даже комаровъ, дѣйствіе заразительного яда при злокачественномъ волдырѣ, сочувственное раздраженіе при ноготномъ воспаленіи (*panaritium*) и т. д.

Предсказаніе. О значительности воспаленія лимфатическихъ сосудовъ можно судить изъ причинъ, степени болѣзни и наклонности ея къ тому или другому исходу. Воспаленія, причиняемыя дѣйствіемъ животнаго или заразительного яда, часто бываютъ чрезвычайно опасны. По переходженіи болѣзни въ нагноеніе, или въ антионовъ огонь раздается не рѣдко большое разрушеніе въ страждущей части, могущее, въ иѣкоторыхъ обстоятельствахъ, угрожать также опасностю.

§ 416.

При лѣченіи должно стараться наиболѣе обѣ *удаленіи пригнѣ* и о содѣлaniї вліянія ихъ безвреднымъ. Въ семъ отношеніи воспалительный состоянія, отъ коихъ можетъ зависѣть болѣзнь, надлежитъ умѣрять, нарывы вскрывать, язвы очищать отъ ихъ остроты, раздраженные рапы перевязывать нѣжными, смягчающими веществами, а напоенныя ядомъ лѣчить сопротивленіемъ ихъ состоянію и свойству. Переносы должны быть отводимы, а худосочіе и другія внутреннія болѣзни состоянія по возможности укрощаемы.

Самое воспаленіе лѣчится обыкновенно *сообразно его свойству.* Острая форма требуетъ кровопуска-

ній, смотря по обстоятельствамъ, общихъ или мѣстныхъ. Въ большей части случаевъ достаточно одно припущеіе значительного числа пыльвокъ вдоль воспаленіаго сосуда. Сверхъ сего внутрь даются слаблящія на низъ противувоспалительныя средства, напаче услащенная хлористая ртуть, а снаружи употребляются ртутныя втиранія и холодныя примочки, кои смѣняются теплыми припарками въ то время, когда воспаленіе должно перейти въ нагноеніе.

Хроническое или скрытое воспаленіе лимфатическихъ сосудовъ большею частію бываетъ худосочнаго происхожденія и всегда трудно излѣчивается. Внутрь предписываются въ такомъ случаѣ легкія ртутныя приготовленія (N. 133. 134), болиголовъ, наперстянка (N. 26), сладкогоркій пасленъ (N. 113), камфора и пр; а снаружи втирается *unguentum hydrargiri cinereum* и производится противураздраженіе, напаче посредствомъ частаго прикладывашія сухихъ насосныхъ банокъ (*cuscutae siccæ*.)

Воспаленіе гортани.

(*Laryngitis*).

Syn. *Cynanche* s. *angina laryngea, inflam. laryngis, Laryngite sousmuqueuse sviv. Cruveilhier; Oedème de la glotte sviv. Bayle.*

§ 517.

Ахаленія: осиплость голоса, который умалается по мѣрѣ возрастанія болѣзни и дѣлается тощимъ, свистящимъ.

щимъ, подобно какъ бываетъ въ крупѣ; ощущеніе въ горгани тяготѣнія, боли, сжатія, удавки и присудствія посторонняго тѣла; трудное, сопровождаемое болю и шумомъ дыханіе при вдохновеніи воздуха, но свободное и легкое при выдыханіи; сиповатый, свистящій, судорожный кашель; болѣе или менѣе частые приступы удушающаго стѣсненія въ груди, иногда столь сильнаго что больной схватывается съ постели, дабы избѣжать угрожающаго обмирапія. Во время приступа лицо больнаго чрезвычайно измѣняется, дѣлаясь блѣднымъ либо віолетовымъ и выражая сильный испугъ. Страждущій употребляетъ всѣ усилия для облегченія дыханія, то хватаясь за кровать, то накиная голову впередъ и избѣгая всякаго движенія. Вдыханіе его чрезвычайно трудно, тоскливо, болѣе или менѣе подобно тому, какое оказывается въ крупѣ, но составляеть разительную противу- положность съ выдыханіемъ, совершающимся легко и свободно.

Пароксизмъ таковой, во время коего больной можетъ и умереть, продолжается отъ 2—5 минутъ, сопровождаясь холоднымъ клейкимъ потомъ, малымъ, сжатымъ частымъ жилобеніемъ и проч. По прошествіи нѣкотораго времени дыханіе дѣлается таковымъ, какъ было до приступа, иногда нѣсколько свободнѣе, а иногда труднѣе. Признаковъ огневичнаго движенія не замѣчается, жилобеніе измѣняется только во время удушающаго пароксизма. Глотаніе всегда бываетъ болѣе или менѣе трудное, сопровождаемое болю, часто даже невозможное, при чмъ принятное питье извергается чрезъ ноздри.

§ 418.

Течение сей болѣзни бываетъ различное. Иногда она начинается столь сильнымъ удушающимъ приступомъ, что отъ оного, безъ подаванія должной помощи, въ скоромъ времени слѣдуетъ смерть (*Boerhave*). Большею же частю такому приступу предшествуетъ легкое болѣзненное состояніе, продолжающееся иѣсколько дней и обнаруживающееся болѣе или менѣе значительною осиплостью голоса, непріятнымъ ощущеніемъ въ гортани и проч. Въ послѣдствіи же, когда воспалительная опухоль усиливается и зажметъ проходъ воздуха, дыханіе совершается съ шумомъ, затрудняясь сперва по временамъ, а потомъ почти непрерывно, и въ сie то время приступы удушія, подвляющіеся одинъ за другимъ, угрожаютъ безпрестанно смертію. Среднее продолженіе болѣзни бываетъ 2—5 дней.

Смерть слѣдуетъ при семъ чаще всего отъ *серозно-пластического выпотыка* и чрезмѣрной распухлости, затворяющей проходъ воздуха въ гортани (*oedema laryngis*). Иногда вместо пластического выпотыка образуется *серозногнойная жидкость*, которая, накопляясь между мышцами горлани и стѣсняя проходъ воздуха, причиняетъ либо смерть, либо *горланиную чахотку* (*phthisis laryngea*) чрезъ произрожденіе изъявлений въ горлани. Въ иѣкоторыхъ случаяхъ замѣчено и *антоповоогненное разрушеніе* (*laryngitis gangrenosa*).

§ 419.

Причины. Болѣзнь сія чаше всего рождается у особъ, ослабленыхъ предшествовавшими болѣзнями, также при выздоровлешіи отъ трудныхъ горячекъ; впрочемъ она случается и у людей очень крѣпкихъ. Изъ случайныхъ причинъ частѣйша суть: простуда гортани при чрезмѣрномъ напряженіи оной крикомъ, пѣвіемъ и т. п. также распространеніе другихъ воспаленій на гортань, переносы остротъ, особенно на кожныхъ сыпей и пр.

§ 420.

Лѣченіе. Такъ какъ воспаленіе сіе, при быстромъ ходѣ своемъ, усиливаясь до чрезмѣрности, можетъ совершиенно уничтожить прохожденіе воздуха чрезъ гортань; то при лѣченіи всячески нужно стараться *отверащать усиливаніе воспаленія* въ самомъ началѣ онаго; если же это невозможно уже, то доставлять *схожденіе воздуха искусственнымъ образомъ*.

Для выполненія первого показанія должно прибѣгнуть къ самому сильному антифлогистическому лѣченію, незабывая при томъ, что весь успѣхъ лѣченія зависитъ здесь отъ благовременнаго поданія помощи, состоящаго въ самоскорѣйшемъ употребленіи приличныхъ средствъ. Обильное кровопусканіе, простирающееся даже до обморока, значительное число пьявокъ, припускаемыхъ около горла, употребленіе рвотнаго камня по способу *Пешье* (N. 104.) и слабительныхъ промывательныхъ, приложен-

ніє крѣпкихъ горчичниковъ на верхнихъ копечностяхъ или на затылкѣ составляютъ довольно вѣрныя средство, если назначаются во время, повторяются при первой потребности и приводятся въ дѣйствіе съ бдительнымъ присмотромъ.

Если же лѣченіе предпринято поздно, или болѣзнь достигла жестокой степени и неуступаетъ означеннымъ средствамъ, то отнюдь не должно колебаться въ доставленіи вхожденія воздуха искусственныхъ образомъ. Это производится либо а) чрезъ введеніе въ гортань аластической трубки по способу *Дезольта*, либо б) чрезъ разсѣченіе самой гортани (*Laryngotomy*). Введеніе трубки въ гортань, хотя и предпочтается некоторыми разсѣченію гортани, но оно можетъ быть предпринимаемо только въ такихъ случаяхъ, где оказывается болѣе отечное состояніе надгортанного хряща, нежели сильное, стеническое воспаленіе. Напротивъ того разсѣченіе самой гортани во всѣхъ случаяхъ составляетъ вѣрное средство, если только произведено будетъ заблаговременно.

Воспаленіе вѣтвей дыхательного горла.

(*Bronchitis.*)

Syn. Inflammatio bronchiorum, angina Bronchialis, angia pectoris, pleuritis humida, peripneumonia notha, syringitis, catarrhus inveteratus, suffocativus.

§ 421.

Явленія разнствуютъ по степени и продолженію воспаленія, также по возрасту и сложенію больныхъ.

При остромъ течениі больные ощущаютъ сильное чувство щекотанія и стѣсненія, большую сухость и постоянную, умножающуюся при вдыханіи боль позади грудной кости въ вѣтвяхъ дыхательного горла, а иногда и во всей груди. Голосъ нерѣдко дѣлается сиповатымъ, кашель сначала бываетъ сухой, сопровождаемый нѣкоторою болью, а послѣ мокрый, соединенный съ изверженіемъ обильной, пѣнистой, смѣшанной съ кровяными полосками и часто даже гноеобразной харкотины. Не рѣдко развитію сихъ явлений предшествуетъ горячка, чаще же она присоединяется къnimъ послѣ и удерживаетъ свойство либо простудной огневицы, при коей ознобъ и жаръ поперемѣнно сменяются между собою, либо совершенно воспалительной, сопровождаемой сильнымъ постояннымъ жаромъ, очень полнымъ и твердымъ жилобеніемъ со всеобщимъ стеническимъ возбужденіемъ. Посредствомъ стетоскопа примѣчается хрипѣніе (*râle*) въ груди, коего отличительный тонъ бываетъ звонкий, иногда свистящій. Объятность, на какую распространяется хрипѣніе, показываетъ пространство самаго воспаленія. Скрипѣніе слизи слышно въ то время, когда отдѣленіе ея умножается.

Въ хроническомъ состояніи болѣзнь сія обнаруживается преимущественно кашлемъ и неправильнымъ отдѣленіемъ харкотины; но никогда, особенно въ первое время, не сопровождается огневичными движеніями. Кашель бываетъ сухой либо мокрый съ изверженіемъ харкотины различного цвѣта и консистенціи. Сухой кашель сопровождается иногда удушьемъ (*asthma siccum*), возвращающимся по временамъ.

Выздоровление въ обѣихъ сихъ случаяхъ слѣдуетъ обыкновенно при наступлениі свободно извергаемой, шарообразной харкотинѣ и критического пота. Иногда болѣзнь переходитъ въ настоящее *воспаленіе легкихъ*. Сie случается въ то время, когда воспалительный процессъ распространяется на тончайшіе легочные пузырьки и поражаетъ самый паренхимъ легкаго. Въ вѣковыхъ случаяхъ остается *хроническое слизотеченіе* (bronchorrhoea) или *легочная чахотка*. Смерть приключается здѣсь при чрезмѣрномъ стѣсненіи груди и признакахъ сильнаго накопленія слизи въ вѣтвяхъ дыхательного горла съ мучительнымъ удушеніемъ (cataarrhus suffocativus).

§ 422.

Сюда, по видимому, принадлежитъ и то болѣзненное состояніе, которое многіе авторы называютъ *скрытымъ воспаленіемъ легкихъ* (peripneumonia notha). Страданіе сie поражаетъ преимущественно старыхъ людей и такихъ, кои имѣютъ тучное, одутливое тѣло, большую частію при влажнохолодной погодѣ. Больные ощущаютъ только пѣкоторую боль, давленіе и стѣсненіе въ груди, имѣютъ удушающее дыханіе, соединенное съ сильнымъ скрипѣніемъ слизи, кашель съ изверженіемъ бѣлой, весьма вязкой, часто пѣнящейся, рѣдко смѣшанной съ кровью харкотинѣ, которая впрочемъ иногда вдругъ задерживается и умножаетъ стѣсненіе въ груди. При семъ страждущіе подвергаются головокруженію и головной

боли, умножающейся отъ кашля, имѣютъ легкія огнесточечные движения, мутную мочу, обложеній слизью языкъ, иногда рвоту, блѣдный цвѣтъ лица и большую слабость въ тѣлѣ.

Продолженіе сей болѣзни весьма различно. Въ здоровье переходитъ она при обильной харкотинѣ, критическихъ испражненіяхъ пота и мочи. Смерть наступаетъ часто неожиданно отъ удушенія, быстро умножающейся слабости, или апоплексического удара. Послѣдственная страданія суть: слизистая чахотка и водянная болѣзнь. Что касается до сущности сей болѣзни, то Сиденгамъ поставлялъ опию въ ослизеніи крови, а П. Франкъ въ сильномъ катаррѣ вѣтвей дыхательного горла, но вѣроятнѣе всего здѣсь играетъ главную роль воспаленіе, поражающее преимущественно слизистую оболочку вѣтвей дыхательного горла.

§ 423.

Причины. Наибольшее расположение ко всѣмъ этимъ формамъ воспаленія имѣютъ вообще люди слабые, изнѣженные, потерпѣвшіе значительную потерю крови и перенесшіе какія либо трудныя болѣзни. Изъ случайныхъ причинъ самая обыкновенная есть влияніе холода на все тѣло или на нѣкоторыя части его, особенно при потѣніи и разгоряченіи оныхъ и при быстрымъ смыненіи температуры; сверхъ сего вдыханіе чрезмѣрнаго жара, или тонкою пылью напитаннаго воздуха, также хлора, амміака, селитроватаго гаса, уксусной кислоты и пр. равно какъ и присудствіе по-

сторопливъ тѣхъ въ дыхательномъ горлѣ. Кроме сего, такъ какъ болѣзнь эта есть обыкновенный сопутникъ коклюша, воспаленія легкихъ, иѣкоторыхъ заразительныхъ и нервныхъ горячекъ, то причинные моменты и сихъ недуговъ, могутъ произраѣдать воспаленіе вѣтвей дыхательнаго горла.

§ 424.

Предсказаніе. Важность болѣзни сей зависитъ вообще отъ большей или меньшей обѣятности воспаленія. Если вышеозначенное хрипѣніе въ груди, примѣщаемое посредствомъ стетоскопа, распространяется на всю обѣятность одного, или на большую часть обѣихъ легкихъ, то опасность бываетъ очень большая; а если на все пространство обѣихъ легкихъ, то смерть почти неизбѣжна. Сверхъ того, воспаленіе сie у дѣтей и стариковъ гораздо опаснѣе, нежели у прочихъ особъ. Страданіе, раждающееся отъ эпидемическихъ вліяній бываетъ гораздо труднѣе, нежели отъ спорадическихъ; а обнаруживающееся въ формѣ regiрneumoniae nothaе напосить смерть иногда неожиданно.

§ 425.

Лѣченіе. Если болѣзнь произошла отъ простуды, обнаруживается болѣе въ катарральной формѣ и умѣренной степени, то назначается теплое содержаніе, обильное питье теплыхъ разводящихъ и смягчающихъ напит-

ковъ, а иногда и легкихъ потогонительныхъ лѣкарствъ какъ въ катаррѣ (ч. 1. стр. 339.). Въ сильной степени болѣзни, сопровождаемой значительнымъ общимъ возбужденіемъ и усиленнымъ страданіемъ груди, предписывается вначалѣ антифлогистической способъ, умѣренная кровоиспражненія, селитра (№ 61, 62.) и пр.; а послѣ даются такія лѣкарства, кои способствуютъ изверженію харкотины и поддерживаютъ испареніе кожи к. т. грудной чай (№ 120.), рвотный виший камень въ малыхъ пріемахъ (114.), нашатырь (№ 110.), минеральный кермесь, златоцвѣтная сюрма (№ 121.) и пр. При сильномъ скопленіи мокроты въ вѣтвяхъ дыхательного горла рвотное часто доставляетъ отличную услугу. Когда же наступить періодъ ослабленія и выхарканіе мокроты трудное, то съ пользою можно давать: сѣру, сенегу (№ 27.), баранку (№ 29.), морской лукъ, цвѣты роснаго ладана (№ 28. 30.), камфору и проч. Вмѣстѣ съ симъ должно быть соединяено и употребленіе отводящихъ средствъ, наипаче нарывнаго пластиря. Тамъ, гдѣ страданіе сопряжено съ первыми припадками, напр. въ коклюшѣ, съ большими успѣхомъ употребляются наркотическая лѣкарства, особливо синильная кислота (№ 4, 56), лавровишеневая вода (№ 5.), лактукарій (№ 3.), белена (№ 1, 77.), болиголовъ (№ 134), а при большой слабости, какъ часто случается у старыхъ людей *in peripneumonia notha*, дается преимущественно *liqor ammonii anisatus*, возбуждающій грудной чай (№ 29), цвѣты роснаго ладана съ камфорою (№ 28, 30.) и пр.

Воспаление глотки.

(*Pharyngitis*).

Syn. Angina gutturalis, pharyngea, inflammaio pharyngis, syphanche.

§ 426.

Явления. Наступление сего воспаления возвещается обыкновенно ощущениемъ жара и сухости на дѣв рта, распространяющихся въ самыя ноздри. Слизистая оболочка, одѣвающая глотку, миндалеобразныя желѣзы и нѣобную занавѣску, краснѣетъ и лоснится. Больной жалуется на боль въ сихъ частяхъ болѣе или менѣе сильную и напрягающую, которая однакожъ ограничивается преимущественно заднею и нижнею частию зѣва, впереди шейныхъ позвонковъ. Краснота и боль безпрестанно умножаются, дыханіе почти свободно, но глотаніе болѣе и болѣе затрудняется, часто даже дѣлается невозможнымъ, особенно при проглатываніи жидкостей. Опухоль воспаленныхъ частей не очень значительна, исключая язычка, коего объемъ увеличивается иногда до того, что онъ опадаетъ на основаніе языка и раздражая его, причиняетъ безпрерывное, очень мучительное побужденіе къ плеванію и рвотѣ. Въ сіе же времена ощущаются не рѣдко довольно сильныя боли въ одномъ или въ обѣихъ ушахъ. Когда воспаленіе достигаетъ такой степени, то оно сопровождается всегда почти довольно сильною горячкою, пальщю, неутолимою жаждою

дою и проч. Въ послѣдствіи времени мѣсто сухости заступаетъ обильное отдѣленіе вязкой слизи, извергающейся съ великимъ мученіемъ и тошнотою. У иныхъ воспаленіе сіе бываетъ поверхностнымъ, занимающимъ только глоточно-небную перепонку, а у другихъ оно поражаетъ и клѣтчатую плеву, обрѣтающуюся подъ слизистою оболочкою, въ какомъ случаѣ воспаленіе достигаетъ высшей степени и, сопровождаясь всѣми явленіями флегмонознаго воспаленія, оканчивается нерѣдко нагноеніемъ.

§ 427.

Теченіе и исходы. Весьма рѣдко воспаленіе глотки продолжается долѣе двухъ недѣль; гораздо чаще оно оканчивается въ семь или восемь дней. Обыкновенный его исходъ составляетъ *разрѣшеніе*. Очень часто также оно переходитъ въ *хроническую форму*, при чёмъ оказывается обращающееся въ привычку затруднительное глотаніе съ легкою болью въ глоткѣ и смежныхъ частяхъ, также необыкновенная сухость, либо умноженное отдѣленіе страждущей перепонки. *Нагноеніе*, рѣдкій впрочемъ исходъ, возвѣщается всегда ощущеніемъ необыкновенного біенія въ какой либо сторонѣ глотки съ неправильными приступами озноба; послѣ чего въ скоромъ времени образуется мягкая зыблющающаяся опухоль, которая до вскрытия своего очень затрудняетъ дыханіе, а еще болѣе глотаніе. Переходъ въ *антоновъ огонь* замѣченъ только при усилившемся до чрезвычайности воспаленіи. Онъ возвѣщается всегда обоняліемъ особен-

ной смрадности, при чёмъ усматриваются на днѣ рта антоновоогненный пятна или струпья.

§ 428.

Причины. Предрасположение къ сей болѣзни имѣютъ наиболѣе молодые люди сангвинического темперамента. Есть также особы, у которыхъ очень часто произрахжается это воспаленіе и при томъ безъ явственныхъ причинъ, но оно у нихъ почти всегда имѣть хроническую форму. Изъ случаиныхъ причинъ обыкновеннѣйшія суть поглощенные и остановившіеся въ глоткѣ остроконечныя вещества, рыбы кости, булавки и проч. также впечатлѣнія холода на тѣло, напиache соединенного съ влажностію; чаще же всего простуда ногъ. Иногда воспаленіе глотки приключается отъ по-глощаемыхъ чрезмѣрно острыхъ, раздражающихъ, слишкомъ горячихъ или очень холодныхъ кушаньевъ и напитковъ. Въ огневичныхъ накожныхъ сыпяхъ оно по-стоянно оказывается и нерѣдко господствуетъ эпидемически при быстро измѣняющейся погодѣ и температурѣ.

§ 429.

Предсказание основывается на степени и распространеніи болѣзни. Легкое, поверхностное воспаленіе всегда почти разрѣшается, а сильное, проникающее въ клѣтчатую плеву, удобно переходить въ нагноеніе, а иногда и въ антоновъ огонь. Хроническое воспаленіе очень трудно уничтожается; а привычное безпрестан-

но, при малъищемъ поводѣ, вновь возвращается. Если оно занимаетъ всю глотку и распространяется при томъ на окололежащія части, то угрожаетъ значительною опасностію.

§ 430.

Лѣченіе. а) *По причинальнымъ показаніямъ* должно противудѣйствовать тѣмъ вліяніямъ, кои произвели воспаленіе. Если оно произошло отъ попавшихъ въ глотку остроконечныхъ веществъ, то ихъ надлежитъ осторожно извлечь приличными орудіями; если же отъ поглощенія чрезмѣрно острыхъ напитковъ или яствъ, то нужно стараться притупить произведенное ими раздраженіе смягчающими и оболакивающими лѣкарствами. Дѣйствіе сильной простуды уничтожается обыкновенно потогонительнымъ содержаніемъ и проч:

1.) *По существеннымъ показаніямъ* надобно умѣрять воспалительный процессъ антифлогистическими средствами, сообразуясь со степенью и силою его. Въ умѣренной степени болѣзни достаточны уже полосканія горла, приготовляемыя изъ смягчающихъ, разрѣшающихъ или слегка вяжущихъ веществъ, каковы суть: отваръ овсяныхъ и перловыхъ крупъ, льняныхъ семянъ, корней просвирника, цвѣтовъ коровяка (*verbasum*) и бузины, наливки локричнаго корня съ прибавленіемъ уксусомеда, селитры и нашатыря, либо отваръ шалфея съ уксусомедомъ и т. п. Вместѣ съ симъ назначаются смягчающія припарки около шеи, раздражающія ножныя ванны, душевное и тѣлесное спокойствіе съ легкою про-

тивувоспалителью дієтою. Якщо воспаленіе значительное, то можно приставлять п'явки по сторонамъ шеи въ числѣ, соразмѣрномъ силамъ больнаго. Въ высшей степени болѣзни необходимо нужно прибѣгать къ общему кровопусканію, приставлять кровососныя банки на задней части шеи или значительное число п'явокъ и предписывать очень сильныя отводящія противураздраждающія средства, вообще антифлогистический способъ во всей его обширности, наблюдая при томъ, чтобы положеніе больнаго, было такое, которое бы отвращало всякий приливъ и застой крови въ головѣ. Въ семъ случаѣ всякое принятіе внутрь пищи, напитковъ и лѣкарствъ, всякое выполоскиваніе горла, приводя глотку въ напряженіе, ожесточаютъ воспалительный процессъ, и потому для питанія тѣла употреблять (конечно въ крайности) питательные клистиры, а вместо полосканій, назначать одно держаніе во рту, съ наклоненною назадъ головою, слизистой тепловатой жидкости съ приличною примѣсью. Самое дѣйствительное средство составляетъ здѣсь употребленіе теплыхъ ваннъ 26° или 28° Р., назначаемыхъ каждый день и продолжаемыхъ дотолѣ, пока больной будетъ въ силахъ переносить ихъ (2 — 4 часовъ). Когда воспаленіе значительно умѣрится, по все еще остается трудное глотаніе, то превосходное дѣйствіе оказываетъ наривной пластырь на затылкѣ.

Леченіе исходовъ воспаленій совершается по общимъ правиламъ. Примѣтивъ слѣды нарива въ какой либо части глотки, (зыбленіе въ опухоли), должно тотчасъ приступить ко вскрытию его остроконечiemъ бинстурея, оклееннаго ленточкою липкаго пластыря, а еще

лучше фаринготомомъ *Petit*—а и послѣ употреблять полосканія, сперва смягчающія, а потомъ нѣсколько влажущія. При переходѣ въ антоновѣ огонь должно стараться способствовать отдѣленію помертвѣлыхъ частей и воспышать всасываніе гнилой матеріи влажущими полосканіями горла съ примѣсью хлористой соды, или извести, помазываніемъ страждущихъ частей кисточкою, обмакиваемою въ соляную кислоту съ медомъ, либо въ крѣпкій растворъ селитрокислаго серебра и употреблениемъ внутрь крѣпительно-возбуждающихъ лѣкарствъ вмѣстѣ съ минеральными кислотами (N. 9. 92. 23.)

Привычное воспаленіе глотки, безпрестанно возвращающееся, лучше всего предотвращается ношеніемъ шерстяныхъ или фланельныхъ рубашекъ и исподняго платка на голомъ тѣлѣ, сухими или ароматными треніями кожи, долговременнымъ ношеніемъ фонтанели на плечѣ, постояннымъ окутываніемъ шеи фланелью и ношеніемъ резиновыхъ калошъ.

Воспаленіе пищепріемнаго горла.

(*Oesophagitis*).

§ 431.

Явленіе: занимающая большее или меньшее пространство въ пищепріемномъ горлѣ боль, которая умножается при всякомъ движении и во время проглатыва-

пія, паипаче тогда, когда проходящая пища или питье касаются воспаленного места. Боли таковой предшествуютъ, а иногда и сопровождаютъ овую жаръ и сухость въ страждущемъ мѣстѣ. Въ некоторыхъ случаяхъ оказывается также икота и болѣе или менѣе трудное обильное извержение слизи; во частѣйшее явленіе составляетъ здѣсь судорожное сжатіе горла, въ слѣдствіе коего проглатываемые напитки извергаются обратно ртомъ, или носомъ. Въ высшей степени болѣзни къ симъ припадкамъ присоединяются также общія или сочувственные страданія к. т. болѣе или менѣе томительная жажда, покраснѣніе лица, налиты кровью бѣлки въ глазахъ, тоска, жаръ и сухость кожи, полное и ускоренное жилобіеніе.

Воспаленіе сіе въ остромъ состояніи, при правильномъ пользованіи, оканчивается обыкновенно *разрѣшеніемъ*; въ неблагопріятныхъ случаяхъ чаще всего переходитъ въ *хроническое состояніе*, подавая поводъ къ *скиррознымъ перерожденіямъ и сжатіямъ горла*; иногда даже въ *нагноеніе, изъязвленіе* и даже въ *антоновъ огонь*.

§. 432.

Причины. Хотя воспаленіе сіе поражаетъ всѣ возрасты, однако же дѣти и взрослые болѣе расположены къ нему, нежели пожилые и старики. Къ *случайнымъ причинамъ* принадлежитъ поглощеніе острыхъ и разъѣдающихъ веществъ, на пр. крѣпкихъ кислотъ и щелочей, чрезмѣрию горячихъ, либо льда и холодныхъ жид-

костей, постороннихъ острыхъ, колючихъ, угловатыхъ тѣль, а иногда и самое покушеніе извлечь попавшія въ горло таковыя тѣла. Кроме того, болѣзнь сія произраждается не рѣдко въ слѣдствіе злоупотребленія ртути, юдини, опія и проч., также въ слѣдствіе отступленія ревматизма, накожныхъ сыпей, особенно скарлатина и красухи. Весьма часто она сопровождаетъ водобоязнь, иногда столбнякъ, желтую американскую горячку, оспу, перепончатую жабу зѣва и проч.

§ 433.

Предсказаніе зависитъ преимущественно отъ свойства причинъ и удобнаго или труднаго уклоненія ихъ. Воспаленіе сіе, развивающееся само по себѣ, не очень опасно; если же оно происходитъ отъ попавшихъ въ горло постороннихъ тѣль, которыя раздѣляя остротою своею оболочки горла, проникаютъ въ полость груди, то часто смерть бываетъ неизбѣжнымъ послѣдствіемъ. Здѣсь необходимо нужно прободеніе горла, составляюще очень трудную и рѣдко удачную операцию.

§ 434.

Леченіе а) *По пригнаннымъ показаніямъ* должно удалить раздражающія дѣйствія всѣхъ болѣзнетворныхъ вліяній на пищепріемное горло, въ особенности стараваться поскорѣе извлечь попавшія въ оное постороннія тѣла, что производится, смотря по удобности, либо извлечениемъ ихъ приличными орудіями чрезъ ротъ, либо

погружениемъ въ самый желудокъ, либо прободенiemъ горла (*œsophagotomia*) по правиламъ Хирургіи. Отступленіе ревматизма или сыпей требуетъ возстановленія ихъ на первобытномъ мѣстѣ посредствомъ отвлечений и противураздраженій.

б.) *По существеннымъ показаніямъ* назначается обыкновенно противувоспалительный способъ, соразмѣрный степени воспаленія и его періодамъ. Въ легкихъ случаяхъ достаточно одно употребленіе смягчающихъ, слизистыхъ, эмульсивныхъ напитковъ съ избѣжаніемъ всякой другой пищи, съ соблюденіемъ спокойствія и молчанія, также съ употребленіемъ смягчающихъ припарокъ около шеи, теплыхъ, долгое время продолжаемыхъ общихъ ваннъ, горчичныхъ ножныхъ ваннъ и лѣкарствъ, отводящихъ на кишечный каналъ. Въ усиленной степени болѣзни съ означеными средствами можно предписывать пьявки, припускаемыя по бокамъ шеи, наиболѣе въ томъ мѣстѣ, где ощущается сильнѣйшая боль и повторяемыя, смотря по востребованію. Если же воспаленіе очень сильное, сопровождается значительнымъ огневичнымъ возбужденіемъ, то у взрослыхъ и полнокровныхъ особъ назначаются въ самомъ началѣ одно или два общихъ кровопусканій, либо вскрытие подъязычныхъ венъ (*Jonson*). Въ дальнѣйшемъ теченіи воспаленія, либо когда оно восприметъ хроническую форму, большую пользу доставляютъ мѣстныя кровоотвлеченія, повторительные пріемы слабительныхъ, прикладываніе парывныхъ средствъ по прохожденію пищепріемнаго горла, паровая ванна; а въ случаѣ упорности и самая мокса.

с.) *По припадочнымъ показаніямъ* надлежить умѣрять жажду и судорожное сжатіе горла. Жажда лучше всего утоляется держаніемъ во рту лимонныхъ кружковъ, посыпанныхъ сахаромъ, или теплой воды смѣшанной съ лимоннымъ сокомъ; а судорожное сжатіе уступаетъ иногда втираниемъ на шеѣ болеутолительныхъ мазей (N. 49.) и прикладываніемъ успокаивающихъ припарокъ (N. 48.). Если проглатываніе, по причинѣ усилившагося до чрезмѣрности воспаленія, совершенно не возможно, то припадку сему надобно противудѣйствовать наружными пособіями (§. 429).

Воспаленіе желудка.

(*Gastritis.*)

Syn. Inflammatio ventriculi; phlegmone ventriculi; dolor ventriculi; cardialgia inflammatoria; causus.

§ 435.

Воспаленіе желудка часто обнаруживается явственными *припадками*, а иногда бываетъ такъ скрыто, что о присудствіи его можно заключать только изъ нѣкоторыхъ невѣрныхъ признаковъ, или даже изъ однихъ обстоятельствъ, благопріятствующихъ развитію его.

§ 436.

1.) *Пъственное воспаление желудка* (*gastritis manifesta*) сопровождается весьма сильною напрягающею, рѣжущею и колющею болью въ предсердіи, которая часто сопряжена бываетъ съ чувствомъ жженія и величайшею тоскою и по временамъ смѣшивается съ жестокою скручивающею болью, зависящею отъ желудочныхъ спазмъ. Перваго рода боль,—собственно воспалительная, бываетъ непрерывная, только въ нѣкоторыя минуты замѣщается въ меншой степени, но отъ малѣйшаго прикосновенія къ грудной ложбинкѣ, отъ кашля, чиханія и проч. также отъ входящихъ въ желудокъ веществъ, тотчасъ ожесточается. Желудочная сторона дѣлается при семъ жаркою и напряженною. Больной страждеть сильною рвотою, возбуждаемою малѣйшимъ принятіемъ внутрь самыхъ изѣжныхъ веществъ, при чемъ извергается сперва содержащаяся въ желудкѣ пища и желудочный сокъ, потомъ травянистая желчь, а наконецъ даже кровянистая жидкость. Языкъ представляется болѣею частію краснымъ, особенно въ верхушкѣ, а иногда сильно обложеніемъ; испражненіи низа обыкновенно задерживается; моча также скучна, или во все не испражняется и въ нѣкоторыхъ случаяхъ появляются слѣды желтухи. Огневичное возбужденіе въ самомъ началѣ бываетъ довольно сильное; но послѣ выражается не очень явственно: жаръ существуетъ болѣе во внутреннихъ органахъ; жилобіеніе ощущается болѣею частію малое, сжатое, не рѣдко даже перемежающееся. Въ сильной степени болѣзни оказывается головная боль, бредъ, икота, за-

труднительное дыханіе, судороги въ глоткѣ, совершиенное охладѣніе верхнихъ и нижнихъ конечностей, обмороки; вообще чрезвычайный упадокъ силъ и всѣ явленія ложной слабости, зависящей отъ пораженія столь важнаго органа, какъ желудокъ.

2.) Явленія скрытнаго воспаленія желудка (*gastritis occulta*), при коемъ поражаются вѣроятно вѣкоторыя только мѣста желудка, суть преимущественно: ослабленное пищевареніе, отвращеніе къ сильно питательнымъ веществамъ, па пр. къ крѣпкимъ мяснымъ бульонамъ; рвота послѣ употребленія таковыхъ веществъ, желудочный судороги, сильное обложение языка слизью и краснота въ верхушкѣ онаго, равно какъ и краснота зѣва (*Broussais*), молочница во рту, часто возвращающаяся желчная рвота, общее ослабленіе тѣла, головная боль, скоро умножающееся всеобщее изнуреніе тѣла. (*Chardel*) и пр.

§ 437.

Величайшая разность въ обнаруживаніи сего воспаленія зависитъ преимущественно отъ пораженія имъ различныхъ оболочекъ желудка. Отсюда происходятъ три главныхъ формъ страдавія:

1) *Gastritis mucosa* обрѣгается собственно въ слизистой оболочки желудка, обнаруживается чаще въ хронической, нежели въ острой формѣ, распространяется иногда на всю слизистую оболочку, а иногда только на вѣкоторыя мѣста опой и выражается либо ощущеніемъ тупаго давленія, какъ бы отъ камня въ желудкѣ, либо собственнаго рода сжениемъ, распространяющимся въ са-

мое пищепріемное горло и переходящимъ иногда въ довольно сильную, коликѣ подобную боль, которая отъ давленія умножается и бываетъ постоянна, но не періодическая, какъ *in cardialgia*.

2) *Gastritis nervosa s. venenata* произраждается отъ распространенія воспаленія изъ слизистой на мышечно-нервную оболочку желудка, отличается быстрымъ развитіемъ и прохожденіемъ, жестокою жгучею болью въ желудочной сторонѣ, дѣлающею только очень малыя послабленія, сильнымъ сочувственнымъ пораженіемъ центральныхъ частей нервной системы: головокружениемъ, давящею болью во лбу, оглушеніемъ и бредомъ.

3) *Gastritis serosa* обрѣтается преимущественно въ се-
зонѣ, брюшинномъ покровѣ желудка, встрѣчается гораздо рѣже обѣихъ предыдущихъ формъ, удерживаетъ всегда острое свойство, отличается наиболѣе усилен-
нымъ огневичнымъ возбужденіемъ и выражается чрез-
мѣрнымъ напряженіемъ желудочной стороны съ столь
сильною чувствительностію, что больной не можетъ пе-
реносить не только давленія рукою, но даже самаго лег-
каго покрывала.

Другая разность явлений сего воспаленія основывается на обширности и мѣстопребываніи его. Воспаленіе, занимающее входъ желудка (*cardia*) и малую кривизну гораздо сильнѣе бываетъ, нежели обрѣтающееся въ исходѣ его (*pylorus*) и въ большой кривизнѣ. Въ особенностяхъ рвота и боль въ первомъ случаѣ оказывается въ гораздо большей степени, нежели во второмъ.

§ 438.

Продолжение сей болѣзни не одинаково; иногда *течение* оной бываетъ столь быстро (напр. при отправлѣніяхъ острыми ядами), что смерть послѣдуетъ по прошествіи нѣсколькихъ часовъ; въ иѣкоторыхъ же случаяхъ воспаленіе длится очень долго, такъ что по справедливости можетъ быть названо *хроническимъ*. Таковое состояніе либо происходитъ послѣ не разрѣшившагося остраго воспаленія, либо развивается въ первообразной, болѣе или менѣе скрытной формѣ, чаще всего у людей средняго возраста, употребляющихъ очень раздражительную пищу и спиртные напитки.

Исходы суть: а.) *разрѣшеніе*, наступающее обыкновенно мало по малу безъ переломовъ, а иногда и при обыкновенныхъ критическихъ явленіяхъ, рѣшающихъ болѣзнь въ 7 или 9 дней. б.) *излѣченіе и напоеніе* въ желудкѣ послѣ воспаленія случается гораздо рѣже, нежели въ кишечномъ каналѣ и сопровождается продолжительнымъ разстройствомъ пищеваренія и общимъ изнуреніемъ тѣла (*phthisis stomachica*), сопряженнымъ со рвотою, при коей испражняется гноиная матерія и кровь, а иногда бываютъ и гноинныя испражненія низа. с.) *размлгченіе* желудка (*gastromalacia*), повидимому, также бываетъ исходомъ воспаленія его. д.) *Отверденіе*, вообще скирръ, который переходитъ потомъ въ ракъ, развивается всегда при явленіяхъ медленнаго воспаленія желудка. е.) *Антоновъ огонь* случается только въ острыхъ воспаленіяхъ желудка, наппаче въ тѣхъ,

кои причиняются ядами, выражаясь свойственными всегда таковому исходу явлениями к. т. мгновеннымъ послаблениемъ боли и мнимымъ улучшениемъ больного на нѣсколько минутъ при быстромъ спаденіи жилобіенія, очень скромъ ослабленіи силъ, уменьшении температуры тѣла, смертоподобномъ измѣненіи въ лицѣ (*facies hypocratica*), съ коими вскорѣ наступаетъ бредъ, обмороки или корчи, холода въ членахъ, klejkiй потъ, свинцовые или черные пятна на кожѣ, исчезаніе жилобіенія, искривленные отъ судорогъ глаза и прекращеніе жизни.

Смерть въ остромъ воспаленіи желудка приключается преимущественно отъ антонова огня или отъ столбника, а въ продолжительномъ отъ перехода въ отвердѣніе, причиняющее въ послѣдствіи сильное изнуреніе тѣла, или отъ сильной кровавой рвоты.

§ 439.

Результаты ескрытия мертвыхъ тѣлъ. Трудно определить, которое изъ многоразличныхъ измѣнений слизистой оболочки желудка составляетъ признакъ обрѣтающагося воспаленія. Вообще однакожъ тѣмъ вѣраѣ можно заключать здѣсь о воспаленіи, чѣмъ явственнѣе представляются волосные сосудцы налитыми артериальною кровью и чѣмъ болѣе притомъ обрѣтается органическихъ измѣнений въ составѣ желудочныхъ оболочекъ, к. т. отолщеніе, изъязвленіе и покрытие внутренней и наружной поверхности желудка створоженою или гноеобразною пасокою. Чаще всего болѣзненныя состоя-

ніл сії оказываються въ слизистой оболочкѣ желудка и при скрытномъ воспаленіи. Въ серозной оболочкѣ желудка замѣчаются они только при явственному остромъ воспаленіи. Язвы, находимыя въ желудкѣ, бываютъ по *Abercrombie* иногда пебольшія, ограниченныя, съ явственною потерю существа и округлыми краями, величиною отъ полуразрѣзанной горошины до двухкопѣчной монеты, иногда таковой же объятности язвы, но сопряженныя съ отолстѣніемъ и отвердѣніемъ желудочныхъ оболочекъ, а иногда неправильныя, обширныя изъязвленія внутренней поверхности желудка, которыя обыкновенно сопряжены бываютъ съ грибовидными наращеніями. Отвердѣніе представляетъ либо узловатыя выпуклости на внутренней поверхности желудка, при чемъ иногда часть таковой опухоли кажется мягкимъ, какъ бы мозгообразнымъ веществомъ (*encephaloïdes*), либо оно состоитъ изъ ровной опухоли, распространенной нерѣдко на большую часть желудка и имѣющей различную плотность и устройство, иногда жиру подобной, иногда представляющей свойство скирра и рака, а местами даже хрящеобразной. Послѣ жестокаго острого воспаленія желудка находмы были сѣрыя и чорныя антоновоогненные струпья, занимающіе всю толщину слизистой оболочки и просвѣщающіе нерѣдко на наружной оболочкѣ темновioletовыми пятнами.

§ 440.

Причины сего воспаленія суть: принятіе внутрь острыхъ ядовъ к. т. мышьяка, сулемы, крѣпкихъ минераль-

ныхъ кислотъ, испанскихъ мушекъ и т. п., поглощеніе очень горячихъ веществъ, либо льда и льда-холодной воды при разгоряченномъ тѣлѣ, чрезмѣрное употребленіе водки, острыхъправостей, слишкомъ крѣпкой горчицы и пр., злоупотребленіе рвотныхъ, особенно изъ эметина и драстическихъ слабительныхъ, поглощеніе мѣлкаго стекла, рыбныхъ костей, иголъ. Сюда относятся также чрезмѣрио острый желудочный сокъ, испорченная желчь, раздраженіе отъ глистъ, душевныя возмущенія, наипаче досада, насильственное прекращеніе поты, отступившія накожныя сыпи, составоломъ, геморрой, сочувственное раздраженіе при поврежденіяхъ головы, равно какъ и при обширныхъ опаленіяхъ, распространеніе воспаленія съственныхъ частей на желудокъ, ударъ по желудочной сторонѣ, вогнутіе внутрь мечеобразнаго отростка грудной кости чрезъ крѣпкое шнурованіе и проч.

§ 441.

Предсказаніе. Болѣзнь сія во всякомъ случаѣ очень опасна. Въ остромъ состояніи она напосить въ короткое время смерть, а въ хроническомъ причиняетъ неизлѣчимыя послѣдствія страданія. Воспаленіе слизистой оболочки менѣе опасно, нежели серознаго покрова; а воспаленіе мышечно-первой оболочки почти всегда смертельно. Большая или меньшая опасность зависитъ также частію отъ причинъ, а частію отъ припадковъ болѣзни. Въ первомъ отношеніи самое дурное предсказаніе можетъ быть при отравленіи острыми ядами, при мгновенной простудѣ желудка, переносахъ и злокачест-

венныхъ горячкахъ; а въ послѣднемъ при появленіи обмороковъ, корчей, совершеннаго охлажденія конечностей, смертоподобнаго измѣненія лица, мгновеннаго прекращенія болей послѣ жестокаго обнаруживанія ихъ и проч.

§ 442.

Леченіе. а.) По причиннымъ показаніямъ. Если причиною воспаленія острые яды, то нужно стараться, пока еще воспаленіе совершиенно не развилось, испразнить ихъ рвотнымъ. Буде же чувствительность желудка подаетъ уже некоторое сумнѣніе противъ употребленія рвотнаго, то предписываются оболакивающія, слизистыя, масляныя вещества (N 5. 35. 72); а скопляющаяся кровь отвлекается посредствомъ кровососной банки, прикладываемой къ грудной ложечкѣ. При отравленіи мѣлкимъ стекломъ должно проглотить достаточное количество мышища бѣлаго хлѣба или каши и вслѣдъ за тѣмъ принять рвотное. Если воспаленіе уже образовалось, то рвотное не должно быть предписываемо, но въ сіе время надлежитъ стараться содержимая въ желудкѣ вещества содѣлать безвредными чрезъ разведеніе ихъ оболакивающими, либо неутрализованіе всасывающими, противуядными средствами, какъ напр. при отравленіи мышьякомъ,— растворомъ бѣлаго мыла, при отравленіи сульмою,-личинными бѣлками, разведенными въ сахарной водѣ; при отравленіи крѣпкими кислотами,-углекислою магнезіею и проч. и проч. Однакожъ всѣ вообще лѣкарства, кои производятъ хотя малѣйшее раздраженіе слизистой обо-

лочки желудка, должны быть вслически избѣгаемы. Это относится къ самой даже селитрѣ и всемъ среднимъ соламъ, употребляемымъ обыкновенно въ воспаленіяхъ.

б.) *По существеннымъ показаніямъ.* Острое, явственное воспаленіе желудка требуетъ обильныхъ кровопусканій изъ руки, отъ коихъ отнюдь не должно отводить обнаруживаніе холода въ конечностяхъ, малое, сжатое жилобеніе и крайнее (минимое) ослабленіе силъ. Послѣ общихъ кровопусканій приставляется значительное число пьявокъ къ желудочной сторонѣ; а при особыхъ показаніяхъ и къ самому проходу. Внутреннія лѣкарства часто вовсе не переносятся, возбуждая всегда рвоту; наиболѣе приличны для сего хорошо приготовленныя масляныя микстуры и слизистые напитки (N 5. 35. 72) въ малыхъ, учащенныхъ приемахъ, теплое молоко и проч. При чрезмѣрныхъ боляхъ въ желудкѣ, продолжающихся долго и непрерывно, некоторые одобряютъ употребленіе внутрь маленькихъ кусочковъ застуженного (свѣжаго сливочнаго коровьяго) масла (*). Час-

(*) Англійскіе врачи (*Stokes, M. Good, Abercrombie*) рекомендуютъ наиболѣе пьявки, приставляемыя къ ложечкѣ въ значительномъ числѣ и повторяемыя до явственнаго облегченія болѣзни, также промывательныя, но отнюдь не слабительныя; напитки холодные, к. льдяно холодная вода, лимонадъ и пр., а при чрезмѣрной боли и тошнотѣ нѣсколько приемовъ микстуры, состоящей изъ 1 драхмы *suguri paraveris albi* и пяти гранъ селитры, растворенной въ эмульсіи аравійской камеди или спермацета. По прошествіи одного или двухъ дней можно давать услащенную хлористую ртуть черезъ часъ по 1-му грану съ опіемъ или безъ онаго.

сто доставляютъ большую пользу оболакивающія и успокаивающія промывательныя (N 57). Снаружи кромѣ пьявокъ предписываются примочки на желудочной сторонѣ изъ отвара болиголова, белены и другихъ смягчающихъ и наркотическихъ средствъ, теплые ванны, прикладываніе на холстинкѣ успокаивающихъ мазей (N 49) или пластырей и пр. Отвлекающія къ толстымъ кишкамъ посредствомъ слабящихъ промывательныхъ и противураздражающія средства на кожѣ оказываютъ хорошую услугу наиболѣе при медленномъ воспаленіи. Здѣсь можно испытывать и внутреннее употребленіе услащеній хлористой ртути, даваемой отъ 1-го до 2-хъ гранъ съ сахаромъ до послабленія на низъ. Въ некоторыхъ случаяхъ доставляла пользу и сипильная кислота (N 5. 57). Отлично дѣйствующимъ средствомъ найдено также въ хроническомъ воспаленіи желудка сѣрнокислое жельзо, даваемое отъ двухъ до трехъ гранъ на пріемъ три раза въ день (*Abergrombie*).

с.) *По припадочнымъ показаніямъ.* Для умѣренія рвоты часто не остается ничего дѣлать, какъ удерживаться отъ употребленія всѣхъ внутреннихъ средствъ, даже отъ пищи и напитковъ. Впрочемъ послѣ предшествовавшихъ кровоиспражненій и значительного умѣренія воспаленія можно испытывать кодеинъ, лактукарій, лавровишиневую воду (N 5.) и другія легкія успокаивающія вмѣстѣ съ слизистыми лѣкарствами, кои могутъ также служить и для умѣренія **жестокихъ болей**.

Во время *выздоровленія* должно всячески избѣгать всѣхъ крѣпкихъ лѣкарствъ, раздражающей трудноваримой пищи, вина и спиртныхъ напитковъ, а употреблять самую

легкую пищу и невинные напитки, обращая внимание на ихъ температуру.

Тоже самое нужно соблюдать при *нагноеніи, отвердѣніи и изъязвленіи* желудка. Изъ лѣкарствъ здѣсь хорошее пособіе доставляетъ зельтерская вода съ молокомъ и осторожное употребленіе мирры (N 71.) съ слизистыми и разрѣшающими средствами, а при открывшейся кровавой рвотѣ кампешевое дерево, *tinctura martis tartarisata* (N 66. 67.) и проч. (см. ч. 1. стр. 105). При переходѣ въ антоновъ огонь (§ 437.) всякое покушеніе возвратить жизнь больному тщетно.

Воспаленіе кишечка.

(*Enteritis*).

27.

Syn. Inflammatio intestinorum, enteralgia inflammatoria, enterophlogia, febris intestinalis inflammatoria.

§ 443.

Воспаленіе сіе можетъ имѣть мѣстопребываніе какъ въ тонкихъ, такъ и въ толстыхъ кишкахъ, занимать небольшое, либо довольно значительное пространство въ оныхъ и находится либо въ одной внутренней слизистой оболочкѣ, либо въ первомышечной, либо во вѣнчанемъ серозномъ покровѣ, либо наконецъ во всѣхъ ихъ вмѣстѣ. Отсюда-то происходятъ большія разности въ

обнаруживаниі его, такъ что оно, подобно воспаленію желудка, представляется то явственнымъ, то скрытымъ, то острымъ и сильнымъ, то медленнымъ и слабымъ.

I.) Въ явственномъ или остромъ воспаленіи кишечкѣ (*enteritis acuta, manifesta; enter. serosa Schönl.*) больной поражается сильными колющими, рѣзющими и жгучими болами въ брюхѣ, которые продолжаются безпрерывно, однакожъ по временамъ переходятъ еще въ сильнѣйшія, коликѣ подобныя боли, часто вначалѣ занимаютъ только небольшое мѣсто, но вскорѣ распространяются на значительную часть брюха и умножаются отъ давленія, даже отъ малѣйшаго прикосновенія къ брюху перстами, также отъ глубокаго вдыханія, кашля, чиханія и проч. Брюхо при семъ бываетъ жаркое, напряженное, раздутое, какъ при воздушномъ надменіи живота (*tympanitis*), испражненія низа упорно задерживаются, больной страждеть отрыжкою и частою рвотою съ изверженіемъ зеленої желчи, а иногда и самаго кала; языкъ дѣлается сухимъ, въ верхушкѣ краснымъ и покрытымъ также полосками слизи; больной мучится сильною жаждою, моча задерживается или вытекаетъ скудно и бываетъ пламенная. Къ сему присоединяется, большею частію въ самомъ началѣ, огневица съ весьма частымъ, скорымъ, напряженнымъ, сжатымъ и не рѣдко перемежающимся жилобіеніемъ, а при усилившейся болѣзни оказывается даже бредъ съ дикимъ взглядомъ больнаго, икота, судороги въ личныхъ мышицахъ и силья корчи, напиache у дѣтей. Въ некоторыхъ случаяхъ замѣчать былъ и параличъ въ нижнихъ конечностяхъ.

II.) *Скрытое, медленное воспаление кишечка* (*enteritis occulta*, ent. *mucosa Schönl.*) находится нерѣдко при хроническихъ коликахъ, часто возвращающейся рвотѣ, ослизеніи кишечного канала, продолжительныхъ, простыхъ и патужныхъ поносахъ, также въ соединеніи съ изъязвленіями кишечка, въ послѣднемъ періодѣ чахотки и преимущественно въ первыхъ и гнилыхъ или тифозныхъ горячкахъ. Во всѣхъ сихъ болѣзпенныхъ формахъ о воспаленіи кишечка можно заключать съ нѣкоторою вѣроятностію, если при дотрогиваніи къ животу обнаруживаются въ какомъ либо мѣстѣ чувствованія боли, языкъ бываетъ сухой и красный, въ огневицѣ и другихъ сочувственныхъ принадкахъ примѣтно выражается характеръ парочитаго раздраженія, въ особенности въ жилобіеніи, которое оказывается очень скорымъ. Вмѣстѣ съ симъ здѣсь существуютъ обыкновенно явленія, изъ коихъ можно предполагать присудствіе изъязвленія кишечка. Сюда относится напаче поносъ, коимъ обыкновенно 4—8—12 разъ въ день испражняются желтоватыя, перемѣшанныя съ белыми кусками массы, также болѣе или менѣе значительное изпуреніе тѣла, рѣдко кровотеченія изъ прохода, а еще рѣже, проѣденіе серознаго покрова кишечка и выхожденіе содержимаго въ нихъ въ полость брюха, какой случай оканчивается обыкновенно смертію при первыхъ явленіяхъ.

§ 444.

Продолженіе воспаленія кишечка въ большей части случаевъ бываетъ очень кратковременно и оканчивается

благополучно или неблагополучно между 5 и 7 днемъ. Въ хроническомъ состояніи, при которомъ воспаленіе ограничивается только малыми мѣстами, преимущественно въ слизистой оболочкѣ, да и форма болѣзни представляется не столько воспаленіемъ, какъ продолжительной коликою, поносами и проч., страданіе сie часто распространяется на вѣсколько недѣль и мѣсяцовъ.

§ 445.

Исходы воспаленія кишекъ суть: а.) *разрѣшеніе*, которое слѣдуетъ при постепенномъ послабленіи болей, критическихъ испражненіяхъ пота и мочи, также при умноженномъ испражненіи кишекъ, смѣшанномъ иногда съ кровянистою и гноеобразною матеріею. б.) *Выпоть* *серозной*, или *пластической пасоки*, какъ въ полость кишечного канала, такъ и на виѣшию поверхность онаго. При серозномъ выпотѣніи рождаются припадки острой водяной болѣзни брюха, а при пластическомъ перепончатыя трубкообразныя складки внутри кишекъ, либо сращенія кишекъ съ брюшною, сальникомъ и проч., коихъ слѣдствіемъ бываютъ упорные запоры и колики. с.) *Нагноеніе и изъязвленіе*. Нарывы образуются рѣдко въ самихъ оболочкахъ кишечного канала, а чаще въ брыжейкѣ и ея желѣзахъ, на которыхъ распространяется воспаленіе. Если такой нарывъ вскрывается въ полость кишечного канала, то гной испражняется низомъ; а если въ брюшную полость, то оказывается новое воспаленіе, всегда почти имѣющее смер-

тельный исходъ. Изъявленіе въ кишечномъ каналѣ встрѣчается гораздо чаще нарывовъ. О присудствіи его можно заключать, если воспалительное страданіе кишечка переходитъ въ продолжительные поносы, трудно останавливаляемые и наводящіе изнуреніе. d.) *Отвердліе* развивается мало по малу, большою частію при скрытномъ воспаленіи и представляетъ припадки, сопровождающіе обыкновенно скирръ кишечка. e.) При наступленіи *антонова огня* часто вдругъ послабляютъ боли, такъ что больные почитаютъ себя спасенными и дѣлаются даже веселѣ; несмотря на это жилобіеніе упадаетъ, конечности дѣлаются холодными, испражненія низа совершаются иногда непроизвольно, черты лица измѣняются и наступаютъ припадки, предшествующіе смерти. Только въ весьма рѣдкихъ случаяхъ, при ущемленійной грыжѣ, или завитіи кишечка (*volvulus*), пораженная антоновымъ огнемъ часть отдѣляется и выходитъ чрезъ наружное отверстіе или низомъ, а произшедшая потеря существа возстановляется и такимъ образомъ слѣдуетъ выздоровленіе.

Смерть приключается при семъ воспаленіи либо отъ изнеможенія силъ, въ слѣдствіе трудныхъ припадковъ, либо отъ антонова агнія, либо отъ нагноенія и чахотнаго изнуренія.

§ 446.

Результаты вскрытия тѣлъ. Въ тѣлахъ, умершихъ отъ воспаленія, находятъ обыкновенно почти тѣ же самые измѣненія, какъ и при воспаленіи желудка.

Въ полости кишечнаго канала попадаются нерѣдко вышевозначенные ложныя перепонки, а виѣшия поверхность его покрывается часто студениобразною пасокою. Кишкѣ въ пораженныхъ антоновыемъ огнемъ мѣстахъ, а иногда и безъ того разрывается и содержимое въ ней изливается въ брюшную полость.

Весьма часто встрѣчаются также язвы, раздѣляемыя Billardомъ на 1.) *угреватыи*, при коихъ обрѣтаются вмѣстѣ съ язвами красные, твердоватые, угрямъ подобные воспалительные узелки въ слизистой оболочкѣ кишекъ и составляющіе ничто иное, какъ воспаленіе Пейеровыхъ желѣзъ; 2.) *бугорковатыи*, состоящія изъ узловъ, подобныхъ смягченнымъ легочнымъ бугоркамъ, которые, размѣгчаясь отъ гноя, вскрываются и оставляютъ по себѣ язвы; 3.) *какъ бы вырѣзныи язвы*, произходящія вѣроятно отъ ограниченаго размѣгченія въ которыхъ мѣстъ слизистой оболочки; 4.) *поверхностныи изъязвленіи или ссадины* (excoriationes); 5.) *антоновоогненныи изъязвленіи*, образующіяся по отпаденіи антоновоогненнаго струпа; 6.) *ракообразныи*, представляющія известное свойство скиррозныхъ перерождений.

§ 447.

Частиція *причины* воспаленія кишекъ суть: простуда брюха и упорный запоръ на низъ, причиняемый наипаче ущемленію грыжею и завитіемъ или перепутываніемъ кишекъ. Сверхъ сего, оно можетъ произходить также отъ наибольшей части причинъ, подаю-

щихъ поводъ къ воспаленію желудка к. т. отъ поглощенныхъ ядовъ и острокопечныхъ тѣлъ, злоупотребленія драстическихъ лѣкарствъ, отъ внезапнаго прекращенія геморроидальнаго кровотеченія, отступившихъ на кожныхъ сыпей и проч.

Происходеніе скрытныхъ воспаленій слизистой оболочки и кишечныхъ изъязвленій можетъ быть: 1.) отъ вредныхъ веществъ, попавшихъ въ кишечный каналъ, кои, будучи приведены въ непосредственное прикосновеніе съ оболочками кишекъ, подвергаются имъ воспаленію и изъязвленію; 2.) отъ сочутственнаго и анатагонистическаго болѣзненнаго возбужденія, какъ случается въ легочной чахоткѣ, тифѣ, огневичныхъ сыпяхъ, особенно оспѣ и пр. 2.) отъ пороковъ крови и отложенія на кишечный каналъ веществъ изъ путей кровообращенія, какъ бываетъ въ худосочіяхъ, сопряженыхъ съ хроническими сыпями и язвами на тѣлѣ.

§ 448.

Предсказаніе. Воспаленіе кишекъ есть всегда опасная болѣзнь, которая либо скоро переходитъ въ антиповъ огонь, либо подаетъ поводъ къ отвердѣнію, нагпоненію, изъязвленію и проч. Однакожъ нельзя сказать, чтобы искусство не оказывало укротительного вліянія на оное. При остромъ явственномъ воспаленіи кишекъ очень благопріятнымъ признакомъ служитъ выхожденіе вѣтровъ и появленіе испражненій низа; неблагопріятные же припадки суть: упорный запоръ и рвота, кою испражняется даже калъ; икота, совершенное охлажденіе

віе копохностей, разительное измѣненіе въ чертахъ лица, перемѣжающееся жилобеніе, молочница во рту, черныя пятна на кожѣ и проч.

Въ скрытныхъ воспаленіяхъ и изъязвленіяхъ предсказаніе должно быть сообразяемо съ общимъ состояніемъ болѣзни. Воспаленія сего рода сами по себѣ представляютъ не очень значительныя страданія, но изъязвленія почитаются гораздо важнѣйшиими, ибо случающіяся при нихъ кровоизліянія изъ разъѣденныхъ сосудовъ и поносы часто очень скоро наводятъ опасное изнуреніе силъ.

§ 449.

Леченіе. а.) По пригнаннымъ показаніямъ. Въ явственномъ воспаленіи предстоитъ всегда очень важное показаніе уничтожить запоръ на пизъ. Это производится отчасти уже самимъ умѣреніемъ воспаленія и судорожнаго напряженія, наипаче если запоръ произошелъ въ слѣдствіе одного воспаленія; но когда онъ бываетъ причиной самого воспаленія, то для уничтоженія его употребляются особенные средства. Къ сему служать повторительно дѣляемыя, пѣжныя промывательныя (N. 37), особенно съ прибавленіемъ касторового масла, усаженная хлористая ртуть въ слабительныхъ приемахъ, клещевинное (касторовое) масло, mixtura oleosoacida Ph. univers., миндалевое масло въ смѣшаніи съ лимоннымъ сокомъ (N. 35.) и пр. Въ сихъ случаяхъ всегда должно изслѣдоватъ также, не находится ли ущемленная грыжа и если находится, то операциія грыжесѣченія должна

быть предпринимаема заблаговременно безъ всякаго замедленія. При отравленіяхъ должно поступать такъ, какъ сказано при воспаленіи желудка (§ 441).

b.) *По существеннымъ показаніямъ.* Общія и местныя кровопусканія составляютъ здѣсь главныя средства, которыя, не смотря на малость жилобенія и минимое ослабленіе силь, не рѣдко должны быть повторяемы нѣсколько разъ. Кроме сего предписываются внутрь оболакивающія лѣкарства к. т. масляныя микстуры (N. 5. 45.), эмульсіи изъ маковыхъ сѣмянъ, разжиженное миндалевое молоко, принимаемое тепловатымъ и другія слизистыя средства (N 72.). Среднія соли, такъ какъ и въ воспаленіи желудка, здѣсь не приличны. Послѣ надлежащихъ кровопусканій превосходное дѣйствіе оказываютъ иногда, особенно при жестокихъ боляхъ, чистая наркотическая лѣкарства к. т. синеродистая кислота (N. 36.), лаврововишневая вода (N 35.), кодеикъ (N. 2.), вытяжка бѣлены и пр. Снаружи употребляются смягчающія и успокаивающія примочки изъ отвара болиголова, просвирняка, маковыхъ головокъ и т. п.; прикладываются тряпки, обмакиваемыя въ теплое масло, дѣлаются теплые ванны, промывательные изъ одной теплой воды въ большомъ количествѣ (*M. Good*), теплое окутываніе тѣла для споспѣществованія накожному испаренію, втираніе на брюхѣ сѣрой ртутной мази, отведенія и противураздраженія, наипаче при переносномъ свойствѣ болѣзни, производимыя сперва на нижнихъ копечностяхъ, а послѣ и на самомъ брюхѣ, посредствомъ горчичниковъ, нарывныхъ пластырей и проч.

Въ скрытномъ воспаленіи кишечка могутъ быть употребляемы тѣ же самыя средства, только въ слабѣйшей мѣрѣ к. т. кровоисправленія посредствомъ повтореннаго приложенія пѣявокъ или кровососныхъ банокъ, внутрь оболакивающія лѣкарства, услажненная хлористая ртуть, если пѣть противупоказаній, втираніе сѣрої ртутной мази на брюхѣ, сверхъ того отводящія лѣкарства, особенно парывные пластыри, прикладываемые на самомъ брюхѣ. Больной долженъ при семъ кушать очень мало и притомъ самую нѣжную, нераздражающую пищу.

с.) *По припадочнымъ показаніямъ.* Изъ припадковъ сей болѣзни особеннаго вниманія заслуживаютъ а.) боли, умѣляемыя лучше всего чисто наркотическими средствами к. т. кодеиномъ, лавровишневою водою, экстрактомъ бѣлены и проч; б.) запоръ на низѣ, который должно всячески уничтожать смягчающими промывательными и самыми нѣжными слабительными изъ клещевинного масла или изъ сѣрнокислой магнезіи, даваемой въ эмульсіяхъ. с.) *Рвоту* можно укрощать опітными средствами либо углекислотою. Если окажется д.) *попоискъ*, то его не должно вдругъ пріостанавливать.

Противъ *нагноеній* и *изъязвлений* въ кишечномъ каналѣ назначается молочная діата, употребленіе внутрь молока съ зельтерскою или известковою водою, отвары слизистыхъ веществъ, напр. алтейнаго корня съ шафрановою настойкою опія, также крѣпительныя, особенно корень коломбы (N. 96, 97.), квассія съ известковою водою (N. 86.), солянокислое желѣзо, цинковый купоросъ, а спаружи, кроме прочихъ отводящихъ средствъ, парыв-

ной пластырь, прикладываемый на брюхѣ въ той сторонѣ, которая соответствуетъ Бавгиновой заслонкѣ. Бальзамические средства, какъ мицца (N. 71.), копайникъ въ промывательныхъ (92.), хотя и действуютъ иногда превосходно, но требуютъ большой осторожности. При лечении изъязвленій должно также иметь въ виду то, что совершенное уничтоженіе ихъ требуетъ значительного времени и следственno такихъ средствъ, кои наводятъ ослабленіе, надлежитъ избѣгать, особенно пьявокъ,ведененныхъ Французами въ столь обширное употребление, которые однажды, въ какомъ бы числѣ ни были допущены, никогда не могутъ высосать изъязвленія.

При отвердлыхъ въ кишечномъ каналѣ доставляютъ некоторую пользу измѣняющія средства: ртутныхъ и сюрманныхъ, а при антоновомъ огнѣ всякое покушеніе искусства остается въ тунѣ.

Во время выздоровленія надлежитъ поступать такъ, какъ и при воспаленіи желудка.

Воспаленіе яичниковъ.

(*Ovaritis.*)

Syn. Oophoritis, inflammatio ovarii, ovarioncus phlogisticus.

§ 450.

Явленія: тупая или колюща боль и чувство жара, ощущаемые болѣюю въ глубинѣ таза, соответствующей

сторони и ожесточаючіся при давленії; кругловатая, чувствительна опухоль, находимая при исследовании повыше паха, рѣдко съ обѣихъ сторонъ таза, по большему частію только на одной; вскорѣ самые пахи дѣлаются чувствительными и напряженными, въ поясницѣ оказывается чувство изнеможенія, отравленія матки разстраиваютъся: мѣсячное очищеніе, или послѣродовое теченіе уменшаются, либо вовсе прекращаются; появляются первые припадки, особенно истерическіе (*cephalaea hysterica, clavus hystericus*), даже корчи, бредъ и явленія болѣшества матки; испражненія низа и мочи бываютъ болѣе или менѣе трудныя, сопряженныя съ болѣміи; огневичные движения иногда умѣренныя, а иногда очень сильныя; при чѣмъ кожа дѣлается жаркою, а жилобѣщие частымъ, ускореннымъ; отъ сочувственнаго пораженія пищеварительного аппарата произраждается перѣдкотошнота и рвота.

Острое воспаленіе выражается наиболѣе огневичными и воспалительными явленіями; а медленное сопровождается болѣе нервными припадками, а особливо боязливостію и малодушіемъ, необыкновенною веселостію, либо задумчивостію и склонностію къ уединенію, большему частію также очень возвышенною фантазіею, чрезмѣрно возбужденнымъ похотливымъ стремлениемъ, неблагопристойными движеніями и пр.

Исходы. Болѣнь сія можетъ оканчиваться разрывомъ при наступленіи мѣсячнаго, или умноженіи послѣродового очищенія. *Нагноеніе* узнается изъ появленія озноба, смѣняющагося жаромъ, уклончивости жилобѣсія, уменія общихъ припадковъ и умноженія

чувства тяжести и бьющихся болей въ тазѣ. Нарывъ весьма рѣдко вскрывается въ полость брюшную (*Dupuytren*), гораздо чаще гной пробивается въ подвздошную сторону, къ мочевому пузырю и къ толстымъ кишкамъ, а иногда и къ маточному рукаву, и чрезъ оные выходитъ наружу. Въ пѣкоторыхъ случаяхъ оказываются признаки и самаго *антонова оеня*; но чаще всего встрѣчается переходъ въ хроническое состояніе, послѣ коего образуются перерожденія и водяная болѣзнь (*hydrops ovariorum*).

§ 451.

Распознаваніе сего воспаленія въ положительномъ отношеніи не всегда бываетъ удобно. По мѣсту, занимаемому имъ, весьма трудно отличать его отъ другихъ воспаленій, обрѣтающихся въ тазу, по сторонамъ матки. Къ счастію погрѣшность въ распознаваніи не имѣетъ вредныхъ послѣдствій, ибо лѣченіе всякаго изъ таковыхъ страданій почти одинаково. Сверхъ того очень рѣдко случается, чтобы воспаленіе одной какой либо части не распространялось на другія.

§ 452.

Причины, самыя обыкновенныя суть: очень трудные и продолжительные роды, распространеніе воспаленія матки или брюшины на яичники, ушибы и другія механическія вліянія, дѣйствующія на подвздошную сторону, задержаніе менструального или послѣродового очищенія; сверхъ того

психическія и соматическія раздраженія, дѣйствующія на дѣтородную систему: злоупотребленіе мѣсячегонныхъ острыхъ лѣкарствъ, цеумѣренность въ удовлетвореніи плотскаго побужденія и пр.

Предсказаніе зависитъ вообще отъ степени и распространенія воспаленія. Впрочемъ оно большею частію неблагопріятно, особенно если болѣзнь происходитъ отъ моральныхъ вліяній, если смежные органы воспринимаютъ въ пей участіе и если она сопряжена съ воспаленіемъ брюшины и маточнымъ бѣшенствомъ.

§ 453.

Леченіе назначается здѣсь противувоспалительное. Въ легкихъ случаяхъ приставляются кровососныя банки или значительное число пьявокъ къ пахамъ, проходу либо къ большими губамъ; дѣлаются теплые ванны, смягчающія промывательный (N. 57) и впрыскиванія, также теплые смягчающія припарки (N. 48.) на нижней части брюха съ предписаніемъ приличной антифлогистической діеты, спокойствія и употребленія внутрь смягчающихъ и эмульсивныхъ напитковъ (N. 5, 36, 72.). Въ высшей степени болѣзни можно предпринимать общее кровопусканіе и употреблять противувоспалительный соли (N. 62.). Хроническое состояніе воспаленія, кроме мѣстныхъ кровоиспражнений, требуетъ сильныхъ отвлекающихъ къ наружѣ, моксы, заволоки, втиранія ѹодовыхъ мазей, струистаго обливанія (douche) паховъ, особенно сѣрыми и сѣриощелочными водами, внутрь небольшихъ приемовъ услажненной хлористой ртути съ

камфорою и опиемъ, болиголова (N. 154), мыльнянки, сарсапарили, разрѣшающихъ соляныхъ и щелочныхъ водъ, ѹодинокислой ртути (*Schönlein*) ипр. При сильномъ первиомъ раздраженіи доставляютъ пользу промывательныя изъ дурнопахучника, наркотическія нераздражающія (N. 1—6) и первыя средства, особенно бобровая струя, маунъ (N. 8. 75. 76) ипр.

Воспаленіе мочеваго пузыря.

(*Urocytritis*).

Syn. Cystitis, kystitis, inflammatio vesicæ urinariæ.

§ 454.

Воспаленіе сіе бываетъ *остраго* и *хроническаго* рода, рѣдко распространяется на всю полость пузыря, но чаще занимаетъ дно его, заднюю либо переднюю стѣну, особенно около шейки. Оно представляетъ иногда самостоятельную болѣзнь, но чаще бываетъ послѣдственнымъ страданіемъ, происходящимъ отъ пораженіясосѣдственныхъ органовъ и, произражалась первоначально въ слизистой оболочки, можетъ распространяться въ послѣдствіи на мышечную и на весь перепончатый составъ пузыря.

§ 455.

А.) Острое воспаление мочеваго пузыря обнаруживается постоянною, жгучею, колющею болью въ стороныѣ пузыря, распространяющеюся также на лички, мочевой каналъ, промежность, ляшки и крестецъ. Въ тоже время отправлениe сей внутренности нарушается. Больной имѣеть обыкновенно весьма сильное и частое попужденіе къ мочеиспусканию, но при всемъ его напраженіи къ тому мочи выходить только нѣсколько капель. Часто испражненіе оной совершенно прекращается. Вытекающая при семъ моча имѣеть пламенно красный видъ и дѣлаетъ осадокъ различного свойства. Въ стороныѣ пузыря, по приложениi руки, ощущается умноженное развитіе теплоты и нѣкоторая припухлость, особенно если при семъ существуетъ задержаніе мочи. Къ симъ припадкамъ присоединяются и другія сочувственныя явленія к. т. мучительныя ощущенія въ личкахъ и сѣменномъ канатикѣ, болѣзненныя напряженія уда, тягостное давленіе на прямую кишку, большая тоска, тошнота, рвота, колика и проч. Вообще острое воспаленіе мочеваго пузыря сопровождается всегда очень значительнымъ общимъ страданіемъ въ видѣ сильной горячки, обнаруживающейся въ началѣ твердымъ, частымъ, напряженнымъ жилобіеніемъ, большимъ жаромъ, жаждою, беспокойствомъ и проч. По достижениi высшей степени воспаленія тоска и беспокойство усиливаются, очень частое жилобіеніе дѣлается безпрестанно мягче, несвободнѣе и меньшее, и во вѣнѣшнемъ обликѣ боль-

иаго обнаруживаются явления слабости и упадка силъ. Лице становится блѣднымъ и впалымъ, конечности охлѣваютъ, больной впадаетъ въ бессонницу и начинаетъ бредить, не рѣдко оказываются даже корчи и обмороки.

§ 456.

Исходы. Воспаленіе сего рода въ большей части случаетъ имѣть весьма скорое теченіе и оканчивается въ 7—14 дней, переходя либо въ совершенное разрѣшеніе, или въ антоновъ огонь; либо въ нагноеніе, или хроническое состояніе. *Разрѣшеніе* слѣдуетъ при послабленіи воспалительныхъ припадковъ и горачки, при выступленіи повсемѣстнаго пота и свободномъ вытеченіи мутной густой мочи. *Антоновъ огонь* большею частію въ скоромъ времени напосыпь смерть. Наступленіе его показываютъ: мгновенное уменьшеніе болей, малый, мягкий, перемѣжающійся пульсъ, впалые черты лица, икота, холодъ въ конечностяхъ и проч. *Нагноеніе* случается рѣдко, при распространеніи воспаленія на всѣ оболочки пузыря и узнается изъ общихъ признаковъ обнаруживанія внутреннихъ нарывовъ. Если при семъ отложеніе гноя произойдетъ къ паружи, то образуются мочевые свищи, открывающіеся преимущественно въ проходной промежности, прямой кишкѣ и маточномъ рукавѣ. Чаще однакожъ гной проиникаетъ вмѣсть съ мочею въ полость таза и производить сильное воспаленіе, переходящее вскорѣ въ антоновъ огонь.

§ 457.

Причины. а) Внѣшнія механическія поврежденія той части тѣла, гдѣ имѣетъ положеніе мочевой пузырь, к. т. ушибы и поврежденія, случающіеся при родахъ отъ грубаго вспомоществованія инструментами, раненія пузыря при извлечении мочевыхъ камней, введеніи катетера и искусственномъ прободеніи его (*cystitis traumatica*); б.) отравленія шпанскими мушками и другими острыми мочегонительными веществами; с.) переносы на мочевой пузырь составоломнаго страданія и распространеніе на оный воспаленія смежныхъ частей, чаще всего неправильности гемороя, неблаговременное прекращеніе перелойнаго страданія и отложеніе онаго на мочевой пузырь (*Brodie*).

§ 458.

Предсказаніе зависитъ отъ степени и свойства воспаленія. Вообще оно составляетъ весьма значительную болезнь, которая легко дѣлается опасною и, при лучшемъ лѣченіи, оставляетъ иногда дурныя послѣдствія. Воспаленіе, происходящее отъ раненій и ушибовъ, очень склонно къ переходу въ антоновъ огонь, а рождающееся отъ переноса ломоты имѣетъ всегда очень скорое теченіе и потому также весьма опасно.

§ 459.

Лечение. Острое воспаленіе мочеваго пузыря требуетъ обильныхъ кровоиспражненій, соразмѣрныхъ ко-

лече по степени воспаленія и индивидуальнымъ отношеніямъ больнаго. Общія кровопускація въ самыхъ даже сумнительныхъ случаяхъ не должны быть пропускаемы. Послѣ оныхъ можно приставлять достаточное число плавокъ къ мочепузырной сторонѣ, къ проходной промежности и около самаго прохода, поддерживалъ потомъ кровотеченіе теплыми парами. Весьма хорошее дѣйствіе оказывають также теплые наркотическія припарки и втиранія сѣрой ртутной мази на страждущихъ частяхъ, равно какъ и теплые ванны. Что касается до внутреннихъ средствъ, то при назначеніи ихъ нужно наблюдать большую осторожность, избѣгая всего, что можетъ содѣлывать мочу острою. Посему здѣсь приличны только самыя нѣжныя слизистыя вещества (N. 72.): отваръ первовыхъ или овсяныхъ крупъ, алтейного корня, маковыя или миндалевые эмульсіи съ прибавленіемъ къ нимъ лаврововишневой воды (N. 5.), белены или кодеина для притупленія чувствительности пузыря. Сверхъ сего употребленіе внутрь услажненной хлористой ртути доставляетъ часто большую пользу. *Броде* советуетъ давать ее по два грана, съ половиною грана опія на приемъ, два или три раза въ день, въ то время, когда моча имѣеть кислое качество, окрашиваетъ лакмусовую бумагу краснымъ цветомъ и дѣлаетъ желтоватый осадокъ, некоторымъ образомъ подобный гною.

Сообразно сему больной долженъ соблюдать строжайшую диету, питаться самою нѣжною пищею, находиться въ постѣли, въ горизонтальномъ положеніи, содѣлывать свободнымъ испражненіе низа, принимая каждый день нѣсколько клещевинного масла, или дѣлая смягчающія

промывательныя съ лавровоишневою водою, либо съ масломъ белены.

При отравлениі шпанскими мушками и другими по- добными веществами, для притупленія силы ихъ, нужны слизистыя и масляныя средства, а въ крайности даже слизистыя впрыскиванія въ мочевой пузырь. При переносахъ надлежить стараться возстановить болѣзнен- ный процессъ въ томъ мѣстѣ, отъ коего онъ отступилъ, употребляя для сего не шпанскія мушки, но другія раздражающія средства. Мгновенно уничтоженное пе- релойное воспаленіе, кромѣ кровопусканій и обильнаго употребленія услащенной ртути, требуетъ теплыхъ припарокъ къ дѣтей городному уду, раздраженія мочеваго канала врачебными свѣчками и пр.



B.) Хроническое воспаление мочевого пузыря.

§ 460.

Явленія. Тупая, напрягающая боль въ сторонахъ мо- чеваго пузыря, разстройства мочевыхъ отправлений, наи- паче нарушеніе испражненія мочи, которое умножается при раздражающихъ вліяніяхъ, на вѣкоторое время по- слабляетъ и опять ожесточается. Больной имѣеть час- тое понужденіе къ мочеиспусканию, коему предшест- вуетъ обыкновенно легкая боль; въ мочѣ его, по охлаж- денію, осаждается густая вязкая слизь, пристающая ко

дну урильшика. Слизь сія имѣеть буроватый цветъ съ бѣлыми полосками и смѣшана иногда съ кровью. Она одарена въ высшей степени алкалическимъ свойствомъ и перемѣняетъ тотчасъ куркумовую бумагу въ бурый цветъ. Алкалическое свойство сіе сообщаетъ она всей мочѣ, которая при таковыхъ обстоятельствахъ имѣеть наклонность осаждать каменистое вещество, состоящее изъ фосфорокислой извести.

Припадки сіи могутъ продолжаться долгое время безъ вниманія больныхъ къ онимъ, до тѣхъ поръ пока, мало по малу усиливаясь, сдѣлаются очень мучительными, мочевой пузырь достигнетъ состоянія чрезмѣрной раздражительности и количество осаждающейся слизи умножится до того, что равняется иногда количеству самой мочи. Наконецъ моча получаетъ буроватый цветъ и весьма непріятный аммоніаковый запахъ, при чемъ испражненіе ея большею частію сопряжено бываетъ съ болью и сжениемъ; въ проходной промежности и мочевомъ каналѣ ощущается сильная боль, особенно послѣ испущенія мочи, которая часто смѣшана бываетъ съ гноемъ, или съ кровью; болией впадаетъ въ потрясающій ознобъ; жилобіеніе его дѣлается неправильнымъ и перемѣжающимъся, наконецъ силы упадаютъ и наступаетъ смерть.

§ 461.

Причины. Воспаленіе сіе въ причинномъ отношеніи бываетъ послѣдственное и самостоятельное. *Первое*, кромъ того что остается послѣ неразрѣшившагося острого воспаленія, произраѣдается весьма часто отъ продолжающаго-

ся долго съуженія мочеиспускательного канала, частыхъ судорожныхъ задержаній мочи, болѣзней предстательной желѣзы, или отъ присудствія въ пузырѣ мочевыхъ камней. Оно поражаетъ преимущественно пожилыхъ людей, наиболѣе мужчинъ, страждущихъ геморроемъ мочеваго пузыря, или составоломомъ, также подвергавшихся многократно перелойному теченію.

Первоначальною или самостоятельную болѣзнь сія оказывается довольно рѣдко отъ злоупотребленія спиртныхъ напитковъ, любострастнаго распутства; простуды погъ и таза, неблаговременнаго прекращенія геморроя, мѣсячнаго и послѣродового очищенія и т. п.

§ 462.

Предсказаніе здѣсь большею частію бываетъ не благопріятное, что зависитъ отъ трудности удаленія причинъ, поддерживающихъ болѣзнь и отъ самой упорности болѣзни, которая рѣдко излѣчивается совершенно, но чаще оставляетъ по себѣ страданія, причиняющія величайшія беспокойства. Воспаленіе, рождающееся отъ мочевыхъ камней, не прежде можетъ быть уничтожено, какъ по удаленіи камней. Тоже можно сказать и о съуженіяхъ мочеиспускательного канала, о болѣзняхъ предстательной желѣзы и проч. Гдѣ существуетъ дѣйствительно геморроемъ мочеваго пузыря, тамъ трудно также надѣяться на совершенное устраненіе болѣзни. Случаи, въ коихъ можно ожидать надежной помощи, относятся болѣе къ самостоятельной формѣ сего воспаленія.

§ 463.

Лечење. Главное условіе при семъ состоять въ томъ, чтобы определить, составляетъ ли хроническое воспаленіе мочеваго пузыря самостоятельную болѣзнь, или зависитъ отъ постороннихъ страданій. При послѣднемъ условіи надобно стараться болѣе всего удалить первоначальную болѣзнь, поддерживающую воспаленіе. Такимъ образомъ съужженіе мочеваго канала надлежитъ разширить, задержаніе мочи уничтожить осторожнымъ введеніемъ катетера, мочевые камни извлечь посредствомъ приличной операциі, а болѣзни предстательной желѣзы лѣчить сообразно ихъ свойству. При невозможности же отвратить таковыя причины остается доставлять только иѣкоторое облегченіе успокаивающими средствами и приличною діатою.

Вообще какъ въ семъ, такъ и въ самостоятельныхъ случаяхъ болѣзни, нужно стараться сколько возможно обѣ отведеніи раздраженія отъ мочеваго пузыря чрезъ противураздраженіе,— обѣ уменшениі скоплешія крови къ пузырю и отвращеніи всякаго раздраженія мочевыхъ органовъ. Большой долженъ наблюдать строгую діату, не употребляя ничего, кроме вѣжной слизистой пищи и таковыхъ же напитковъ, стараться о свободномъ испражненіи низа и находиться, сколько можно болѣе, въ горизонтальномъ положеніи для избѣжанія давленія брюшныхъ внутренностей на пузырь. Кровоотвлеченія показуются только тогда, когда къ воспаленію сему примѣшиваются острые періоды, или находится про-

должительное скопление въ пузырѣ,—вообще они весьма рѣдко нужны. Такъ какъ здѣсь страждеть преимущественно слизистая оболочка, то нашатырь въ достаточныхъ пріемахъ, также сыворотка и углекислая минеральная воды оказываютъ, подобно какъ и въ другихъ воспаленіяхъ слизистыхъ перепонокъ, весьма хорошее дѣйствіе (*Berndt*). *Броде* очень одобряетъ опій въ формѣ промывательного, дѣлаемаго на ночь или вечеромъ, а внутрь вытяжку белены или лактукарій въ маковой эмульсіи. Успащающая ртуть и другія ртутныя средства, по его мнѣнію, вредны. Если моча имѣеть алкалическое свойство (вѣроятно также при ломотномъ расположениі), то онъ даетъ внутрь съ особенною пользою *vinum colchici* по 50 капель три раза въ день. Отъ толокниники (*arbutus uva ursi*) онъ не видѣлъ никакой пользы. Напротивъ большую для него услугу дѣлалъ *пескогонъ* (*pareira Brava*), употребляемый въ отварѣ черезъ два часа по получашкѣ съ прибавленіемъ иногда *tincturae hyosciami*, либо минеральной кислоты, также отваръ *diosmatis crenatæ*, кипрскій терпентинъ (1—2 гр.) и хвостистый перецъ (15—20 гранъ) три раза въ день.
