

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДУ "ІНСТИТУТ ТЕРАПІЇ ІМЕНІ Л.Т. МАЛОЇ АМН УКРАЇНИ"
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ № 1 ТА КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ДЕПАРТАМЕНТУ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ м. ХАРКОВА

Матеріали
науково-практичної конференції

**СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ**

26 березня 2009 року

Харків
2009

**ОРТОСТАТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ СИСТОЛИЧЕСКОГО И
 ДИАСТОЛИЧЕСКОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
 КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ
 У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ,
 ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ И ПРИ ИХ СОЧЕТАНИИ**

Томина Е.Е.

Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина

В формировании патологии органов пищеварения и сердечно-сосудистой системы принимают участие множество факторов, в том числе значительную роль играет нейрогуморальная регуляция, состояние которой можно оценить путем исследования ортостатической реакции (ОР) систолического (САД) и диастолического артериального давления (ДАД).

Цель работы – сравнить регуляторные процессы у пациентов с язвенной болезнью (ЯБ) и артериальной гипертензией (АГ) и их коморбидности.

Материалы и методы: обследовано 50 пациентов с АГ, 25 пациентов с ЯБ и 27 пациентов с АГ в сочетании с ЯБ, в возрасте от 25 до 60 лет. Всем пациентам проводилась фиксация цифр артериального давления в клиностазе и при ортостазе. Критериями изотензивного типа ортостатических реакций (ОР) было отклонение показателей САД не более, чем на 10 мм рт.ст., ДАД не больше 5 мм рт.ст.. Изменение показателей более чем на 20 мм рт.ст. для САД и на 10 мм рт.ст. для ДАД, являлось критерием квалифицированной гипер-, гипотензивной ОР. Промежуточные значения относили к группе неквалифицированной ОР. Во всех группах было рассчитано процентное соотношение типов ОР по САД и ДАД.

Результаты представлены в таблице.

Таблица

Нозология	Тип ортостатических реакций									
	Гипертензивный				Изотензивный		Гипотензивный			
	квалиф.		неквалиф.				квалиф.		неквалиф.	
	САД	ДАД	САД	ДАД	САД	ДАД	САД	ДАД	САД	ДАД
АГ	2%	22%	10%	28%	70%	38%	4%	6%	14%	6%
ВХ	14,8%	37%	-	18,5%	81,5%	40,8%	-	-	3,7%	3,7%
АГ+ ВХ	4%	40%	24%	20%	56%	36%	4%	-	12%	4%

Выводы: Как следует из приведенных данных у пациентов всех групп преобладает изотензивный тип ОР по САД и гипертензивный по ДАД. Изотензивный тип реакции по САД более выражен при изолированной патологии, при этом большая частота этого типа у пациентов с ЯБ. Гипертензивный тип ОР по ДАД превалирует при коморбидном состоянии. Полученные данные указывают на необходимость изучения автономной регуляции при переходных процессах у пациентов с сочетанной патологией.

ВПЛИВ КОМБІНАЦІЇ ПЕРИНДОПРИЛУ ТА АМЛОДИПІНУ НА ГЕМОДИНАМІЧНІ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПОКАЗНИКИ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ У ПОЄДНАННІ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ	
Старченко Т.Г., Масляєва Л.В. <i>ДУ «Інститут терапії імені Л.Т. Малої АМН України», м. Харків</i>	85
ВПЛИВ АНІГІПЕРТЕНЗИВНОЇ ТЕРАПІЇ НА ДІАСТОЛІЧНУ ФУНКЦІЮ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ТА РІВЕНЬ МІКРОАЛЬБУМІНУРІЇ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ	
Старченко Т.Г., Коваль С.М., Першина К.С., Резнік Л.А., Крахмалова О.О. <i>ДУ «Інститут терапії імені Л.Т. Малої АМН України», м. Харків</i>	86
ЭФФЕКТИВНОСТЬ АДАЛАТА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В СОЧЕТАНИИ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА	
Телегіна Н.Д., Шайгуро Е.В., Брек В.В., Кучеренко Д.О. <i>Харьковский национальный медицинский университет</i>	87
ОРТОСТАТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ СИСТОЛИЧЕСКОГО И ДИАСТОЛИЧЕСКОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ И ПРИ ИХ СОЧЕТАНИИ	
Томина Е.Е. <i>Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина</i>	88
АНТИАГРЕГАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ СУДИНОПРОТЕКТОРНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ ТА ХРОНІЧНУ ХВОРОБУ НИРОК	
Топчій І.І., Денисенко В.П., Несен А.О., Кірієнко О.М., Бондар Т.М., Белозьорова С.В. <i>ДУ «Інститут терапії імені Л.Т. Малої АМН України», м. Харків</i>	89
ВПЛИВ СУДИННОПРОТЕКТОРНОЇ ТЕРАПІЇ НА ВМІСТ СТАБІЛЬНИХ МЕТАБОЛІТІВ ОКСИДУ АЗОТУ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ ТА ХРОНІЧНУ ХВОРОБУ НИРОК	
Топчій І.І., Бондар Т.М., Кірієнко О.М., Грідасова Л.М., Бенько О.Г. <i>ДУ «Інститут терапії імені Л.Т. Малої АМН України», м. Харків</i>	90
ПРОГНОЗ РИЗИКУ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ПОДІЙ В НЕОРГАНІЗОВАНІЙ ПОПУЛЯЦІЇ ЖІНОК ЖОВТНЕВОГО РАЙОНУ МІСТА ХАРКОВА	
Ушкварок Л.Б., Бабак М.О., Лавренко Т.А., Герасименко Ж.М. <i>ДУ «Інститут терапії імені Л.Т. Малої АМН України», м. Харків</i>	91
ГЕНДЕРНО-ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕНОСТІ ГІПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМІЇ СЕРЕД МЕШКАНЦІВ ЖОВТНЕВОГО РАЙОНУ МІСТА ХАРКОВА	
Ушкварок Л.Б., Лавренко Т.А., Бабак М.О., Герасименко Ж.М., Ярина Н.А. <i>ДУ «Інститут терапії імені Л.Т. Малої АМН України», м. Харків</i>	92