

# Первыя свѣдѣнія о флорѣ слизистыхъ грибовъ Харьковской и Курской губ.

Л. А. Бенике.

Ниже помѣщенный предварительный списокъ миксомицетовъ Харьковской и Курской губерній основанъ на сборахъ профессора Черняева и К. Пенго. Къ видамъ, найденнымъ ими, пришлось прибавить всего три формы, не оказавшіяся въ гербаріяхъ Черняева и Пенго.

Насколько можно судить по этимъ даннымъ, флора миксомицетовъ Харьковской и Курской губ. представляется довольно бѣдной.

Въ качествѣ опредѣлителей я пользовался слѣдующими пособіями:

Lister, Mycetozoa 1894.

Macbride, The North American Slime-moulds. New York 1899.

Massee, A monograph of the Myxogastres. London 1892.

Torrend, Flore des Myxomycetes. 1909.

Ячевскій, Слизевики. 1907.

## *Myxogastreae.*

### **A. Exosporeae Rost.**

1) *Ceratiomyxa porioides* Schröter (Syn. *Ceratium porioides* Alb. u. Sw.).

Найденъ Пенго въ Основьяненскомъ бору около Харькова, на старыхъ сосновыхъ пняхъ.

### **B. Endosporeae Rost.**

#### **a. Семейство Physaraceae.**

2) *Leocarpus fragilis* Rost. (Syn. *Leocarpus vernicosus* L. K.).

Найденъ Черняевымъ на корѣ березы въ саду Карпова въ Харьковѣ.

3) *Craterium pedunculatum* Trentepohl (Syn. *Craterium minutum* Leers).

Найденъ Черняевымъ на корѣ яблони.

4) *Fuligo septica* Gmelin (Syn. *Fuligo ovata* Macbride).

Найденъ Пенго на опилкахъ въ лѣсу Кузнецова (около станціи Дергачи, Южн. ж. д.). Также найдено въ Святыхъ Горахъ Изюмскаго уѣзда.

5) *Physarum diderma* Rost.

Найденъ Шперкомъ на сухихъ листьяхъ въ Григоровкѣ (около Харькова).

6) *Physarum nutans* Pers.

Найденъ въ Харьковѣ, на корѣ.

7) *Physarum cinereum* (Batsch.) Pers.

Найденъ на Основѣ, на сухихъ вѣтвяхъ, К. Пенго.

8) *Physarum leucopus* Link.

Найдена Черняевымъ въ саду Карпова въ Харьковѣ.

#### **b. Семейство Didymiaceae.**

9) *Sporangium alba* (Bull) DC.

Найдена Пенго въ Лужковскомъ лѣсу (около станціи Дергачи, Южн. ж. д.); то же—Святыя Горы Изюмскаго уѣзда.

#### **c. Семейство Stemonitaceae.**

10) *Comatricha laxa* Rost.

Найдена Черняевымъ на стеблѣ осоки подъ Харьковомъ.

11) *Stemonitis Smithii* Macbride (Syn. *Stemonitis ferruginea* Rost.).

Найдена Пенго при основаніи пней въ Основьяненскомъ лѣсу около Харькова, то же—Святыя Горы Изюмскаго уѣзда.

#### **d. Семейство Cribariceae.**

12) *Cribraria aurantiaca* Schrader.

Найдена Пенго на старыхъ сосновыхъ пняхъ Основьяненскаго бора около Харькова.

13) *Dictidium umbilicatum* Schrader (Syn. *Dictydium cancellatum* Batsch, Macbr.).

Найдена Пенго на старыхъ сосновыхъ пняхъ Основьяненскаго бора около Харькова.

