

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДУ "ІНСТИТУТ ТЕРАПІЇ ІМЕНІ Л.Т. МАЛОЇ АМН УКРАЇНИ"
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ № 1 ТА КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ДЕПАРТАМЕНТУ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ м. ХАРКОВА

Матеріали
науково-практичної конференції

**ПРІОРИТЕТНІ ПИТАННЯ
ДІАГНОСТИКИ І ТЕРАПІЇ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ**

7 жовтня 2008 року

Харків
2008

УДК: 616.1/4

П 33

Редакційна рада:

О.Я. Бабак (голова),

Г.Д. Фадєєнко (заступник голови)

В.І. Волков, О.Є. Гріднєв, С.В. Белозьорова, І.І. Єрмакович, В.В. Єфімов,
С.М. Коваль, М.П. Копиця, І.К. Кондаков, Ю.С. Рудик, І.І. Топчій,
Л.Б. Ушкварок.

Відповідальні секретарі: Л.М. Грідасова, О.Г. Бєнько.

П 33 “Пріоритетні питання діагностики і лікування внутрішніх
хвороб”: Матеріали науково-практичної конференції, 7 жовтня
2008 р. /Ред. рада: О.Я. Бабак (голова) та ін.; АМН України та ін.
– Х., 2008. – 167 с.

Адреса редколегії:

ДУ “Інститут терапії імені Л.Т. Малої АМН України”

просп. Постишева, 2-а, м. Харків, 61039, Україна

E-mail: info@therapy.gov.ua

www.therapy.org.ua

ГИПЕРТЕНЗИВНЫЙ ТИП ОРТОСТАТИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ СИСТОЛИЧЕСКОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Егорова А.Ю.

Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина

Существует три основных типа реакций артериального давления (АД) в ортостатических пробах: повышение АД, отсутствие изменений АД и снижение АД. Целью исследования было установление частотного распределения гипертензивной ортостатической реакции (ОР) по изменениям систолического артериального давления (САД) во время перехода из клиностаза в ортостаз у пациентов с артериальной гипертензией (АГ). Обследовано 154 пациента с АГ (58 мужчин и 96 женщин) в возрасте (63 ± 7) лет. Средняя продолжительность заболевания составила ($10,4 \pm 7,8$) лет. У 83 пациентов диагностирована мягкая АГ, у 36 – умеренная, у 35 – тяжелая. В исследование включались лица с изо- и гипертоническими типами ОР. При этом группа пациентов с изотоническим типом ОР служила контролем. Критериями изотонического типа ОР было отклонение САД от установленного в ортостазе не более чем на 5 мм рт. ст. и гипертонического – их повышение на 10 мм рт. ст. и более.

Для статистической оценки результатов использовались параметрические критерии (среднее значение – М и стандартное отклонение – sd). Данные заносились в базу Microsoft Excel, достоверность различий между группами пациентов определяли с помощью критерия Пирсона, расчет показателей производился с помощью SPSS 10.0 для Windows.

При переходе из клиностаза в ортостаз у 66,9 % (у 29,9 % мужчин и у 37,0 % женщин) пациентов отмечалось повышение САД, а у 9,1 % (у 2,6 % мужчин и у 6,5 % женщин) – САД не изменялось. В диапазоне от 16 мм рт. ст. и выше повышение САД встречалось чаще у пациентов с АГ по сравнению со здоровыми добровольцами (30,8 % и 17,2 %, соответственно).

Высокая частота ортостатических реакций по гипертензивному типу у пациентов с АГ указывает на важность целенаправленного анализа подобных нарушений автономной регуляции при переходных процессах и требует специального исследования, наблюдения и лечения.

| | |
|---|----|
| ДОПЛЕРОЕХОГРАФІЧНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ НИРОК У ХВОРИХ НА ДІАБЕТИЧНУ НЕФРОПАТІЮ Денисенко В.П., Топчій І.І., Несен А.О., Мазій В.В., Кірієнко О.М. ДУ "Інститут терапії імені Л.Т. Малої АМН України", м. Харків..... | 39 |
| ГИПЕРТЕНЗИВНЫЙ ТИП ОРТОСТАТИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ СИСТОЛИЧЕСКОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ Егорова А.Ю. Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина..... | 40 |
| ОСОБЕННОСТИ ЛИПИДОГРАММЫ У ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ Ермакович И.И., Куринная Е.Г. ГУ "Институт терапии имени Л.Т. Малой АМН Украины", г. Харьков..... | 41 |
| ВПЛИВ ФЕНСПРИДУ НА ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІЙ ЕНДОТЕЛІУ ТА ВНУТРІШНЬОСЕРЦЕВУ ГЕМОДИНАМІКУ У ХВОРИХ НА ХОЗЛ Сфімов В.В., Блажко В.І., Восійкова Л.С., Беседіна А.С. ДУ "Інститут терапії імені Л.Т. Малої АМН України", м. Харків..... | 42 |
| МАКРОЛИДЫ В ЛЕЧЕНИИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ: МЕСТО КЛАРИТРОМИЦИНА Ефимов В.В., Блажко В.И., Гридасова Л.Н. ГУ "Институт терапии имени Л.Т. Малой АМН Украины", г. Харьков..... | 43 |
| ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ ω-3-ПОЛІНЕНАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ НА ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІЙ ЕНДОТЕЛІУ У ХВОРИХ НА ХОЗЛ Єфімов В.В., Восійкова Л.С., Талалай І.В., Белозьорова С.В. ДУ "Інститут терапії імені Л.Т. Малої АМН України", м. Харків..... | 44 |
| ЗНАЧИМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В РАЗВИТИИ ПОСТРЕПЕРФУЗИОННЫХ АРИТМИЙ Ефремова О.А., Панченко Г.Ю., Зайченко О.Е., Гриненко Е.В. Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков..... | 45 |
| КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНГИБИТОРОВ АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ Зайченко О.Е., Панченко Г.Ю., Супрун С.А. Харьковский национальный медицинский университет..... | 46 |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВОЙНОЙ АНТИТРОМБОЦИТАРНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ИБС Запровальная О.Е., Рябуха В.В., Ченчик Т.А. ГУ "Институт терапии имени Л.Т. Малой АМН Украины", г. Харьков..... | 47 |